

ຢາວັກຊີນຕ້ານພຍາດຊີກແກນປ້ອກ ຫຼື ໝາກໃສ CHICKENPOX VACCINE

ສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງຮູ້

1

ດ້ວຍເຫດໃດຈຶ່ງຕ້ອງຮັບຢາວັກຊີນປ້ອງກັນຊີກແກນປ້ອກຫຼືໝາກໃສ?

ພຍາດໝາກໃສຫຼືຜັງໄກ່ (chickenpox) ຮຽກອີກວ່າໄຂ້ອອກຕຸ່ມພອງ (varicella) ແມ່ນພຍາດຂອງຮຸ່ນເດັກນ້ອຍ. ຕາມທັມມະດາແລ້ວບໍ່ຮ້າຍແຮງ, ແຕ່ອາດຮ້າຍແຮງກໍເປັນໄດ້, ໂດຍສະເພາະກັບມັນຕິດເດັກນ້ອຍອ່ອນຫຼືຜູ້ໃຫ່ງ.

- ແມ່ໄວຮັສຂອງພຍາດໝາກໃສ (chickenpox) ຕິດຕໍ່ກັນຮະວ່າງຄົນ ໂດຍທ່ານອາດຫັນໃຈ, ຫຼືຖືກນ້ຳຢາງຈາກຕຸ່ມພອງໝາກໃສແຕກ.
- ມັນເປັນເຫດໃຫ້ອອກຕຸ່ມພິດຕາມຕີນຕົວ, ຄັນ, ຄີງຮ້ອນ, ແລະອ່ອນເພັງ.
- ມັນອາດເປັນເຫດໃຫ້ຜິວໜັງອັກເສບໜັກ, ເປັນແປ້ວ, ປອດບວມ, ສມອງເສັງຫາຍຫຼືຕາຍ.
- ຜູ້ທີ່ເປັນໝາກໃສມາແລ້ວສາມາດສແດງອາການອອກຕຸ່ມ, ປວດເປັນຊັ້ນແຜ່ລາມແບບສາຍແອວອ້ອມ (shingles) ຫລາຍປີນຳຫຼັງມາ.
- ຮະວາງ 12,000 ຄົນເຂົ້ານອນໂຮງແຮມອ້ອມພຍາດໝາກໃສແຕ່ລະປີໃນສະຫະຣັກ.
- ຮະວາງ 100 ຄົນຕາງທຸກປີຢູ່ສະຫະຣັກອ້ອມພຍາດໝາກໃສ.

ຢາວັກຊີນຕ້ານພຍາດຊີກແກນປ້ອກສາມາດປ້ອງກັນຕົວເຮົາຕໍ່ພຍາດໝາກໃສ.

ຄົນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນຊີກແກນປ້ອກນີ້ຈະບໍ່ເປັນພຍາດໝາກໃສຈັກເທື່ອ. ແຕ່ວ່າຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຢາປ້ອງກັນນີ້ແລ້ວໄປຕິດພຍາດເພິ່ນກໍຈະບໍ່ສະບາຍພຽງເລັກນ້ອຍ. ເພິ່ນ ຈະອອກຕຸ່ມເລັກນ້ອຍ, ອາການໄຂ້ກໍບໍ່ຢາກນີ້, ແລ້ວພຍາດກໍຫາຍໄວ.

2

ຜູ້ໃດຄວນຈະຮັບຢາວັກຊີນຊີກແກນປ້ອກແລະໃບຢາມໃດ?

- ✓ ເດັກນ້ອຍຄວນໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນກັນຊີກແກນປ້ອກເມື່ອມີອາຍຸ 12 ຫາ 18 ເດືອນຫຼືຍາມໃດກໍໄດ້ເມື່ອເຂົາແກ່ກ່ວານັ້ນແລະບໍ່ເຄີຍໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນຊີກແກນປ້ອກ. ຄົນຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນນີ້ຈົນຮອດອາຍຸ 13 ປີຫຼືແກ່ກ່ວາຕ້ອງຮັບເອົາຢານີ້ 2 ຂນານ, ຫ່າງກັນ 4 ຫາ 8 ອາທິດ.

ຈົ່ງກຸ່ມທ່ານໝໍຫຼືຜູ້ພະຍາບານເພື່ອລາຍລະອຽດ.

ຢາວັກຊີນຊີກແກນປ້ອກອາດເອົາໃຫ້ພ້ອມກັນກັບຢາວັກຊີນກັນພຍາດອື່ນກໍໄດ້.

3

ຄົນບາງຈຳພວກຮັບຢາວັກຊີນຊີກແກນປ້ອກບໍ່ໄດ້ຫຼືຕ້ອງລໍກ້າງໄປກ່ອນ

- ເພິ່ນບໍ່ຄວນຮັບຢາວັກຊີນຊີກແກນປ້ອກກ້າງເພິ່ນຫາກເຄີຍກະທົບແພ້ຢາຂັ້ນອັນຕະຣາຍໝັກຕໍ່ຢາເຈລະທິນ (gelatin), ຢານິໂອໄມຊິນ (neomycin) ຕ້ານເຊື້ອພຍາດ, ຫຼື (ສຳລັບຜູ້ທີ່ຈະເຂົ້າຮັບຢາຂນານທີ່ສອງ) ຢາວັກຊີນຊີກແກນປ້ອກຂນານທຳອິດ.
- ຜູ້ທີ່ບໍ່ສະບາຍປານກາງຫຼືໜັກເມື່ອຮອດຍາມຮັບຢາ ວັກຊີນຕາມກຳນົດກໍຕ້ອງກ້າງໃຫ້ຫາຍຄັກ ຈຶ່ງຮັບເອົາ ຢາວັກຊີນຊີກແກນປ້ອກອີກໄດ້.
- ຜູ້ອົງຖືພາກໍຕ້ອງກ້າງຈົນຄອດລູກແລ້ວຈຶ່ງຮັບຢາວັກຊີນ ນີ້ໄດ້. ຈຶ່ງຮະວັງຢ່າໃຫ້ຖືພາ 1 ເດືອນຫຼັງຈາກຮັບຢາວັກ ຊີນນີ້.
- ຄົນບາງຈຳພວກກໍຕ້ອງກຸ່ມທ່ານໝໍວ່າຕົນຈະຮັບຢາ ວັດຊີນຊີກແກນປ້ອກໄດ້ບໍ່, ໃນນັ້ນກໍມີຜູ້ທີ່:
 - ຕິດແມ່ໄວຮັສເຮຈະໄອວີ /ເອດສີ HIV/AIDS ຫຼືພ ຍາດອື່ນທີ່ກະທົບລະບົບທຳການປ້ອງກັນຮ່າງກາຍ ຂອງຕົນ.
 - ກຳລັງປິວຕິນດ້ວຍຢາທີ່ໄປແຕ່ຕ້ອງລະບົບທຳການ ປ້ອງກັນຮ່າງກາຍຂອງຕົນ, ເຊັ່ນຢາສະເຕໂຣ ອິດ (steroids) ນານເກີນສອງອາທິດມາແລ້ວ.
 - ເປັນມະເຮັງ (cancer) ຊນິດໃດຊນິດນຶ່ງ.
 - ຢູ່ໃນຮະຍະຮັບຢາຫຼືສາຍແສງຮັງສີປົວມະເຮັງຢູ່
- ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວດ້ວຍການຕີ່ມເລືອດຫຼືສິ່ງກັນຕອງຈາກເລືອດ ກໍຕ້ອງກຸ່ມທ່ານໝໍຂອງຕົນວ່າເມື່ອໃດຕົນເອງຈະສັກຢາວັກຊີນກັນພຍາດຊີກແກນປ້ອກໄດ້.

ຈົ່ງກຸ່ມທ່ານໝໍຫຼືຜູ້ພະຍາບານຂອງທ່ານຕີ່ມເພື່ອລາຍລະອຽດ.

4

ອັນຕະຣາຍເນື່ອງຈາກສັກຢາວັກຊີນກັນພຍາດຊິກແກນປ້ອກມີຫຍັງແດ່?

ຢາວັກຊີນກໍຄືຢາແນວອື່ນມັນສາມາດກໍ່ເຫດຮ້າຍໃຫ້ເຮົາໄດ້ ເຊັ່ນການກະທົບແພ້ຢາດ້ວຍອາການໝັກ. ການປ່ວງໂຊໝັກຫຼືເກີງຕາຍຍ້ອນຢາວັກຊີນນີ້ມີເປົ້າໝາຍທີ່ສຸດທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້.

ກີກສັກຢາກັນພຍາດຊິກແກນປ້ອກແມ່ນປອດໄພດີລື່ນຫຼາຍເທົ່າກັບການກີກເຄາະຮ້າຍເປັນພຍາດໄຂ້ອອກໝາກໃສ (chickenpox disease).

ຄົນສ່ວນນາກຊຶ່ງໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນກັນຊິກແກນປ້ອກນີ້ກໍບໍ່ມີບັນຫາຫຍັງເນື່ອງຈາກຢາວັກຊີນນີ້.

ບັນຫາເລັກນ້ອຍ

- ຮູ້ສຶກປວດຫຼືເຄັ່ງຄັບອນສັກຢາໃສ່ (ຣະວ່າງ 1 ຕໍ່ 5 ເດັກ ເກີງ 1 ຕໍ່ 3 ຜູ້ ໝູ່ແລະຜູ້ໃຫຍ່).
- ໄຂ້ຄິງຮ້ອນ (1 ຄົນ ຕໍ່ 10 ຫຼື ນ້ອຍກວ່າ)
- ອອກຕຸ່ມເລັກນ້ອຍໃນລະຍະນຶ່ງເດືອນຫຼັງຈາກສັກຢາ ປ້ອງກັນແລ້ວ (1 ຄົນ ຕໍ່ 20 ຫຼື ຕ່ຳກວ່າ). ຈົນສາມາດເອົາພຍາດຕິດແປດຄົນໃນຄອບຄົວຂອງຕົນກໍເປັນໄດ້, ແຕ່ກໍນ້ອຍກວ່າໜ້ອຍໜ້ອຍ.

ບັນຫາປານກາງ

- ເປັນຊັກ (ຕົນຕົວແກວ່ງໄກວ່າໄປມາຫຼືຕາກຶ້ງຢູ່) ຍ້ອນ ໄຂ້ຄິງຮ້ອນຂຶ້ນສູງ (ເປີເລັ້ນເປັນຫຼວດ 1 ຕໍ່ 1,000 ຄົນ).

ບັນຫາໝັກ

- ປອດບວມ(ເປັນນ້ອຍທີ່ສຸດ)
- ບັນຫາໝັກແນວອື່ນຢ່າງນີ້ນ້ອຍກວ່າເຄີຍກີກລາຍງານດັ່ງ ພົບກະທົບຈາກຢາວັກຊີນກັນຊິກແກນປ້ອກ ເຊັ່ນສມອງ ເສັ້ນຫາຍແລະຈຳນວນເມັດເລືອດຕ່ຳ. ແຕ່ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ ນ້ອຍໄພດທີ່ນັກຊ່ຽວຊານຈະແນ່ໃຈວ່າມັນເນື່ອງມາຈາກຢາວັກຊີນ.

5

ກ້າເກີດບັນຫາປານກາງຫຼືໝັກຈະເປັນແນວໃດ?

ເຮົາຈະເຫັນຫຍັງ?

ສະພາບຜິດປົກກະຕິອັນໃດອັນນຶ່ງເຊັ່ນແພ້ຢາດ້ວຍອາການກະທົບໝັກ, ໄຂ້ຂຶ້ນສູງ, ການປະພຶດປ່ຽນແປງຈາກທັມມະດາ. ອາການໝັກຂອງແພ້ຢາກໍມີ ຫັນໃຈພືດ, ຄໍແຫບ ຫຼື ຫັນໃຈດັງຫອດແຫດ, ອອກມື້ນມ່ວນຕາມຕົວ, ສີຜິວໜັງມ້ານຈິດລົງ, ຮູ້ສຶກອ່ອນເພັງ, ຫົວໃຈເຕັ້ນເລັ່ງໄວຂຶ້ນ ຫຼື ວິນຫົວເກີດຂຶ້ນໃນລະຍະສອງສາມຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກສິດຢາແລ້ວ. ກ້າມີໄຂ້ສູງ ຫຼື ຊັກ ມັນກໍຈະເກີດຂຶ້ນໃນລະຍະ 1 ຫາ 6 ອາທິດຫຼັງຈາກສັກຢາແລ້ວ.

ເຮົາຈະເຮັດຫຍັງ?

- ໂທຣ. ຮ້ອງທ່ານໝໍ ຫຼື ພາໄປຫາໝໍທັນທີ.
- ເລົ່າໃຫ້ທ່ານໝໍຟັງເລື່ອງທີ່ເກີດຂຶ້ນ, ວັນເວລາເລີ່ມ ຕົ້ນ, ຍາມໃດທີ່ໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນ.
- ຮ້ອງຂໍໃຫ້ທ່ານໝໍ, ຜູ້ພະຍາບານ, ຫຼື ພັກງານສາທາລະນະ ນະສຸກ ກຽມຟອມລະບົບລາຍງານເຫດຮ້າຍເນື່ອງຈາກຢາວັກຊີນ (vaers) ຫຼື ໂທຣ. ຫາ VAERS ດ້ວຍ ຕົນເອງ ທີ່ 1-800-822-7967.

6

ໂຄງການແຫ່ງຊາດເພື່ອທົດແທນຄ່າເສັ້ນຫາຍເນື່ອງຈາກຢາວັກຊີນ

ໃນກໍລະນີນ້ອຍນັກນ້ອຍໜ້ອຍທີ່ທ່ານຫຼືລູກພົບເຄາະຮ້າຍກີກກະທົບດ້ວຍຢາວັກຊີນກໍມີໂຄງການສະຫະຮັກມາຊ່ວຍທ່ານປືນປົວບົວຮະບັດ.

ເພື່ອລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບໂຄງການນີ້ ຈົ່ງໂທຣ. ຫາ 1-800-338-2382 ຫຼື ອ້ຽມເບິ່ງໂຄງການຢູ່ຕາມຖານຂ່າຍຄອມພິວເຕີ ທີ່

<http://www.hrsa.gov/osp/vicp/>

7

ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະຮູ້ເລື່ອງລະອຽດກວ່ານີ້?

- ກຸ່ມທ່ານໝໍຫຼືຜູ້ພະຍາບານຂອງທ່ານເພື່ອລາຍລະ ອຽດ. ເພິ່ນອາດຈະມອບເອກະສານໃຫ້ທ່ານໄປອ່ານ ຫຼື ແນະນຳສາຍຂ່າວອື່ນໃຫ້.
- ໂທຣ. ຫາພະແນກສາທາລະນະນະສຸກທ້ອງຖິ່ນຫຼືຮັກ ເພື່ອ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບໂຄງສັກຢາກັນພຍາດ (immunization program).
- ຕິດຕໍ່ຊຸມກາງຄວບຄຸມແລະປ້ອງກັນພຍາດ (CDC):
 - Call 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO)
 - ອ້ຽມເບິ່ງໂຄງການແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການສັກຢາກັນ ພຍາດຢູ່ຕາມຖານຂ່າຍຄອມພິວເຕີ ທີ່ <http://www.cdc.gov/nip>



U.S. DEPARTMENT OF HEALTH & HUMAN SERVICES
Centers for Disease Control and Prevention
National Immunization Program