

# Chủng Ngừa cho Em Bé

## Hướng Dẫn cho Cha Mẹ

Đây là những loại thuốc chủng em bé của quý vị cần!

Mới sinh	HepB
2 tháng	HepB + DTaP + PCV13 + Hib + Polio + RV 1-2 tháng <sup>1</sup>
4 tháng	HepB <sup>2</sup> + DTaP + PCV13 + Hib + Polio + RV
6 tháng	HepB + DTaP + PCV13 + Hib <sup>3</sup> + Polio + RV <sup>4</sup> + Influenza <sup>5</sup> 6-18 tháng <sup>1</sup>
12 tháng hoặc lớn hơn	MMR + DTaP + PCV13 + Hib + Chickenpox + HepA <sup>6</sup> + Influenza <sup>5</sup> 12-15 tháng <sup>1</sup> 15-18 tháng <sup>1</sup> 12-15 tháng <sup>1</sup> 12-15 tháng <sup>1</sup> 12-15 tháng <sup>1</sup> 12-23 tháng <sup>1</sup>

Hỏi bác sĩ hoặc y tá để chắc chắn là em bé của quý vị nhận được tất cả các loại chủng ngừa đúng lịch trình. Nhiều khi thuốc chủng được kết hợp để giảm số lần chích. Quý vị nhớ hỏi thẻ hồ sơ có ghi ngày tháng chủng ngừa của em bé; mang theo thẻ này mỗi lần đến phòng mạch.

Đây là danh sách các bệnh mà em bé quý vị sẽ được bảo vệ chống lại:

**HepB:** viêm gan B, một bệnh gan nghiêm trọng

**DTaP:** bạch hầu, uốn ván (khít hàm), và ho gà (ho khục khặc)

**PCV13:** thuốc chủng khuẩn cầu phổi tiếp hợp bảo vệ chống lại nhiễm trùng máu, phổi, và não nghiêm trọng

**Hib:** *Haemophilus influenzae* loại b, một loại nhiễm trùng não, cuống họng, và máu nghiêm trọng

**Polio:** polio, một bệnh bại liệt nghiêm trọng

**RV:** nhiễm rotavirus, một bệnh tiêu chảy nghiêm trọng

**Influenza:** cúm, một loại nhiễm trùng phổi nghiêm trọng

**MMR:** sởi, quai bị, và sởi Đức

**HepA:** viêm gan A, một bệnh gan nghiêm trọng

**Chickenpox:** thủy đậu, còn gọi là đậu mùa

Ghi chú cho biểu đồ trên:

1. Đây là lứa tuổi nên chủng ngừa loại này.
2. Con sơ sinh của quý vị có thể không cần liều thuốc chủng Hep B lúc 4 tháng, tùy thuộc vào loại thuốc chủng được dùng. Hỏi bác sĩ hoặc y tá của quý vị.
3. Con sơ sinh của quý vị có thể không cần liều thuốc chủng Hib lúc 6 tháng, tùy thuộc vào loại thuốc chủng được dùng. Hỏi bác sĩ hoặc y tá của quý vị.
4. Con sơ sinh của quý vị có thể không cần liều thuốc chủng RV lúc 6 tháng, tùy thuộc vào loại thuốc chủng được dùng. Hỏi bác sĩ hoặc y tá của quý vị.
5. Tất cả trẻ em từ 6 tháng tuổi trở lên nên được chủng ngừa cúm vào mùa thu hoặc mùa đông mỗi năm.
6. Con quý vị sẽ cần 2 liều thuốc chủng HepA, chích cách nhau tối thiểu 6 tháng.