



# 嬰幼兒免疫接種

## 家長指南

以下是您的寶寶需要接種的疫苗！

出生時	<b>HepB</b>
2 個月	<b>HepB</b> + <b>DTaP</b> + <b>PCV</b> + <b>Hib</b> + <b>Polio</b> + <b>RV</b> 1-2個月 <sup>1</sup>
4個月	<b>HepB<sup>2</sup></b> + <b>DTaP</b> + <b>PCV</b> + <b>Hib</b> + <b>Polio</b> + <b>RV</b>
6個月	<b>HepB</b> + <b>DTaP</b> + <b>PCV</b> + <b>Hib<sup>3</sup></b> + <b>Polio</b> + <b>RV<sup>4</sup></b> + <b>Influenza<sup>5</sup></b> 6-18個月 <sup>1</sup> 6-18個月 <sup>1</sup>
12個月或 以上	<b>MMR</b> + <b>DTaP</b> + <b>PCV</b> + <b>Hib</b> + <b>Chickenpox</b> + <b>HepA<sup>6</sup></b> + <b>Influenza<sup>5</sup></b> 12-15個月 <sup>1</sup> 15-18個月 <sup>1</sup> 12-15個月 <sup>1</sup> 12-15個月 <sup>1</sup> 12-15個月 <sup>1</sup> 12-23個月 <sup>1</sup>

跟醫生或護士洽詢以確保您的寶寶按時接種了以上所有疫苗。很多時候幾種疫苗會合在一起注射，以減少注射的次數。請您一定要向醫生或護士索取一張記錄寶寶疫苗接種日期的記錄卡，而且每次帶寶寶去看醫生時要隨身攜帶此卡。

以下所列的是您的寶寶因接種疫苗後可以預防的相應疾病：

**HepB:** B型肝炎，一種嚴重的肝臟疾病

**DTaP:** 白喉、破傷風（牙關緊閉症）、百日咳（喘咳）

**PCV:** 肺炎球菌結合疫苗用來預防一種嚴重的血液、肺部和腦部感染

**Hib:** B型嗜血桿菌流感，一種嚴重的腦部、喉嚨和血液感染

**Polio:** 小兒麻痺症，一種嚴重的癱瘓症

**RV:** 輪狀病毒感染，一種嚴重的腹瀉病

**Influenza (流行性感冒):** 種嚴重的肺部感染

**MMR:** 麻疹、腮腺炎和德國麻疹

**HepA:** A型肝炎，一種嚴重的肝臟疾病

**Chickenpox (雞痘):** 也稱為水痘

上圖中的腳註：

1. 這是指接種該疫苗的年齡段。
2. 您的寶寶在4個月大時可能不需要接種B型肝炎疫苗，這取決於使用的疫苗種類。與您的醫生或護士洽詢。
3. 您的寶寶在6個月大時可能不需要接種B型流感嗜血桿菌結合疫苗，這取決於使用的疫苗種類。與您的醫生或護士洽詢。
4. 您的寶寶在6個月大時可能不需要接種RV疫苗，這取決於使用的疫苗種類。與您的醫生或護士洽詢。
5. 6個月或以上的所有兒童每年秋冬季都應該接種預防流行性感冒的疫苗。
6. 您的子女需要接種兩劑HepA疫苗，至少相隔6個月。