

Après les injections . . .

Il est possible que votre enfant ait besoin d'un peu plus d'amour et de soins après s'être fait vacciner. Certains vaccins qui protègent les enfants contre les maladies graves peuvent causer de l'inconfort pendant quelque temps. Voici des réponses aux questions que plusieurs parents se posent après la vaccination de leur enfant. Si ce document ne répond pas à vos questions, veuillez appeler votre prestataire de soins de santé.

Les vaccins font parfois un peu mal... mais la maladie peut faire beaucoup plus mal !

Appelez immédiatement votre prestataire de soins de santé si vous répondez « oui » à l'une ou l'autre des questions suivantes :

- La température de votre enfant a-t-elle atteint le niveau critique mentionné par votre médecin ?
- Votre enfant est-il pâle et sans réaction ?
- Votre enfant pleure-t-il depuis plus de trois heures sans être capable de s'arrêter ?
- Votre enfant a-t-il des secousses musculaires, des mouvements brusques ou convulsifs ?
- Votre enfant est-il nettement moins actif ou réactif ?

Que faire si votre enfant ne se sent pas bien ?

Je pense que mon enfant a de la fièvre. Que dois-je faire ?

Prenez la température de votre enfant pour vérifier s'il fait de la fièvre. Une manière simple de le savoir est de prendre sa température sous l'aisselle à l'aide d'un thermomètre électronique (ou en utilisant la méthode de prise de température recommandée par votre prestataire de soins de santé). Si la température de votre enfant atteint le seuil jugé préoccupant selon votre prestataire de soins de santé ou si vous avez des questions, appelez votre prestataire de soins de santé.

Voici quelques méthodes pour aider à faire baisser la fièvre :

- Faites boire abondamment votre enfant.
- Ne l'habilitez pas trop. Ne le couvrez pas, ni ne l'enveloppez pas trop.
- Donnez à votre enfant un médicament contre la douleur ou la fièvre, comme de l'acétaminophène (ex. : Tylenol) ou de l'ibuprofène (ex. : Advil, Motrin). La posologie devrait être basée sur le poids de votre enfant et les recommandations de votre prestataire de soins de santé. *Ne lui donnez pas d'aspirine.* Vérifiez à nouveau sa température une heure après l'administration du médicament. Pour toute question, appelez votre prestataire de soins de santé.

Mon enfant est de mauvaise humeur depuis qu'il a été vacciné.

Que dois-je faire ?

À la suite de l'administration d'un vaccin, les enfants peuvent être agités du fait des douleurs ou de la fièvre. Pour diminuer son inconfort, vous pouvez lui donner un médicament comme de l'acétaminophène ou de l'ibuprofène. *Ne lui donnez pas d'aspirine.* Si ce comportement persiste au-delà de 24 heures, appelez votre prestataire de soins de santé.

Le bras ou la cuisse de mon enfant est gonflé(e), chaud(e) au toucher et rouge ? Que dois-je faire ?

- Appliquez un gant de toilette propre imbibé d'eau fraîche sur la région endolorie pour réduire l'inconfort.
- Pour la douleur, donnez-lui un médicament comme de l'acétaminophène ou de l'ibuprofène, selon les recommandations de votre prestataire de soins de santé (voir l'encadré ci-dessous). *Ne lui donnez pas d'aspirine.*
- Si la rougeur ou la sensibilité s'intensifie après 24 heures, appelez votre prestataire de soins de santé.

Mon enfant a l'air très malade. Devrais-je appeler mon prestataire de soins de santé ?

Si vous avez **quelque préoccupation que ce soit** à l'égard de l'état physique ou du comportement de votre enfant, n'hésitez pas à appeler votre prestataire de soins de santé !

HEALTHCARE PROVIDER: PLEASE FILL IN THE INFORMATION BELOW.

(À L'ATTENTION DU PRESTATAIRE DE SOINS : VEUILLEZ REMPLIR LES DIRECTIVES QUI SUIVENT .)

If your child's temperature is _____ °F or _____ °C or higher, or if you have questions, call your healthcare provider.

Healthcare provider phone number: _____

Medication (if needed): _____
Name of medication/type of formulation

Give _____ every _____ hours as needed
dose or amount