

# Прививки для младенцев и детей, возраст 0–10 лет

*Своевременная вакцинация вашего ребенка поможет защитить его или ее от 15 заболеваний, предупреждаемых с помощью вакцин. Проконсультируйтесь с детским врачом своего ребенка по поводу всех рекомендованных прививок для вашего ребенка.*

Прививка	Ваш ребенок полностью привит?
<b>Ветрянка</b> (ветряная оспа; Var)	Вашему ребенку необходимо сделать прививку против ветрянки путем введения 2 доз вакцины. Первую дозу вводят в 12–15 месяцев, а вторую дозу вводят в 4–6 лет.
<b>Дифтерия, столбняк и коклюш</b> (pertussis; DTaP)	Вашему ребенку необходимо ввести 5 доз вакцины от дифтерии, столбняка и коклюша (DTaP). Первую дозу вводят в 2 месяца, вторую — в 4 месяца, третью — в 6 месяцев, четвертую — в 15–18 месяцев и пятую — в 4–6 лет.
<b>Гемофильная инфекция типа b</b> (Hib)	Вашему ребенку необходимо получить 3–4 дозы вакцины Hib, в зависимости от марки вакцины. Первую дозу вводят в 2 месяца, вторую — в 4 месяца, третью — в 6 месяцев (если необходимо), последнюю — в 12–15 месяцев.
<b>Гепатит А</b> (HepA)	Вашему ребенку необходимо ввести 2 дозы вакцины от гепатита А. Первую дозу вводят в возрасте 1 года, а вторую дозу вводят спустя 6–12 месяцев.
<b>Гепатит В</b> (HepB)	Вашему ребенку необходимо получить 3–4 дозы вакцины от гепатита В, в зависимости от марки вакцины. Первую дозу вводят после рождения, вторую — в 1–2 месяца, третью — в 4 месяца (если необходимо), а последнюю — в 6–18 месяцев.
<b>Грипп</b>	Каждому в возрасте от 6 месяцев и старше необходимо получать прививку от гриппа каждой осенью (или зимой), и далее в течение всей жизни. Некоторым детям младше 9 лет необходимо 2 дозы. Спросите детского врача своего ребенка, необходимо ли вашему ребенку больше чем 1 доза.
<b>Корь, свинка, краснуха</b> (MMR)	Вашему ребенку необходимо ввести 2 дозы вакцины MMR. Первую дозу вводят в 12–15 месяцев, а вторую дозу вводят в 4–6 лет.
<b>Менингококковая инфекция</b> (MenACWY [MCV4], MenB)	Младенцам и детям в возрасте 0–10 лет с определенными нарушениями здоровья (например, если не функционирует селезенка) необходимо вводить одну или обе менингококковые вакцины. Проконсультируйтесь с детским врачом своего ребенка о необходимости делать ему прививку против менингококковой инфекции.
<b>Пневмококковая инфекция</b> (Pneumovax [конъюгированная вакцина, PCV], Pneumovax [полисахаридная вакцина, PPSV])	Вашему ребенку необходимо ввести 4 дозы вакцины Pnevnaar (PCV). Первую дозу вводят в 2 месяца, вторую — в 4 месяца, третью — в 6 месяцев, а четвертую — в 12–15 месяцев. Некоторым детям также необходимо ввести дозу пневмококковой полисахаридной вакцины Pneumovax (PPSV). Проконсультируйтесь с детским врачом своего ребенка о необходимости дополнительной защиты от пневмококковой инфекции для вашего ребенка.
<b>Полиомиелит</b> (IPV)	Вашему ребенку необходимо сделать прививку против полиомиелита путем введения 4 доз вакцины (IPV). Первую дозу вводят в 2 месяца, вторую — в 4 месяца, третью — в 6–18 месяцев, а четвертую — в 4–6 лет.
<b>Ротавирусная Ротавирус</b> (RV)	Вашему ребенку необходимо получить 2–3 дозы ротавирусной вакцины (RV), в зависимости от марки вакцины. Первую дозу вводят в 2 месяца, вторую — в 4 месяца и третью — в 6 месяцев (если необходимо).

**Ваш ребенок будет выезжать за пределы США?** Посетите веб-сайт Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) [wwwnc.cdc.gov/travel/destinations/list](http://wwwnc.cdc.gov/travel/destinations/list) для получения медицинской информации относительно поездок за границу, или проконсультируйтесь со специалистами в клинике для туристов.

\*Vaccinations for Infants and Children, Age 0–10 Years\*