

¿Cuándo deben vacunarse los niños y los adolescentes?

Edad	HepB Hepatitis B	DTaP/Tdap Difteria, tétanos, pertussis (tos ferina)	Hib <i>Haemophilus influenzae</i> de tipo b	IPV Poliomielitis	PCV13 Neumocócica conjugada	RV Rotavirus	SPR Sarampión, paperas, rubéola	Var Varicela	HepA Hepatitis A	VPH Virus del papiloma humano	Men- ACWY		MenB	Influenza Gripe
											Meningocócica			
Al nacer (dentro de las 24 horas de haber nacido)	✓													
2 meses	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
4 meses	✓ ¹	✓	✓	✓	✓	✓								
6 meses	✓ (6 a 18 meses)	✓	✓ ¹	✓ (6 a 18 meses)	✓	✓ ¹								✓ (6 meses y mayores)
12 meses			✓ (12 a 15 meses)		✓ (12 a 15 meses)		✓ (12 a 15 meses)	✓ (12 a 15 meses)	✓✓ (2 dosis administradas con separación de 6 meses a la edad de 12 a 23 meses)					
15 meses		✓ ² (15 a 18 meses)												
18 meses														
19 a 23 meses														
4 a 6 años		✓		✓			✓	✓						
7 a 10 años														
11 a 12 años		✓ (Tdap)								✓✓ ³	✓			
13 a 15 años														
16 a 18 años											✓	✓✓ ^{4, 5}		

Una dosis cada otoño o invierno para todas las personas de 6 meses de edad y mayores. Algunos niños menores de 9 años necesitan 2 dosis; pregúntele a su proveedor de atención médica si su hijo necesita más de 1 dosis.

Se recomienda administrar la vacuna de la influenza cada año a todas las personas de 6 meses de edad y mayores.

NOTAS AL PIE

- 1 Es posible que su bebé no necesite esta dosis dependiendo de la marca de la vacuna que use su proveedor de atención médica.
- 2 Esta dosis de la vacuna DTaP se puede administrar a partir de los 12 meses si han pasado 6 meses desde la dosis anterior.
- 3 Los niños con ciertas afecciones médicas necesitarán una tercera dosis.
- 4 Esta vacuna se le puede administrar a adolescentes sanos. También se recomienda a adolescentes con ciertas afecciones médicas.
- 5 Su adolescente puede necesitar una dosis adicional dependiendo de la recomendación de su proveedor de atención médica.

