

¿Cuándo deben vacunarse los niños y los adolescentes?

Edad	HepB Hepatitis B	DTaP/Tdap Difteria, tétanos, tos ferina	Hib <i>Haemophilus influenzae</i> tipo b	VPI Polio	PCV13 Neumocócica conjugada	RV Rotavirus	MMR Sarampión, paperas, rubéola	Varicela Chickenpox	HepA Hepatitis A	HPV Virus del papiloma humano	MCV4 Meningocócica conjugada	Influenza Gripe
Al nacer	✓											
2 meses	✓ (1 a 2 meses)	✓	✓	✓	✓	✓						
4 meses	✓ ¹	✓	✓	✓	✓	✓						
6 meses		✓	✓ ¹		✓	✓ ¹						
12 meses	✓	✓ ²	✓	✓	✓		✓	✓	✓✓			
15 meses	(6 a 18 meses)	(15 a 18 meses)	(12 a 15 meses)	(6 a 18 meses)	(12 a 15 meses)		(12 a 15 meses)	(12 a 15 meses)	(2 dosis, la 2ª 6 meses después de la 1ª, a los 12 a 23 meses)			✓
18 meses												
19 a 23 meses		Ponerse al día ³	Ponerse al día ³	Ponerse al día ³	Ponerse al día ³		Ponerse al día ³	Ponerse al día ³				
4 a 6 años		✓		✓			✓	✓				
7 a 10 años		Ponerse al día ³										
11 a 12 años	Ponerse al día ³	✓ (Tdap)		Ponerse al día ³			Ponerse al día ³	Ponerse al día ³	Ponerse al día ³	✓✓✓	✓	
13 a 15 años		Ponerse al día ³ (Tdap)								Ponerse al día ³	Ponerse al día ³	
16 a 18 años											✓	

(Una dosis todos los otoños o inviernos para todas las personas de 6 meses de edad y mayores. Es posible que algunos niños menores de 9 años de edad necesiten 2 dosis; pregúntele al profesional médico si su hijo necesita más de 1 dosis).

NOTAS AL PIE

- 1 Es posible que su bebé no necesite esta dosis dependiendo del tipo de vacuna que use su profesional médico.
- 2 Esta dosis de la DTaP se puede dar a partir de los 12 meses si han pasado 6 meses desde la dosis anterior.

- 3 Si su hijo no se vacunó a tiempo o si no se puso alguna vacuna, póngalo al día cuanto antes posible. Si su hijo no completó una serie de vacunas a tiempo, sólo tendrá que ponerse las vacunas restantes de la serie. No necesita volver a darse las vacunas de la serie que ya se puso.