

Khi nào Trẻ Em và Thiếu Niên Cần Chủng Ngừa?

Tuổi	HepB Viêm gan B	DTaP/Tdap Bạch hầu, Uốn ván, Ho gà (ho rít)	Hib <i>Haemophilus influenzae</i> loại b	IPV Polio (Sốt Tê Liệt)	PCV Khuẩn cầu phối tiếp hợp	RV Rotavirus	MMR Sởi, quai bị, sởi Đức	Varicella Thủy đậu	HepA Viêm gan A	HPV Siêu vi papillomavirus ở người	MCV4 Khuẩn cầu não Tiếp hợp	Influenza Cúm (Flu)
Mới sinh	✓											
2 tháng	✓ (1–2 tháng)	✓	✓	✓	✓	✓						
4 tháng	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
6 tháng		✓	✓		✓	✓						
12 tháng	✓ (6–18 tháng)	✓ (15–18 tháng)	✓ (12–15 tháng)	✓ (6–18 tháng)	✓ (12–15 tháng)		✓ (12–15 tháng)	✓ (12–15 tháng)	✓✓ (chủng 2 liều cách 6 tháng vào lúc 12–23 tháng)			
15 tháng												
18 tháng												
19–23 tháng						Theo Kịp				Theo Kịp	Theo Kịp	Theo Kịp
4–6 năm	✓		✓			✓	✓					
7–10 năm	Theo Kịp											
11–12 năm	✓ Tdap			Theo Kịp			Theo Kịp	Theo Kịp	Theo Kịp	✓✓✓	✓	
13–15 năm		Theo Kịp (Tdap)								Theo Kịp	Theo Kịp	
16–18 năm										Theo Kịp		✓

Xin lưu ý: Các trường hợp ho gà (ho rít) đã gia tăng ở trẻ em, thiếu niên và người lớn trong vòng vài năm qua. Tiếc thay, một số trẻ sơ sinh đã qua đời vì còn quá nhỏ để được thuốc chủng bảo vệ đầy đủ. Hãy hỏi bác sĩ hoặc y tá của quý vị xem con em quý vị đã nhận đủ các lần chủng ho gà cần thiết cho lứa tuổi của em chưa. Ngoài ra, nếu bản thân quý vị chưa chủng ngừa ho gà, quý vị cần phải đi chích ngừa.

“Theo Kịp” là gì? Nếu con quý vị chưa hoặc để quá hạn chủng ngừa, hãy cho con chủng ngừa càng sớm càng tốt. Nếu con quý vị chưa hoàn tất một loạt chủng ngừa đúng thời hạn, em chỉ cần chủng phân còn lại của loạt thuốc chủng. Không cần phải bắt đầu lại từ đầu.