

# Khi nào Trẻ Em và Thiếu Niên Cần Chủng Ngừa?

Tuổi	HepB Viêm gan B	DTaP/Tdap Bạch hầu, Uốn ván, Ho gà	Hib Haemophilus influenzae loại b	Polio Sốt Tê Liệt	PCV Khuẩn cầu phổi tiếp hợp	RV Rotavirus	MMR Sởi, quai bị, sởi Đức	Varicella Thủy đậu	HepA Viêm gan A	HPV Siêu vi papillomavirus ở người	MCV4 Khuẩn cầu não Tiếp hợp	Influenza Cúm
Mới sinh	✓											
2 tháng	✓ (1-2 tháng)	✓	✓	✓	✓	✓						
4 tháng	✓ <sup>1</sup>	✓	✓	✓	✓	✓						
6 tháng		✓	✓ <sup>2</sup>		✓	✓ <sup>2</sup>						
12 tháng	✓ (6-18 tháng)	✓ <sup>4</sup> (15-18 tháng)	✓ (12-15 tháng)	✓ (6-18 tháng)	✓ (12-15 tháng)		✓ (12-15 tháng)	✓ (12-15 tháng)	✓✓ (chủng 2 liều cách 6 tháng vào lúc 12-23 tháng)			✓ <sup>3</sup> (chủng mỗi mùa thu hoặc mùa đông cho trẻ em từ 6 tháng- 18 tuổi)
15 tháng												
18 tháng												
19-23 tháng		Theo Kíp <sup>5</sup>	Theo Kíp <sup>5</sup> (đến 5 năm)	Theo Kíp <sup>5</sup>	Theo Kíp <sup>5</sup> (đến 5 năm)		Theo Kíp <sup>5</sup>	Theo Kíp <sup>5</sup>				
4-6 năm		✓		✓			✓	✓				
7-10 năm	Theo Kíp <sup>5</sup>	Theo Kíp <sup>5</sup>							Theo Kíp <sup>5</sup>			
11-12 năm		✓ Tdap		Theo Kíp <sup>5</sup>			Theo Kíp <sup>5</sup>	Theo Kíp <sup>5</sup>		✓✓✓ <sup>6</sup>	✓	
13-18 năm		Theo Kíp <sup>5</sup> (Tdap/Td)								Theo Kíp <sup>5,6</sup>	Theo Kíp <sup>5,7</sup>	

- Con sơ sinh của quý vị có thể không cần một liều HepB vào lúc 4 tháng tùy thuộc vào loại thuốc chủng mà chuyên viên chăm sóc sức khỏe của quý vị sử dụng.
- Con sơ sinh của quý vị có thể không cần một liều thuốc chủng Hib hoặc RV vào lúc 6 tháng tùy thuộc vào loại thuốc chủng mà chuyên viên chăm sóc sức khỏe của quý vị sử dụng.
- Hầu hết người chủng ngừa chỉ cần một liều. Trẻ em nhỏ hơn 9 tuổi và được chủng ngừa cúm lần đầu tiên, hoặc chỉ chủng 1 liều vào mùa cúm trước (nếu đó là mùa chủng ngừa cúm đầu tiên của em), nên được chủng 2 liều cách nhau tối thiểu 4 tuần vào mùa này.
- Có thể chủng liều DTaP này sớm nhất vào lúc 12 tháng tuổi nếu lần trước đã chủng cách đó 6 tháng.

- Nếu việc chủng ngừa của con quý vị bị chậm trễ hoặc quên chủng, các em nên được chủng ngừa càng sớm càng tốt.
- Tất cả thiếu nữ và phụ nữ từ 11 đến 26 tuổi đều nên chủng ngừa 3 liều HPV, chủng trong vòng 6 tháng. Trẻ nam và đàn ông từ 11 đến 26 tuổi cũng có thể chủng một loại thuốc ngừa HPV (Gardasil) để giảm rủi ro bị bệnh sùi mào gà sinh dục (genital warts). Trẻ em có thể chủng ngừa sớm nhất vào lúc 9 tuổi.
- Nếu quý vị có con vị thành niên đang theo học đại học và dự định ở nội trú và trước kia chưa chủng ngừa bệnh viêm khuẩn cầu não, các em nên chủng ngừa bây giờ.

**Lưu ý:** Một số trẻ có thể cần thêm thuốc chủng. Nói chuyện với chuyên viên chăm sóc sức khỏe của quý vị.