

# График проведения прививок для детей и подростков

Возраст	НерВ гепатит В	DTaP/Tdap дифтерия, столбняк, коклюш	Hib гемофильная инфекция, тип b	IPV полиомиелит	PCV пневмококковый конъюгат	RV ротавирус	MMR корь, свинка, краснуха	Varicella ветряная оспа	НерА гепатит А	HPV вирус папилломы человека	MCV4 менингококковый конъюгат	Influenza Грипп
При рождении	✓											
2 месяца	✓ (1–2 мес)	✓	✓	✓	✓	✓						
4 месяца	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
6 месяцев		✓	✓		✓	✓						
12 месяцев												
15 месяцев	✓ (6–18 мес)	✓ (15–18 мес)	✓ (12–15 мес)	✓ (6–18 мес)	✓ (12–15 мес)		✓ (12–15 мес)	✓ (12–15 мес)	✓✓ (2 дозы с перерывом в 6 мес, с 12 до 23 мес)			
18 месяцев												
19–23 месяца		Наверстывание	Наверстывание	Наверстывание	Наверстывание		Наверстывание	Наверстывание				
4–6 лет		✓		✓			✓	✓				
7–10 лет		Наверстывание										
11–12 лет	Наверстывание	✓ Tdap		Наверстывание			Наверстывание	Наверстывание	Наверстывание	✓✓✓	✓	
13–15 лет		Наверстывание (Tdap)								Наверстывание	Наверстывание	
16–18 лет											✓	

✓  
(Одна доза каждую осень или зиму для всех людей в возрасте 6 месяцев и старше)

**Примите к сведению:** в последние годы участились случаи заболевания коклюшем детей, подростков и взрослых. К сожалению, некоторые дети, слишком маленькие, чтобы их можно было полностью защитить от заболевания с помощью вакцинации, умерли. Спросите своего врача или медсестру, получили ли ваши дети все прививки от коклюша в соответствии с их возрастом. И если вам не делали прививку от коклюша, то тоже сделайте.

**Что значит «наверстать»?** Если необходимая вашему ребенку прививка была пропущена или уже прошел ее срок, позаботьтесь, чтобы эта прививка была сделана как можно скорее. Если ваш ребенок не завершил серию прививок вовремя, то нужно будет сделать только оставшиеся прививки. Начинать все с начала не нужно.