

儿童和青少年什么时候需要接种疫苗？

年龄	HepB 乙肝	DTaP/Tdap 白喉、破伤风、百日咳	Hib 乙型流感嗜血杆菌	IPV 小儿麻痹症	PCV13 肺炎球菌结合疫苗	RV 轮状病毒	MMR 麻疹、腮腺炎、风疹	水痘	HepA 甲肝	HPV 人乳头瘤病毒	Men-ACWY	MenB	流感
											脑膜炎球菌		
出生时 (出生 24 小时内)	✓												
2 个月	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
4 个月	✓ ¹	✓	✓	✓	✓	✓							
6 个月	✓ (6-18 个月)	✓	✓ ¹	✓ (6-18 个月)	✓	✓ ¹							✓ (6 个月和更大年龄)
12 个月			✓ (12-15 个月)		✓ (12-15 个月)		✓ (12-15 个月)	✓ (12-15 个月)	✓✓ (2 剂在年龄 12-23 个月时, 间隔 6 个月接种)				
15 个月		✓ ² (15-18 个月)											
18 个月													
19-23 个月													
4-6 岁		✓		✓			✓	✓					
7-10 岁													
11-12 岁		✓ (Tdap)								✓✓ ³	✓		
13-15 岁													
16-18 岁											✓	✓✓ ^{4,5}	

对于所有年龄为 6 个月及以上的人, 每个秋天或冬天接种 1 剂。有些年龄小于 9 岁的孩子需要接种 2 剂; 请咨询您孩子的医疗护理提供者您的孩子是否需要接种超过 1 剂疫苗。

建议对每个年龄在 6 个月及以上的人每年接种流感疫苗。

脚注

- 1 您孩子是否需要注射该剂疫苗取决于您的医疗护理提供者使用的疫苗品牌。
- 2 如果自前一剂疫苗接种时间算起已经有 6 个月, 可以早至年龄为 12 个月时接种该剂 DTaP。
- 3 患有特定医学病症的儿童需要接种第三剂。
- 4 健康的青少年可接种该疫苗。对于患有特定健康病症的青少年, 也建议接种该剂疫苗。
- 5 根据您医疗护理提供者的建议, 青少年可能还需要再接种一剂。