

아동과 십대 아동은 언제 백신 접종이 필요합니까?

나이	HepB B형 간염	DTaP/Tdap 디프테리아, 파상풍, 백일해 (백일 기침)	히브 헤모필루스 인플루엔자 b형	IPV 폴리오	PCV13 폐렴구균 결합	RV 로타바이러스	MMR 홍역, 볼거리, 풍진	수두	HepA A형 간염	HPV 인유두종 바이러스	Men-ACWY / MenB 수막구균		인플루엔자 Flu
											Men-ACWY	MenB	
출생시 (출생 후 24시간 이내)	✓												
2개월	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
4개월	✓ ¹	✓	✓	✓	✓	✓							
6개월	✓ (6-18개월)	✓	✓ ¹	✓ (6-18개월)	✓	✓ ¹							✓ (6개월 이상)
12개월			✓ (12-15개월)		✓ (12-15개월)		✓ (12-15개월)	✓	✓✓ (2회 용량 투여, 12-23개월 차에 6개월 간격)				
15개월		✓ ² (15-18개월)											
18개월													
19-23개월													
4-6세		✓		✓			✓	✓					
7-10세													
11-12세		✓ (Tdap)								✓✓ ³	✓		6개월 이상인 모든 아이들에게 매년 인플루엔자 백신 접종을 권장합니다.
13-15세													
16-18세										✓	✓✓ ^{4,5}		

가을 또는 겨울이 될 때마다 6개월 이상의 모든 아동에게 1회 투여합니다. 9세 미만의 몇몇 아동들은 2회 용량을 투여해야 합니다. 귀 자녀에게 1회 넘는 용량을 투여해야 하는 경우, 귀 자녀의 담당 의료인에게 물어 보십시오.

각주

- 1 귀 자녀는 담당 의료인이 사용하는 백신 브랜드에 따라 이 용량이 필요하지 않을 수 있습니다.
- 2 이전 용량 투여 후 6개월이 지난 경우 12개월 차에 이 용량의 DTaP를 투여해야 할 수 있습니다.
- 3 특정 질환이 있는 아동은 세 번째 용량을 투여해야 합니다.
- 4 이 백신은 건강한 십대 아이에게 접종해야 할 수 있습니다. 또한 특정 건강 문제가 있는 청소년에게도 이 백신을 권장합니다.
- 5 담당 의료인의 권장안에 따라 십대인 귀 자녀에게 추가 용량이 필요할 수 있습니다.