

# 어린이와 10대는 언제 백신을 접종 받아야 합니까?

연령	HepB B형 간염	DTaP/Tdap 디프테리아, 파상풍, 백일해	Hib 헤모필루스 b형 독감	소아마비	PCV 폐렴구균	RV 로타바이러스	MMR 홍역, 볼거리, 풍진	Varicella 수두	HepA A형 간염	HPV 인유두종 바이러스	MCV4 수막구균	독감
출생 시	✓											
2개월	✓ (1 - 2개월)	✓	✓	✓	✓	✓						
4개월	✓ <sup>1</sup>	✓	✓	✓	✓	✓						
6개월	✓ (6 - 18개월)	✓	✓ <sup>2</sup>	✓ (6 - 18개월)	✓	✓ <sup>2</sup>						✓ <sup>3</sup>  (매년 가을 또는 겨울에 6개월 - 18살 된 어린이와 청소년에게 접종)
12개월		✓ <sup>4</sup> (15 - 18개월)	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓✓ (12 - 23 개월에 6달 간격으로 2회 접종)	
15개월			✓		✓	✓	✓	✓	✓			
18개월			✓		✓	✓	✓	✓	✓			
19 - 23개월	따라잡기 접종 <sup>5</sup>	따라잡기 접종 <sup>5</sup>	따라잡기 접종 <sup>5</sup> (5세까지)	따라잡기 접종 <sup>5</sup>	따라잡기 접종 <sup>5</sup> (5세까지)		따라잡기 접종 <sup>5</sup>	따라잡기 접종 <sup>5</sup>				
4 - 6세		✓		✓			✓	✓				
7 - 10세		따라잡기 접종 <sup>5</sup>	따라잡기 접종 <sup>5</sup>						따라잡기 접종 <sup>5</sup>			
11 - 12세		✓ Tdap			따라잡기 접종 <sup>5</sup>			따라잡기 접종 <sup>5</sup>	따라잡기 접종 <sup>5</sup>	✓✓✓ <sup>6</sup>	✓	
13 - 18세		따라잡기 접종 <sup>5</sup> (Tdap/Td)								따라잡기 접종 <sup>5,6</sup>	따라잡기 접종 <sup>5,7</sup>	

1. 의료제공자가 사용하는 백신에 따라, 아기가 4개월이 되었을 때 1회분의 HepB 백신을 접종 받을 필요가 없을 수도 있습니다.
2. 의료제공자가 사용하는 백신에 따라, 아기가 6개월이 되었을 때 1회분의 Hib 백신 또는 RV 백신을 접종 받을 필요가 없을 수도 있습니다.
3. 대부분의 사람들에게 1회 접종을 권장합니다. 처음으로 독감 백신을 접종 받거나, 또는 이전 독감 시즌(그 시즌에 처음으로 독감 예방 접종을 받은 경우)에 1회만을 접종 받은 9세 미만의 어린이는 이번 시즌에 4주 이상 간격을 두고 2회 접종 받아야 합니다.
4. 아기가 전에 이 백신을 접종 받은 지 6개월이 지난 경우에는 일찍 12개월에 1회분의 DTaP 를 접종 받을 수도 있습니다.

5. 어린이에 대한 백신 접종이 늦어졌거나 백신을 전혀 접종 받지 않은 경우에는 가능한 한 빨리 접종 받아야 합니다.
6. 11세에서 26세까지의 모든 여성과 여아는 HPV 백신을 6개월 이상의 간격을 두고 3회 접종 받아야 합니다. 11세에서 26세까지의 남성과 남아도 성기 사마귀가 발생할 가능성을 줄이기 위해 HPV 백신(Gardasil)을 접종 받을 수 있습니다. 이 백신은 어린이들이 9세가 되었을 때부터 접종 받을 수 있습니다.
7. 대학에 진학하여 기숙사에서 생활할 예정인 10대 자녀는 지금 백신을 접종 받아야 합니다.

**유의사항:** 어떤 어린이들은 추가 접종을 받아야 하는 경우도 있습니다. 의료제공자와 상의하십시오.