

À quel âge les enfants et les adolescents ont-ils besoin d'être vaccinés ?

Âge	HepB Hépatite B	DTC/Tdap Diphtérie, tétanos, coqueluche	Hib <i>Haemophilus influenzae</i> , type B	VPI Polio	VCP13 vaccin conjugué antipneumococcique	RV Rotavirus	ROR Rougeole, oreillons, rubéole	Varicelle	HepA Hépatite A	VPH Virus du papillome humain	MCV4 vaccin conjugué contre la méningite à méningocoques	Influenza Grippe	
À la naissance	✓												
2 mois	✓ (1-2 mois)	✓	✓	✓	✓	✓							
4 mois	✓ ¹	✓	✓	✓	✓	✓							
6 mois		✓	✓ ¹		✓	✓ ¹							
12 mois	✓ (6-18 mois)	✓ ² (15-18 mois)	✓ (12-15 mois)	✓ (6-18 mois)	✓ (12-15 mois)		✓ (12-15 mois)	✓ (12-15 mois)	✓✓ (2 doses données à 6 mois d'intervalle entre 12 et 23 mois)			✓ (Une dose chaque automne ou hiver pour toutes les personnes âgées de 6 mois et plus. Certains enfants de moins de 9 ans peuvent avoir besoin de 2 doses; demandez au prestataire de soins de votre enfant si votre enfant a besoin de plus d'une dose.)	
15 mois													
18 mois													
19-23 mois	Rattrapage ³	Rattrapage ³	Rattrapage ³	Rattrapage ³	Rattrapage ³		Rattrapage ³	Rattrapage ³					
4-6 ans		✓		✓			✓	✓					
7-10 ans		Rattrapage ³											
11-12 ans		✓ (Tdap)			Rattrapage ³			Rattrapage ³	Rattrapage ³	Rattrapage ³	✓✓✓	✓	
13-15 ans		Rattrapage ³ (Tdap)								Rattrapage ³	Rattrapage ³		
16-18 ans												✓	

NOTES

- 1 Votre enfant pourrait ne pas avoir besoin de cette dose, selon le type de vaccin que votre fournisseur de soins utilise.
- 2 Cette dose de DTC peut être administrée dès l'âge de 12 mois si 6 mois se sont écoulés depuis la dose précédente.

- 3 S'il manque certains vaccins à votre enfant ou en cas de retard de vaccination, faites-le vacciner le plus tôt possible. Si votre enfant n'a pas reçu la totalité d'une série de vaccins dans les délais prescrits, seuls les vaccins manquants devront lui être administrés. Il ne sera donc pas nécessaire de tout recommencer.