

# متى يحتاج الأطفال و المراهقون إلى تطعيمات؟

العمر	التهاب الكبد الوبائي (ب)	DTaP/Tdap دفتريا، تيتانوس، السعال الديكي	السحايا إنفلونزا هيروفيلس نوع (ب)	IPV شلل الأطفال	تطعيم النوماكوكال المركب (PCV13)	RV فيروس روتا	التطعيم الثلاثي الحصبة، أبو كعب والحصبة الألمانية	جدري الماء (الفاريسالا)	التهاب الكبد الوبائي (ا)	HPV فيروس الورم الحليمي	MCV4 المكورات السحائية	إنفلونزا Flu
عند الولادة	✓											
شهران	✓ (2-1 شهر)	✓	✓	✓	✓	✓						
4 أشهر	✓ <sup>1</sup>	✓	✓	✓	✓	✓						
6 أشهر		✓	✓ <sup>1</sup>	✓	✓	✓ <sup>1</sup>						
12 أشهر	✓	✓ <sup>2</sup> (15-18 شهر)	✓ (12-15 شهر)	✓ (6-18 شهر)	✓ (12-15 شهر)		✓ (12-15 شهر)	✓ (12-15 شهر)	✓✓ (جرعتان تفصل بينهما 6 أشهر عند 12-23 شهر)			
15 أشهر												
18 أشهر												
19-23 أشهر												
4-6 سنة		✓		✓								
7-10 سنة		تطعيم استدراكي <sup>3</sup>										
11-12 سنة		تطعيم استدراكي <sup>3</sup> (Tdap)									✓	
13-15 سنة		تطعيم استدراكي <sup>3</sup> (Tdap)									تطعيم استدراكي <sup>3</sup>	
16-18 سنة											تطعيم استدراكي <sup>3</sup>	✓

3 إذا كان طفلك قد فاتته التطعيمات أو تأخر في الحصول عليها، فقم بتطعيمه في أسرع وقت ممكن إذ لا يستكمل طفلك سلسلة من التطعيمات في الوقت المحدد فإنه سيحتاج فقط إلى ما تبقى من التطعيمات في هذه السلسلة. ليس هناك حاجة للبدء من جديد.

## الجوانبي

- 1 قد لا يحتاج طفلك الرضيع لهذه الجرعة بحسب نوع اللقاح الذي تستخدمه مزود الرعاية الصحية الخاص بك.
- 2 يمكن إعطاء هذه الجرعة من لقاح الدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي DTaP مبكرا عند عمر 12 شهرا إذا كان قد تم مرور 6 أشهر منذ الجرعة السابقة.

Translation provided by the Immunization Action Coalition

Saint Paul, Minnesota • 651-647-9009 • [www.immunize.org](http://www.immunize.org) • [www.vaccineinformation.org](http://www.vaccineinformation.org)  
[www.immunize.org/catg.d/p4050-20.pdf](http://www.immunize.org/catg.d/p4050-20.pdf) • Item #P4050-20 Arabic (8/14)