

متى يحتاج الأطفال و المراهقون إلى تطعيمات؟

العمر	التهاب الكبد الوبائي (ب)	DTaP/Tdap	السحايا إنفلونزا هيمايفيلس نوع (ب)	IPV شلل الأطفال	PCV تطعيم المنيوماكوكال المركب	RV	التطعيم الثلاثي الخصبة، أبو كعب والخصبة الألتائية	جدري الماء (الفاريسالا)	التهاب الكبد الوبائي (أ)	HPV فيروس الورم الخليمي	MCV4 المكورات السحائية	إنفلونزا Flu
عند الولادة	✓											
شهران	✓ (1-2 شهر)	✓	✓	✓	✓	✓						
4 أشهر	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
6 أشهر		✓	✓		✓	✓						
12 أشهر		✓	✓		✓							
15 أشهر	✓ (6-18 شهر)	✓ (15-18 شهر)	✓ (12-15 شهر)	✓ (6-18 شهر)	✓ (12-15 شهر)	✓ (12-15 شهر)	✓ (12-15 شهر)	✓ (12-15 شهر)	✓ (12-15 شهر)	✓ (12-15 شهر)	✓ (12-15 شهر)	✓ (12-15 شهر)
18 أشهر												
23-19 أشهر		تطعيم استراتيجي	تطعيم استراتيجي	تطعيم استراتيجي	تطعيم استراتيجي		تطعيم استراتيجي	تطعيم استراتيجي				
4-6 سنة		✓		✓			✓	✓				
7-10 سنة		تطعيم استراتيجي					(11/11)					
11-12 سنة		✓ Tdap		تطعيم استراتيجي			تطعيم استراتيجي	تطعيم استراتيجي	تطعيم استراتيجي	✓ ✓ ✓	✓	
13-15 سنة		تطعيم استراتيجي (Tdap)								تطعيم استراتيجي	تطعيم استراتيجي	
16-18 سنة											✓	✓

ما هو "التطعيم الإستراتيجي"؟ إذا كان طفلك قد فاتته التطعيمات الخاصة به تماماً أو تأخر في الحصول عليها، فيجب تطعيمه في أسرع وقت ممكن. إذا لم يكمل طفلك/طفلتك سلسلة التطعيمات في وقتها، فسيحتاج/ستحتاج فقط إلى الحصول على التطعيمات المتبقية في هذه السلسلة. ليس هناك حاجة للبدء من جديد.

الرجاء ملاحظة الآتي: تزايدت حالات السعال الديكي (الشاهوق) لدى الأطفال والمراهقين والبالغين في السنوات القليلة الماضية. للأسف، توفي بعض الأطفال الرضع الذين لم يتمكن التطعيم من حمايتهم بشكل كامل بسبب صغر سنهم. إسأل طبيبك أو الممرضة عما إذا كان أطفالك قد حصلوا على كل حقن تطعيم السعال الديكي المطلوبة لسنهم. أيضاً، إذا لم تكن قد حصلت على حقنة لقاح السعال الديكي، فإنك تحتاج للحصول عليها.