

متى يحتاج الأطفال والمراهقون للحصول على اللقاحات؟

العمر	HepB التهاب الكبد الوبائي ب	DTaP/Tdap الدفتريا والتيبنانوس والشاهوق (السعال الديكي)	Hib المستدمية النزلية من النوع ب	IPV شلل الأطفال	PCV13 المكورات الرئوية المتقارن	RV الفيروسية العجلبية	MMR الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية	الحماق الجدري المائي	HepA التهاب الكبد الوبائي أ	HPV فيروس الورم الحليمي البشري	-Men ACWY المكورات السحائية	MenB المكورات السحائية	الإنفلونزا Flu
عند الولادة (خلال 24 ساعة من الولادة)	✓												
شهرين	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
4 شهور	1✓	✓	✓	✓	✓	✓							
6 شهور	✓	✓	1✓	✓	✓	1✓							✓ (6 شهور وأكبر)
12 شهر			✓				✓✓ (جرعتان بفاصل 6 شهور في عمر 12-23 شهر)	✓ (15-12 شهر)	✓ (15-12 شهر)				
15 شهر		2✓ (18-15 شهر)											
18 شهر													
23-19 شهر													
6-4 سنوات		✓		✓				✓	✓				يوصى بلقاح الإنفلونزا كل عام لكل شخص عمره 6 شهور فأكثر.
10-7 سنوات													
12-11 سنة		✓ (Tdap)								3✓✓	✓		
15-13 سنة													
18-16 سنة											✓	5.4✓✓	

هوامش

- 1 قد لا يحتاج طفلك هذه الجرعة بناءً على الماركة التجارية للقاح الذي يستخدمه مقدم الرعاية الصحية.
- 2 يمكن إعطاء جرعة DTaP هذه مبكرًا عند عمر 12 شهر إذا مضت 6 شهور على الجرعة السابقة.
- 3 سيحتاج الأطفال الذين عندهم حالات طبية مُعَيَّنَة إلى جرعة ثالثة.
- 4 يمكن إعطاء هذا اللقاح للمراهقين الأصحاء، يُوصى به أيضًا للمراهقين الذين عندهم حالات صحية مُعَيَّنَة.
- 5 قد يحتاج المراهق أيضًا إلى جرعة إضافية بناءً على توصية مقدم الرعاية الصحية.

"When Do Children and Teens Need Vaccinations?"

Saint Paul, Minnesota • 651-647-9009 • www.immunize.org • www.vaccineinformation.org
www.immunize.org/catg.d/p4050-20.pdf • Item #P4050-20 Arabic (6/17)