

Çocuklar ve ergenler ne zaman aşılanmalıdır?

Yaş	HepB Hepatit B	DaBT/Tdab Difteri, Boğmaca, Tetanoz	Hib Hemofilus influenza tip b	Çocuk Felci	PCV13 Konjuge pnömokok	RV Rotavirüs	KKK Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak	Suçiçeği	HepA Hepatit A	HPV İnsan papilloma virüsü	MCV4 Konjuge meningokok	Grip	
Doğum	√												
2 ay	√ (1-2 ay)	√	√	√	√	√							
4 ay	√	√	√	√	√	√							
6 ay	√ (6-18 ay)	√	√	√ (6-18 ay)	√	√						√ (6aydan büyük herkese her sonbahar veya kış mevsiminde 1 doz yapılır)	
12 ay		√ (15-18 ay)	√ (12-15 ay)		√ (12-15 ay)	√ (12-15 ay)	√ (12-15 ay)	√ (12-15 ay)	√ (12-15 ay)	√ √ (12-23 aylarda 6 ay ara ile 2 doz yapılır)			
15 ay													
18 ay													
19-23 ay	Kaçırılmış aşı yakalama	Kaçırılmış aşı yakalama	Kaçırılmış aşı yakalama	Kaçırılmış aşı yakalama	Kaçırılmış aşı yakalama		Kaçırılmış aşı yakalama	Kaçırılmış aşı yakalama					
4-6 yaş		√		√			√	√					
7-10 yaş		Kaçırılmış aşı yakalama											
11-12 yaş		√ Tdab		Kaçırılmış aşı yakalama				Kaçırılmış aşı yakalama	Kaçırılmış aşı yakalama	√ √ √	√		
13-15 yaş		Kaçırılmış aşı yakalama (Tdab)								Kaçırılmış aşı yakalama	Kaçırılmış aşı yakalama		
13-18 yaş									Kaçırılmış aşı yakalama	√			

Lütfen Dikkat: Son birkaç yılda çocuklarda, ergenlerde ve erişkinlerde boğmaca olguları artmıştır. Aşılarla tam koruması henüz sağlanamamış bazı bebeklerin ölmesi trajiktir. Doktorunuz veya hemşirenizle çocuğunuzun yaşına göre bütün aşılarının yapılıp yapılmadığını konuşun. Kendi boğmaca aşınızı da henüz yaptırmadıysanız siz de yaptırın.

Kaçırılmış aşı yakalama nedir? Çocuğunuzun aşı zamanı geçmişse en kısa zamanda yaptırın. Bir aşı serisinin zamanında tamamlanmadığı durumlarda çocuğunuzun ihtiyacı sadece eksik kalan aşı dozudur. Aşı serisine baştan başlamaya gerek yoktur