

ኩፍኝ ፡ ጆሮ ደግፍ ፡ እና ሩቤላ ከትባት (ኤምኤምኤር) (MMR)

ማወቅ የሚያስፈልግዎት ነገር

1 ለምን መከተብ ያስፈልጋል?

ኩፍኝ ፡ ጆሮ ደግፍ ፡ እና ሩቤላ ከፋ በሽታዎች ናቸው።

ኩፍኝ

የኩፍኝ ቫይረስ የሚያመጣው-

- ችፍታ • ማለት • ማናፈጥ • ግሪን ማቃጠል • ትኩሳት ሊያስከትል የሚችለው ፡ • የጆሮ መታመም • የብርድ በሽታ
- የመጣል በሽታ (ማንቀጥቀጥ እና ማፍጠጥ) • የአገልግሎት መገዳት
- ሞት

ጆሮ ደግፍ

የጆሮ ደግፍ ቫይረስ የሚያመጣው-

- ትኩሳት • የሬስ ምታት • የዕጢዎች ማበጥ ሊያስከትል የሚችለው ፡
- የጆሮ መደገቀር • ሜንገጃይትስ (የአገልግሎት የአከርካሪ አጥንት ሽፋን በበሽታ መለከፍ) • የወንድ ዘር ፍሬን ወይም ማህጸንን (አቫሪ) የሚያም አብጠት • አልፎ አልፎ ፡ ሞት

ሩቤላ (የጀርመን ኩፍኝ)

ሩቤላ የሚያመጣው-

- ችፍታ • መለስተኛ ትኩሳት ፡ እና • አርተራይትስ (የአጥንት በሽታ) (ብዙውን ጊዜ በሴቶች ላይ)

ሩቤላ

አንድ ሴት በአርግዝናዎ ወቅት ሩቤላ ከደዘት ሊያስወርዳት ወይም ልጇ ከፋ የካል መታገል (በርዝ ድሬከት) ኖሮት ሊወለድ ይችላል።

በሽታው በደዘቸው ሰዎች አጠገብ በመሆን እርሳና ልጆቻችን በሽታዎቹ ሊደዘቹሁ ይችላሉ። ከሰው ወደ ሰው በአየር ይተላለፋሉ።

የኩፍኝ ፡ ጆሮ ደግፍ ፡ እና ሩቤላ (ኤምኤምኤር) (MMR) ከትባት ይህን ሊያስወግድ ይችላል።

አብዛኞቹ የኤምኤምኤር (MMR) መርፌ የሚወጡ ልጆች በሽታው አይዘቹውም። ከትባቱን ብናቀም ተጨማሪ ብዙ ልጆች በሽታው ይደዘቹታል።

2 የኤምኤምኤር (MMR) ከትባት መከተብ ያለበት ማንኛ መቼ ነው?

ልጆች 2 መርፌ የኤምኤምኤር (MMR) ከትባት መወጋት

- ✓ ያስፈልጋቸዋል። የመጀመሪያው ከ12 - 15 ወር ዕድሜ ላይ እና
- ✓ ሁለተኛው በ4 - 6 ዓመት ዕድሜ ላይ።

እነዚህ የሚታዘዙት ዕድሜዎች ናቸው። ነገር ግን የመጀመሪያውን ከተወጡ በኋላ 28 ቀን አስከፊናቸው ድረስ ልጆች ሁለተኛውን መርፌ በማንኛውም ዕድሜ ላይ ሊወጡ ይችላሉ።

አንዳንድ አዋቂ ሰዎችም የኤምኤምኤር (MMR) ከትባት መከተብ ያስፈልጋቸዋል ፡

ባጠቃላይ 18 ዓመት ዕድሜ ወይም ከዚያ በላይ የሆነው ከ1956 በኋላ የተወለደ ማንኛውም ሰው በኋላ አንድ የኤምኤምኤር (MMR) መርፌ መወጋት ያስፈልገዋል ፡ ከትባቱን ተከትለው እንደነበር ወይም በሽታው ይዘቸው እንደነበር ማስረዳት የሚችሉ ከሆኑ በስተቀር።

ለተጨማሪ መረጃ ሐኪምዎን ወይም ነርስዎን ይጠይቁ።

እንደ ሌሎች ከትባቶች የኤምኤምኤር (MMR) ከትባት ባንድ ወቅት ሊሰጥ ይችላል።

3 አንዳንድ ሰዎች የኤምኤምኤር (MMR) መወጋት የለባቸውም ወይም መቆየት አለባቸው።

• ለጀላቲን ፡ አንቲባዮቲክስ ኒዮሚሲን፣ ወይም ከዚህ በፊት ለተወጡት የኤምኤምኤር (MMR) መርፌ ለሕይወት የሚያሰጋ አስርጂ ናፖቸው የሚያውቁ ሰዎች የኤምኤምኤር (MMR) ከትባት መወጋት የለባቸውም።

• መርፌው በታዘዘላቸው ወቅት በመጠኑ ወይም በጽኑ የታመሙ ማናቸውም ሰዎች የኤምኤምኤር (MMR) ከትባት ከመወጋታቸው በፊት ሐመማቸው አስከፊላቸው ጊዜ ድርስ መጠበቅ ያስፈልጋቸዋል።

• አርጉዝ ሴቶች የኤምኤምኤር (MMR) ከትባት ለመከተብ ልጅ ከወለዱ በኋላ አስካለው ጊዜ ድረስ መጠብቅ ያስፈልጋቸዋል። ሴቶች የኤምኤምኤር (MMR) ከትባት ከተከተቡ በኋላ 4 ዓመታት ውስጥ ማርገዝ የለባቸውም።

- አንዳንድ ሰዎች የኤምኤምኤር (MMR) ከትባት መከተብ ያስፈልጋቸው እንደሆነ ሐኪማቸውን ማመከር ያስፈልጋቸዋል ፡ የሚከተሉትንም ጨምሮ ፡
 - (ኤችአይቪ/ኤድስ) HIV/AIDS ወይም የሰውነት በተፈጥሮ ከበሽታ መከላከያ የሚያውክ በሽታ ያለባቸው ሰዎች
 - የሰውነት በተፈጥሮ ከበሽታ መከላከያ በሚህክ መድሐኒት የሚታከም ሰው ፡ እንደ ስቴሮይድስ ያሉትን ለ2 ዓመት ወይም በበለጠ ጊዜ ፡ የኤምኤምኤር (MMR) ከትባት መከተብ ያስፈልጋቸው እንደሆነ ሐኪማቸውን ማመከር ያስፈልጋቸዋል።
 - ማንኛውም ግሪን ካንሰር ያለበት
 - በኤክስ -ሬይ ወይም በመድሐኒት የካንሰር ሕክምና የሚያደርጉ
 - አነስተኛ የፕሌይትሊት መጠን (የደም በሽታ) ናፖቸው የሚውቁ

- በቅርብ ጊዜ ውስጥ ደም የተሰጣቸው ወይም ሌሎች የደም ውጤቶች የተሰጣቸው ሰዎች መቼ የኤምኤምኤር (MMR) ከትባት መከተብ አንዳለባቸው ሐኪማቸውን መጠየቅ ያስፈልጋቸዋል።

ለተጨማሪ መረጃ ሐኪምዎን ወይም ነርስዎን ይጠይቁ።

4 ከ ኤምኤምኤር (MMR) ከትባት የሚመጡ አደጋዎች ምንድን ናቸው?

አንድ ማንኛውም መድሐኒት መርፌ ኃይለኛ አስርጂን የመሰለ ጽኑ ችግርን ማስከትል ይችላል። የኤምኤምኤር (MMR) ከትባት ጽኑ ጉዳትን ወይም ሞትን የሚመጣቱ አደጋ በጣም ትንሽ ነው።

የኤምኤምኤር (MMR) ከትባት መከተብ ከአዘዘህ ከሦስቱ በሽታዎች ውስጥ ባንዱ በመያዝ ካለው አደጋ በጣም የተሻለ ነው።

አባዛኞቹ የኤምኤምኤር (MMR) ከትባት የሚከተቡ ሰዎች በከትባት ምንም ችግሮች የሉባቸውም።

- መለስተኛ ችግሮች :**
- ትኩሳት (1 ሰው ከ 6 ድረስ)
 - መለስተኛ ችፍታ (1 ሰው ከ20 ያህል)
 - በጉንጭ ወይም በአንገት ውስጥ ያሉ ዕጢዎች ማበጥ (አልፎ አልፎ) እነዚህ ችግሮች ከተከሰቱ ፣ ብዙውን ጊዜ ከመርፌው በኋላ ከ7-12 ቀን ውስጥ ነው። ከሁለተኛው መርፌ በኋላ አልፎ አልፎ ይሆናሉ።

- መጠነኛ ችግሮች :**
- በትኩሳት የመጣ መጣል (ማንቀጥቀጥ ወይም ማፍጠጥ) (1 ከ 3,000 ያህል)
 - በመጋጠሚያዎች ላይ ጊዜያዊ ሐመምና ድርቅ ማለት ፣ ብዙውን ጊዜ በገረምሳ/ኮረዳ ወይም በአዋቂ ሴቶች ላይ (1 ከ4 ድረስ)
 - ጊዜያዊ አስተኛ የፕሌይትሌት ብዛት ፣ ይህም የደም መፍሰስ ሁኔታን ያመጣል (1 ከ 30,000 መሬዎች ያህል)

- ጽኑ ችግሮች (በጣም አልፎ አልፎ የሆነ)**
- ኃይለኛ የአስርጂ ሁኔታ (1 ከሚሊዮን መርፌ ባለ)
 - ሌሎች ብዙዎች ችግሮች አንድ ልጅ የኤምኤምኤር (MMR) ከትባት ከተከተበ በኋላ አንደሚከሰቱ ታውቋል። ግን ይህ የሚሆነው በጣም አልፎ አልፎ ነው ፣ የበሽታው አዋቂዎች የችግሮቹ መንገድ ከትባት ይሆን ወይም አይሆን እርግጠኛ አይደሉም። እነሱም የሚያጠቃልሉት፡
 - የጆሮ መደንቀር
 - የረጅም ጊዜ የመጣል ሁኔታ፣ ኮማ ፣ ወይም የቀነሰ የአእምሮ ጎቃት
 - ለዘላለም የአንገል መገዳት

5 መጠነኛ ወይም ኃይለኛ የመርፌ መጣላት (ሪአክሽን) ቢኖርስ?

ምን ምልክትን ማየት ያስፈልገኛል?

ያልተለመዱ ሁኔታዎች ምልክቶች ፣ አንድ ጽኑ አስርጂ፣ ከፍተኛ ትኩሳት፣ ወይም የባህርይ ለውጥ የመሰሉ ሁኔታዎች።

የጽኑ አስርጂ ምልክቶች የሚያጠቃልሉት ከመርፌው በኋላ ከጥቂት ደቂቃዎች እስከ ጥቂት ሰዓቶች ውስጥ ባለው ጊዜ ውስጥ የትገፋሽ ማጠር፣ የድምጽ መገርገር ወይም ማቃተት፣ የቀዳ መጉረብ/ብረብ፣ የቀዳ

መገርጠት፣ መድከም ፣ የልብ ተሎ ተሎ መምታት፣ ወይም የሚከር ምልክቶች። ከፍተኛ ትኩሳት ወይም መጣል ፣ ከተከሰተ ፣ ከመርፌው በኋላ ከ1-2 ሳምንት ውስጥ ይሆናል።

ምን ማድረግ ያስፈልገኛል?

- ለሐኪም ይደውሉ። ወይም ወደ ሐኪም የሚወስድዎትን ሰው በአስቸኳይ ይጥሩ።
- ለሐኪምዎ ምን እንደሆነ ፣ የሆነበትን ቀንና ሰዓት ፣ እንዲሁም መርፌውን መቼ እንደተወጡ ይነገሩ።
- የ'ቫላን አድቫንስ ኢቫንት ሪፖርቲንግ ሊስተም' (ቪኤኤአርኤስ) (VAERS) ቀጽ በመሙላት ስለ አስርጂው ሐኪምዎን ፣ ነርስዎን ፣ ወይም የጤና ክፍልን ይጠይቁ። ወይም ይህን ሪፖርት በ ቪኤኤአርኤስ (VAERS) ዌብሳይት www.vaers.org በኩል ወይም 1-800-822-7967 በመደወል ሊያስገቡ ይችላሉ። ቪኤኤአርኤስ (VAERS) የሐኪምና ምክር አይሰጥም።


6 ብሔራዊ የከትባት ጉዳት መከላከያ ፕሮግራም (The National Vaccine Injury Compensation Program)

አልፎ አልፎ እርሶ ወይም ልጅዎ ከከትባት ብርቱ አስርጂ በሚኖርባቸው ጊዜ ለተገዳው ሰው ሐኪምና ለመስጠት ለከፍተኛ ሊረዳ የሚችል የፈረጋ ፕሮግራም ተቋቁሟል።

ስለ ብሔራዊ የከትባት ጉዳት መከላከያ ፕሮግራም (The National Vaccine Injury Compensation Program) ዝርዝር 1-800-338-2382 ይደውሉ ወይም የፕሮግራሙን ዌብሳይት www.hrsa.gov/osp/vicp ይጎብኙ።

7 በተጨማሪ መመሪያ የምትለው እንዴት ነው?

- ሐኪምዎን ወይም ነርስዎን ይጠይቁ። ስለ ከትባቱ ዝርዝር መረጃ ጸሑፍ ይሰጡዎታል ወይም ስለ ሌሎች የመረጃ ምንጮች ሃሳብ ይሰጡዎታል።
- ለአካባቢዎ ወይም ለስቴት ጤና ክፍል የከትባት ፕሮግራም ይደውሉ።
- ለ Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ይደውሉ፡
 - 1-800-232-4636 (1-800- CDC-INFO) ይደውሉ ወይም
 - የ National Immunization Program ዌብሳይት www.cdc.gov/nip ይጎብኙ።



Vaccine Information Statement
MMR (1/15/03) - Amharic 42 U.S.C. § 300aa-26