

Many Vaccine Information Statements are available in Arabic and other languages.
See www.immunize.org/vis

تتوفر العديد من بيانات المعلومات الخاصة بهذا اللقاح
باللغة العربية، وبلغات أخرى. اطلع على الموقع
www.immunize.org/vis

لقاح فيروس الروتا (الفيروس العجي)

ما تحتاج إلى معرفته

لماذا تتلقى اللقاح؟

1

فيروس الروتا هو فيروس يسبب الإسهال، ويكون ذلك في الغالب لدى الأطفال الرضع والأطفال الصغار. وقد يكون هذا الإسهال شديداً وقد يؤدي إلى الحفاف. ومن الأعراض الشائعة أيضاً الإصابة بالقيء والحمى لدى الأطفال الرضع المصابين بفيروس الروتا.

قبل ظهور لقاح فيروس الروتا، كان مرض فيروس الروتا يمثل مشكلة صحية خطيرة وشائعة لدى الأطفال في الولايات المتحدة. فقد أصيب كل الأطفال في الولايات المتحدة تقريباً مرة واحدة على الأقل بعدها فيروس الروتا قبل بلوغهم سن 5 سنوات.

- قبل أن يتتوفر اللقاح، كانت المعتمد في كل عام أن: 0 يذهب أكثر من 400000 طفل صغير للطبيب بسبب المرض الناتج عن فيروس الروتا،
- ويتجه أكثر من 200000 طفل منهم إلى غرفة الطوارئ،
- ويُحجز في المستشفيات عدد يتراوح بين 55000 و70000 مريض،
- ويموت منهم من 20 إلى 60 طفلاً.

ومنذ ظهور لقاح فيروس الروتا، انخفضت معدلات الحجز في المستشفى وزيارة قسم الطوارئ انخفاضاً جزرياً.

للحاجة إلى اللقاح

2

توجد علامتان تجاريتان للقاح فيروس الروتا. سيحصل طفلك الرضيع إما على جرعتين أو 3 جرعات، بحسب نوع اللقاح المستخدم.

يوصى بأخذ الجرعات في هذه الفئات العمرية:

- الجرعة الأولى: شهران من العمر
- الجرعة الثانية: 4 أشهر من العمر
- الجرعة الثالثة: 6 شهور من العمر (في حالة الحاجة إليها)

يجب أن يحصل طفلك على الجرعة الأولى من لقاح فيروس الروتا قبل أن يبلغ من العمر 15 أسبوعاً، وأن يحصل على الجرعة الأخيرة قريباً من سن 8 شهور. يمكن إعطاء لقاح فيروس الروتا بالتزامن مع تقديم لقاحات أخرى.

يحصل كل الأطفال تقريباً الرضيع الذين يتلقون لقاح فيروس الروتا على الحماية اللازمة من الإسهال الشديد الناجم عن فيروس الروتا. ولن يتعرض معظم هؤلاء الأطفال الرضيع للإسهال الناجم عن فيروس الروتا على الإطلاق.

لن يمنع هذا اللقاح حدوث الإسهال أو القيء الناجمين عن الميكروبات الأخرى.

يمكن العثور على فيروس آخر اسمه الفيروس الحلقي الخنزيري (أو أجزاء منه) في لقاحي فيروس الروتا. وهذا ليس فيروساً يصيب البشر وليس له خطر معروف على سلامة الإنسان. لمزيد من المعلومات، انظر <http://wayback.archive-it.org/7993/20170406124518/> <https://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/Vaccines/ApprovedProducts/ucm212140.htm>



خلاف ذلك، اتصل بطبيبك.

بعد ذلك، ينبغي إخطار “نظام الإبلاغ عن الآثار الجانبية للقاح” (VAERS) بردة الفعل تلك. يمكن أن يتولى طبيبك مهمة كتابة التقرير، أو أن تفعل ذلك بنفسك عبر موقع VAERS الإلكتروني www.vaers.hhs.gov، أو من خلال الاتصال بالرقم 1-800-822-7967.

لا يقدم نظام الإبلاغ عن الآثار الجانبية للقاح (VAERS) نصائح طبية.

البرنامج الوطني للتعويض عن الإصابة من اللقاح

6

البرنامج الوطني للتعويض عن الإصابة من اللقاح (VICP) هو برنامج فيدرالي تم إنشاؤه لتعويض الأشخاص الذين ربما قد تعرضوا لإصابات بسبب بعض اللقاحات.

ويستطيع الأشخاص الذين يعتقدون أنهم تعرضوا لإصابة بسبب اللقاح التعرّف على البرنامج، وتقييم دعوى عن طريق الاتصال بالرقم 1-800-338-2382 أو زيارة موقع البرنامج الوطني للتعويض عن الإصابة من اللقاح (VICP) على العنوان www.hrsa.gov/vaccinecompensation. هناك حد زمني لتقييم دعوى بالتعويض.

كيف يمكنني معرفة المزيد؟

7

- اسأل طبيبك عن ذلك. يمكن للطبيب أن يعطيك النشرة الداخلية للقاح أو يقترح أي مصادر أخرى للمعلومات.
- اتصل بدائرة الصحة المحلية أو التابعة لولايتك.
- اتصل بمرآكز مراقبة الأمراض والوقاية منها (CDC):
- اتصل بالرقم (1-800-CDC-INFO) أو 1-800-232-4636
- قم بزيارة موقع CDC الإلكتروني على العنوان www.cdc.gov/vaccines

المشكلات الخطيرة التي تعقب تلقى لقاح فيروس الروتا:

• الانغلاق هو نوع من انسداد الأمعاء الذي يتم علاجه في المستشفى، وقد يتطلب جراحة. وهو يحدث “طبعياً” لدى بعض الأطفال الرضع سنوياً في الولايات المتحدة، وعادةً ما لا يُعلم سبب محدّد له.

وهناك أيضاً احتمال طفيف للإصابة بالانغلاق جراء التطعيم بلقاح فيروس الروتا، وعادةً ما يكون ذلك في غضون أسبوع من الجرعة الأولى أو الجرعة الثانية. يُقدر هذا الاحتمال الإضافي بنسبة تتراوح بين 1 من كل 20000 طفل رضيع تقريباً و 1 من كل 100000 طفل رضيع في الولايات المتحدة من يحصلون على لقاح فيروس الروتا. يمكن أن يعطيك طبيبك معلومات إضافية.

المشكلات التي قد تظهر عقب تلقى أي لقاح:

- يمكن أن يتسبب أي دواء في الإصابة بحساسية حادة. هذه الحساسية الناجمة عن اللقاح تكون نادرة الحدوث للغاية، وتقدر بأقل من 1 في مليون جرعة، وعادةً ما تحدث في غضون بضع دقائق إلى بضع ساعات من لحظة التطعيم باللقالح.

وكما هو الحال مع أي دواء، فرصة حدوث إصابة شديدة أو وفاة نتيجة اللقالح بعيدة جداً.

دائماً ما تخضع سلامة اللقالحات للمراقبة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.cdc.gov/vaccinesafety

ماذا إذا حدثت مشكلة جسيمة؟

5

عمَّ يجب أن أبحث؟

بالنسبة للانغلاق، ابحث عن علامات ألم المعدة جنباً إلى جنب مع البكاء الشديد. في مرحلة مبكرة، قد تستمر هذه الأعراض لمدة دقائق معدودة وتتأتي وتزول عدة مرات في الساعة الواحدة. قد يسحب الأطفال الرضع سيقانهم إلى أعلى حتى منطقة الصدر.

وقد ينقيأ الطفل الرضيع أحياناً عدة مرات، أو قد يُخرج براجزاً مدمماً، أو قد تبدو عليه علامات الضعف أو التهيج الشديد. تحدث هذه العلامات في العادة خلال أول أسبوع بعد تناول الجرعة الأولى أو الثانية من لقاح فيروس الروتا، ولكن ابحث عنها في أي وقت بعد تناول الطفل لللقالح. ابحث عن أي أعراض تتفاوت، مثل علامات حساسية حادة أو حمى شديدة للغاية أو تغيرات غير عادية في السلوك.

يمكن أن تشمل علامات الإصابة بالحساسية الحادة الشرى وتورم الوجه والحلق، والصعوبة في التنفس، والنعاس غير المعتاد. تبدأ هذه الأعراض عادةً بعد بضع دقائق إلى بضع ساعات من تلقى اللقالح.

ما الذي يتquin على فعله؟

إذا كنت تظن أن هذه الحالة هي انغلاق، فاتصل بالطبيب على الفور. إذا لم تستطع الوصول إلى طبيبك، فاصطحب طفلك إلى مستشفى. أخبرهم موعد تناول طفلك لللقالح فيروس الروتا.

إذا كنت تعتقد أنها حساسية حادة أو حالة طارئة أخرى لا يمكنها الانتظار، فاتصل على رقم 1-9-1 أو قم بتوصيل طفلك إلى أقرب مستشفى.

Vaccine Information Statement Rotavirus Vaccine

02/23/2018

Arabic



42 U.S.C. § 300aa-26

Translation provided by the Immunization Action Coalition