

ថ្នាំបង្ការរោគគ្រុនផ្តាសាយធំ អសកម្ម

អ្វីដែលលោកអ្នកត្រូវដឹង

2009-10

មានសេចក្តីថែទាំមានថ្នាំបង្ការរោគ ជាច្រើន ជាអាណាស្យែន និងអាណាផ្សេងៗទៀត ។ សូមមើលនៅ www.immunize.org/vis ។

1 តើហេតុអ្វីបានជាត្រូវទទួលថ្នាំបង្ការរោគ?

គ្រុនផ្តាសាយធំ “ហ្វូ” (H1N1) គឺជាជំងឺដែលឆ្លងរាលដាល ។

គ្រុនផ្តាសាយធំបានបណ្តាលដោយសារ មេរោគវិរុសគ្រុនផ្តាសាយធំ ដែលអាចឆ្លងតាមរយៈការក្អក ការកណ្តាល ឬសំដៅ ។

រោគផ្សេងទៀតអាចមានសញ្ញារូបរាងដូចគ្នា ហើយជាញឹកញាប់អាចច្រឡំថាជាគ្រុនផ្តាសាយធំ ។ មានតែជំងឺម្យ៉ាងទេ ដែលបានបណ្តាលដោយសារមេរោគវិរុសគ្រុនផ្តាសាយធំ ដែលពិតជាគ្រុនផ្តាសាយធំ ។

អ្នកណាក៏អាចកើតគ្រុនផ្តាសាយធំនេះដែរ ប៉ុន្តែកំរិតធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងជាងគេ គឺក្នុងចំណោមកូនក្មេង ។ មនុស្សភាគច្រើន កើតរោគនេះតែពីរបីថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ ។ វាអាចបណ្តាលឲ្យ :

- គ្រុនក្តៅ
- ឈឺបំពង់ក
- ស្រ្តីស្រែចាញ់
- អស់កំឡាំង
- ក្អក
- ឈឺក្បាល
- ឈឺសាច់ដុំ

មនុស្សខ្លះ ដូចជាទារក មនុស្សចាស់ៗ និងមនុស្សមួយចំនួនដែលមានបញ្ហាសុខភាពខ្លះ អាចឈឺកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើង ។ គ្រុនផ្តាសាយធំ អាចបណ្តាលឲ្យមានគ្រុនក្តៅ និងហើមសួត ព្រមទាំងធ្វើឲ្យលក្ខណៈសុខភាពដែលមានស្រាប់ហើយកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើង ។ វាអាចបណ្តាលឲ្យរាករូស និងប្រកាច់ក្នុងចំណោមកូនក្មេង ។ ជាមធ្យម មនុស្សចំនួន 226,000 នាក់ ត្រូវចូលមន្ទីរពេទ្យជាដេន្ទរាល់ឆ្នាំ ដោយសារតែគ្រុនផ្តាសាយធំ ហើយមនុស្សចំនួន 36,000 នាក់បានស្លាប់ - ភាគច្រើនជាមនុស្សចាស់ៗ ។

ថ្នាំបង្ការរោគគ្រុនផ្តាសាយធំ អាចការពារគ្រុនផ្តាសាយធំបាន ។

2 ថ្នាំបង្ការរោគគ្រុនផ្តាសាយធំអសកម្ម

ថ្នាំបង្ការរោគគ្រុនផ្តាសាយធំ តាមរដូវកាលមានពីរប្រភេទ :

1. ថ្នាំបង្ការរោគគ្រុនផ្តាសាយធំអសកម្ម

(ឯង) ឬហៅថា “flū shot” (ថ្នាំចាក់ការពារគ្រុនផ្តាសាយធំ) ត្រូវបានចាក់ដោយម្ចាស់ចូលទៅក្នុងសាច់ដុំ ។ 2. ថ្នាំបង្ការរោគគ្រុនផ្តាសាយធំសំ (អន់ខ្សោយ)

ត្រូវបានបញ្ជូនចូលតាមរន្ធតូចៗ ។

ថ្នាំបង្ការរោគនេះ គឺបានរៀបរាប់ក្នុងសេចក្តីថែទាំមានថ្នាំបង្ការរោគ មួយដោយឡែកទៀត ។

មេរោគវិរុសគ្រុនផ្តាសាយធំ គឺតែងតែផ្លាស់ប្តូរជាទិញ ។ ដោយសារហេតុនេះ ថ្នាំបង្ការរោគគ្រុនផ្តាសាយធំត្រូវបានធ្វើឲ្យទាន់សភាពការណ៍ ជាដេន្ទរាល់ឆ្នាំ ហើយការបង្ការរោគគួរត្រូវតែបានធ្វើជាប្រចាំឆ្នាំ ។

ជាដេន្ទរាល់ឆ្នាំ ពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខ្សែអាមេរិកបានរៀបចំមេរោគវិរុស ឲ្យត្រូវគ្នានឹងថ្នាំបង្ការរោគដែលងាយនឹងបណ្តាលឲ្យកើតគ្រុនផ្តាសាយធំនៅឆ្នាំនោះ ។ នៅពេលមានការផ្លាស់ប្តូរជិតត្រូវគ្នា ថ្នាំចាក់បង្ការរោគអាចការពារមនុស្សភាគច្រើន អំពីជំងឺធ្ងន់ធ្ងរជាប់ទាក់ទងនឹងរោគគ្រុនផ្តាសាយធំ ។ ប៉ុន្តែសូម្បីតែនៅពេលគ្មាន ការផ្លាស់ប្តូរជិតត្រូវគ្នាក៏ដោយ ក៏ថ្នាំបង្ការរោគអាចការពារបានខ្លះដែរ ។ ថ្នាំបង្ការរោគគ្រុនផ្តាសាយធំ នឹងមានការពារជំងឺ “ដូចគ្រុនផ្តាសាយធំ” ដែលបណ្តាលមកពីមេរោគវិរុស ផ្សេងៗទៀតឡើយ ។

វាប្រើពេលដល់ទៅ 2 អាទិត្យ ក្រោយពីការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគ ទំរាំចាប់ផ្តើមការពារបាន ។ ថ្នាំនេះអាចការពារគ្រុនផ្តាសាយធំបានដល់ទៅមួយឆ្នាំ ។

ថ្នាំបង្ការរោគគ្រុនផ្តាសាយធំអសកម្មមួយចំនួន មានសារធាតុម្យ៉ាងដែលត្រូវបានរក្សាទុក ហៅថា ធ្វើមីរ៉ូសាល (thimerosal) ។ មនុស្សខ្លះបានឲ្យយោបល់ថាសារធាតុ ធ្វើមីរ៉ូសាល អាចទាក់ទងនឹងបញ្ហានៃការរំលូតលាស់របស់កូនក្មេង ។ នៅក្នុងឆ្នាំ 2004 វិទ្យាសាស្ត្របានពិនិត្យពិចារណាសិក្សាជាច្រើន ដោយរកមើលស្រ្តីនេះ ហើយបានសន្និដ្ឋានថាគ្មានភស្តុតាងទំនាក់ទំនងដូចនេះទេ ។ ថ្នាំបង្ការរោគគ្រុនផ្តាសាយធំ ដែលគ្មានសារធាតុធ្វើមីរ៉ូសាល ក៏មានដែរ ។

ថ្នាំបង្ការរោគគ្រុនផ្តាសាយធំ “តាមរដូវកាល” ទាំងនេះ ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីការពារគ្រុនផ្តាសាយធំដែលកើតមានជាប្រចាំឆ្នាំ ។ វាមិនការពារប្រឆាំងនឹងរោគគ្រុនផ្តាសាយធំ រាតត្បាត H1N1 ឡើយ ។

3 តើអ្នកណា គួរតែចាក់ថ្នាំបង្ការរោគគ្រុនផ្តាសាយធំអសកម្ម?

មនុស្សណាម្នាក់ ដែលចង់បន្ថយភាពឈឺថ្នាំ បណ្តាលដោយសារគ្រុនផ្តាសាយធំ ឬការចំឡងគ្រុនផ្តាសាយធំទៅអ្នកដទៃទៀត ។

ក្មេងៗទាំងអស់ ពីអាយុ 6 ខែឡើងទៅ និងមនុស្សចាស់ៗទាំងអស់ :

- ក្មេងៗទាំងអស់ ចាប់តាំងពីអាយុ 6 ខែ រហូតដល់អាយុ 18 ឆ្នាំ ។
- មនុស្សណាម្នាក់ អាយុ 50 ឆ្នាំ ឬចាស់ជាង ។

មនុស្សណាម្នាក់ ដែលបិតក្នុងភាពគ្រោះថ្នាក់នៃគ្រុនផ្តាសាយធំ ឬងាយនឹងត្រូវការនូវការព្យាបាលសុខភាព :

- ស្ត្រីដែលនឹងមានផ្ទៃពោះ ក្នុងកំឡុងពេលរដូវកាលគ្រុនផ្តាសាយធំ ។
- មនុស្សណាម្នាក់ ដែលមានបញ្ហាសុខភាពយូរអង្វែង ជាមួយនឹង :
 - រោគបេះដូង
 - រោគដំរងនោម
 - រោគថ្លើម
 - រោគសួត
 - រោគនៃការបំបែកអាហារ ដូចជា រោគទឹកនោមផ្អែម
 - រោគហឺត
 - រោគខ្លះឈាមក្រហម និងបញ្ហារោគឈាមផ្សេងៗទៀត
- មនុស្សណាម្នាក់ ដែលខ្សោយខាងប្រព័ន្ធស៊ាំរោគ ដោយព្រោះតែ :
 - រោគអេដអាយវិ/អេដ្យូ (HIV/AIDS) ឬរោគផ្សេងៗទៀត ដែលប៉ះពាល់ប្រព័ន្ធស៊ាំរោគ
 - ការព្យាបាលយូរអង្វែង ដោយប្រើថ្នាំដូចជា ថ្នាំស្ទើរិយ
 - ការព្យាបាលរោគមហារីក ដោយប្រើអ៊ីក្យូ-អ៊ី ឬឌីស៊ីត

• មនុស្សណាម្នាក់ ដែលមានបញ្ហាខាងសាច់ដុំ ឬសរសៃប្រសាទអ្វីមួយ (ដូចជាបញ្ហាប្រកាច់ ឬរោគវិកលចរិត) ដែលអាចបណ្តាលឲ្យមានបញ្ហាខាងដកដង្ហើម ឬលេប ។

• មនុស្សណាម្នាក់ អាយុពី 6 ខែ រហូតដល់ 18 ឆ្នាំ ដែលទទួលបានការព្យាបាលដោយប្រើថ្នាំអាស៊ីរីនយូរលង់ (គេអាចនឹងកើតមាននិមិត្តរោគរាយ ដែលអង់គ្លេស ហៅថា Reye Syndrome បើកើតមានគ្រុនផ្តាសាយធំ) ។

• ប្រជាជនរស់នៅក្នុងមន្ទីរថែទាំជំងឺរ៉ាំរ៉ៃផ្សេងៗទៀត ។

មនុស្សណាម្នាក់ ដែលរស់នៅជាមួយ ឬមើលថែមនុស្សដែលបិតក្នុងភាពគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងនឹងរោគគ្រុនផ្តាសាយធំ :

- វេជ្ជបណ្ឌិត និងពេទ្យ ។
- ក្រុមគ្រួសារជិតស្និទ្ធ និងអ្នកមើលថែរក្សាក្មេងៗ ចាប់តាំងពីកំណើត ដល់អាយុ 5 ឆ្នាំ ។
- ក្រុមគ្រួសារជិតស្និទ្ធ និងអ្នកមើលថែរក្សា :
 - មនុស្សអាយុ 50 ឆ្នាំ និងចាស់ជាង ឬ
 - មនុស្សណាម្នាក់ ដែលមានលក្ខណៈរោគា ដែលធ្វើឲ្យគេបិតក្នុងភាពគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងនឹងរោគគ្រុនផ្តាសាយធំ ។

វេជ្ជបណ្ឌិត ក៏អាចឲ្យយោបល់ទៅលើការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគគ្រុនផ្តាសាយធំជាប្រចាំឆ្នាំ សំរាប់ :

- មនុស្សដែលធ្លាប់ការពារជំងឺខាងក្នុងសហគមន៍ ។
- មនុស្សដែលរស់នៅក្នុងទីសំណាក់សំរាប់និស្សិត អ្នករស់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យខ្លួន ឬក្នុងលក្ខណៈណែនាំនានា ដើម្បីការពារកុំឲ្យឆ្លងរាលដាល ។
- មនុស្សដែលបិតក្នុងភាពគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំង នៃគ្រុនផ្តាសាយធំរើកឡើងវិញ ដែលបានធ្វើដំណើរទៅភាគខាងត្បូងពាក់កណ្តាលផែនដី ក្នុងរវាងខែមេសា និងកញ្ញា ឬទៅប្រទេសក្រៅ ឬការធ្វើដំណើរជាប្រទេសផ្សេងទៀត នៅពេលណាមួយ ។

4 តើខ្ញុំគួរតែចាក់ថ្នាំបង្ការរោគគ្រុនផ្តាសាយធំនៅពេលណា?

អ្នកអាចទទួលបានថ្នាំបង្ការរោគ ភ្លាមបន្ទាប់ពីពេលមានថ្នាំ ដែលតាមធម្មតានៅក្នុងរដូវស្លឹកឈើជ្រុះ និងពេលដែលជំងឺកំពុងកើតមាន នៅក្នុងសហគមន៍របស់អ្នក ។ គ្រុនផ្តាសាយធំ អាចកើតមានឡើងក្នុងពេលណាមួយ ពីខែវិច្ឆិកា ដល់ខែឧសភា ប៉ុន្តែពេលវាមានសន្ទុះខ្លាំងបំផុតគឺក្នុងខែមករា ឬកុម្ភៈ ។ ការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគ ក្នុងខែធ្នូ ឬក្រោយជាងនេះទៀត ក៏នៅតែផ្តល់ប្រយោជន៍ច្រើនក្នុងឆ្នាំនោះដែរ ។

មនុស្សភាគច្រើនត្រូវការថ្នាំបង្ការរោគគ្រុនផ្តាសាយធំតែម្តង ក្នុងមួយឆ្នាំ ។ **កូនក្មេងអាយុតិចជាង 9 ឆ្នាំ ដែលចាក់ថ្នាំបង្ការរោគគ្រុនផ្តាសាយធំជាលើកដំបូង** - ឬអ្នកដែលបានចាក់ថ្នាំបង្ការរោគគ្រុនផ្តាសាយធំលើកទីមួយ កាលពីរដូវកន្លងទៅ ប៉ុន្តែបានចាក់តែម្តង - គួរតែចាក់ 2 ដង ដោយឃ្លាតពីគ្នាយ៉ាងតិចបំផុត 4 អាទិត្យទើបការពារបាន ។

ថ្នាំបង្ការរោគគ្រុនផ្តាសាយធំ អាចផ្តល់ឲ្យនៅពេលព្រមគ្នា ជាមួយនឹងថ្នាំបង្ការរោគផ្សេងទៀតដែរ រួមទាំងថ្នាំបង្ការរោគហើមស្កាតផង ។

5 មនុស្សមួយចំនួន គួរតែពិភាក្សាជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យមុននឹងចាក់ថ្នាំបង្ការរោគគ្រុនផ្តាសាយធំ

មនុស្សមួយចំនួន មិនគួរចាក់ថ្នាំបង្ការរោគគ្រុនផ្តាសាយធំអស់កម្រិត ឬគួរតែរង់ចាំសិនមុននឹងចាក់ថ្នាំ ។

- គ្រូប្រាប្រាជ្ញគ្រូពេទ្យរបស់អ្នក លើអ្នកមានប្រតិកម្មខ្លាំងមួយ (យាយីអាយុជីវិត) ។ ការមានប្រតិកម្មនឹងថ្នាំបង្ការរោគគ្រុនផ្តាសាយធំ គឺកម្រមានណាស់ ។
 - ថ្នាំបង្ការរោគគ្រុនផ្តាសាយធំ បានបណ្តុះចេញពីពងសត្វ ។ មនុស្សដែលមានប្រតិកម្មខ្លាំងនឹងពងសត្វ មិនគួរចាក់ថ្នាំបង្ការរោគនេះឡើយ ។
 - អ្នកដែលមានប្រតិកម្មខ្លាំងនឹងគ្រឿងផ្សំមួយនៃថ្នាំបង្ការរោគ ក៏មិនគួរចាក់ថ្នាំបង្ការរោគនេះដែរ ។
 - លើអ្នកធ្លាប់មានប្រតិកម្មខ្លាំង បន្ទាប់ពីចាក់ថ្នាំបង្ការរោគគ្រុនផ្តាសាយធំពីមុនៗ ត្រូវប្រាប្រាជ្ញគ្រូពេទ្យរបស់អ្នក ។
- ប្រាប្រាជ្ញគ្រូពេទ្យរបស់អ្នក លើអ្នកធ្លាប់មានរោគ Guillain-Barré Syndrome (ជារោគកំរិតជួរចង្កូនធ្ងន់ ដែលហៅកាត់ថា GBS ដែរ) ។ អ្នកអាចចាក់ថ្នាំបង្ការរោគនេះ ប៉ុន្តែគ្រូពេទ្យរបស់អ្នកគួរតែជួយអ្នកធ្វើការសម្រេច ។
- មនុស្សដែលឈឺថ្នាំតំបន់មួយ ឬខ្លាំង តាមធម្មតាគួរតែរង់ចាំរហូតទាល់តែជាសះស្បើយ មុននឹងចាក់ថ្នាំបង្ការរោគគ្រុនផ្តាសាយធំ ។ លើអ្នកឈឺថ្នាំតំបន់ ត្រូវពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យ ឬពេទ្យរបស់អ្នក ថាតើគួរតែណាត់ពេលចាក់ថ្នាំបង្ការរោគលើកក្រោយទៀត ឬជាយ៉ាងណា ។ មនុស្សដែលឈឺថ្នាំតំបន់ស្រាលៗ តាមធម្មតាអាចចាក់ថ្នាំបង្ការរោគនេះបាន ។

6 តើមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីខ្លះ បណ្តាលពីថ្នាំបង្ការរោគគ្រុនផ្តាសាយធំអស់កម្រិត?

ថ្នាំបង្ការរោគ ក៏ដូចនឹងថ្នាំផ្សេងៗទៀតដែរ វាអាចបណ្តាលឲ្យមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរ ដូចជាមានប្រតិកម្មខ្លាំង ជាដើម ។ ភាពគ្រោះថ្នាក់នៃថ្នាំបង្ការរោគ ដែលបណ្តាលឲ្យគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរ ឬស្លាប់ គឺមានតិចតួចណាស់ ។

បញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរបណ្តាលពីថ្នាំបង្ការរោគគ្រុនផ្តាសាយធំ គឺកម្រមានណាស់ ។ មេរោគវិរុសនៅក្នុងថ្នាំបង្ការរោគគ្រុនផ្តាសាយធំ ត្រូវបានសំឡាប់ ម៉្លោះហើយអ្នកមិនអាចកើតគ្រុនផ្តាសាយធំ ពីថ្នាំបង្ការរោគឡើយ ។

- បញ្ហាស្រាលៗ :**
- ឈឺសង្កៀវ ឡើងក្រហម ឬហើមនៅត្រង់កន្លែងមុខមួល
 - ស្លាកសំឡេង ឈឺបំពង់ក ឬក្រហមភ្នែក ក្អក និងរមាស់
 - គ្រុនក្តៅ • ឈឺចាប់

លើមានបញ្ហាទាំងនេះកើតឡើង តាមធម្មតាវាចាប់ផ្តើមភ្លាមបន្ទាប់ពីបានចាក់ថ្នាំ ហើយមានរយៈពេលពី 1-2 ថ្ងៃ ។

- បញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរ :**
- ប្រតិកម្មដែលយាយីអាយុជីវិត បណ្តាលពីថ្នាំបង្ការរោគ គឺកម្រមានណាស់ ។ មើសិនជាវាកើតឡើង តាមធម្មតាវាមានក្នុងពេលពីរបីនាទី ទៅពីរម៉ោង បន្ទាប់ពីបានចាក់ថ្នាំ ។
 - នៅក្នុងឆ្នាំ 1976 ថ្នាំបង្ការរោគគ្រុនផ្តាសាយធំមួយប្រភេទហៅថា គ្រុនផ្តាសាយធ្លក (swine flu) ទាក់ទងនឹងរោគ Guillain-Barré Syndrome (GBS) ។ ចាប់តាំងពីគ្រោះមក ថ្នាំបង្ការរោគគ្រុនផ្តាសាយធំបានបង្ហាញច្បាស់លាស់ ថាទាក់ទងនឹងរោគ GBS ទេ ។ ក៏ប៉ុន្តែមើលគ្រោះថ្នាក់នៃរោគ GBS បណ្តាលមកពីថ្នាំបង្ការរោគគ្រុនផ្តាសាយធំ ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ វានឹងពុំមានលើសពី 1 ឬ 2 ករណីក្នុងបណ្តាមនុស្សមួយលាននាក់ ដែលបានចាក់ថ្នាំបង្ការរោគឡើយ ។ នេះគឺតិចយ៉ាងអនេក បើប្រៀបទៅនឹងភាពគ្រោះថ្នាក់ ធ្ងន់ធ្ងរពីគ្រុនផ្តាសាយធំ ដែលអាចការពារបានដោយការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគ ។

7 ចុះបើសិនជាមានប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរវិញនោះ?

តើខ្ញុំគួរតែឃ្នាំរកមើលអ្វី?

លក្ខណៈចំនែកមួយខុសពីធម្មតា ដូចជាគ្រុនក្តៅខ្លាំង ឬអាកប្បកិរិយាប្រែប្រួល ។ សញ្ញានៃប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរ អាចរួមមាន ការពិបាកដកដង្ហើម ស្លាកសំឡេង ឬការគឺងដង្ហើម មានកន្ទួលលើស្បែក ស្លាកស្លាំង ខ្សោយកំឡាំង ចង្វាក់បេះដូងដើរញាប់ៗ ឬវិលមុខ ។

តើខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងណា?

- ទូរស័ព្ទទៅគ្រូពេទ្យ ឬយកមនុស្សនោះទៅជួបគ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់ ។
- ប្រាប្រាជ្ញគ្រូពេទ្យ អំពីអ្វីដែលបានកើតឡើង បានកើតឡើងនៅថ្ងៃខែឆ្នាំណា និងវេលាម៉ោងប៉ុន្មាន ហើយបានទទួលថ្នាំបង្ការរោគពិសេសណា ។
- ស្នើគ្រូពេទ្យរបស់អ្នក ឲ្យរាយការណ៍អំពីប្រតិកម្ម ដោយបំពេញក្រដាសប្រព័ន្ធរាយការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍ប្រតិកម្មថ្នាំបង្ការរោគ (Vaccine Adverse Event Reporting System - VAERS) ។ ឬអ្នកអាចបំពេញសេចក្តីរាយការណ៍នេះ តាមរយៈវិបសៃត៍របស់ VAERS នៅ www.vaers.hhs.gov ឬដោយទូរស័ព្ទទៅលេខ 1-800-822-7967 ។ *VAERS មិនផ្តល់ឱវាទផ្នែកគ្រួសារឡើយ ។*

8 កម្មវិធីជាតិ ធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់បណ្តាលពីថ្នាំបង្ការរោគ

កម្មវិធីរដ្ឋបាលសហព័ន្ធមានជាស្រាប់ ដើម្បីជួយបង់ថ្លៃការថែទាំមនុស្សណាម្នាក់ ដែលមានប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរ ដោយថ្នាំបង្ការរោគ ។

សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែមស្តីអំពី កម្មវិធីជាតិ សំណងគ្រោះថ្នាក់បណ្តាលពីថ្នាំបង្ការរោគ (National Vaccine Injury Compensation Program) សូមទូរស័ព្ទទៅលេខ **1-800-338-2382** ឬមើលវិបសៃត៍របស់គេនៅ www.hrsa.gov/vaccinecompensation ។

9 តើខ្ញុំធ្វើយ៉ាងណា ឲ្យបានយល់ដឹងបន្ថែមទៀត?

- លាកស្តារគ្រូពេទ្យរបស់អ្នក ។ គេអាចផ្តល់ព័ត៌មានដែលមានភ្ជាប់ជាមួយប្រអប់ថ្នាំ ឬផ្តល់យោបល់ពីព័ត៌មានប្រភពផ្សេងៗទៀត ។
- សូមទូរស័ព្ទទៅក្រសួងសុខាភិបាលប្រចាំតំបន់ ឬក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋ ។
- សូមទាក់ទងទៅមណ្ឌលទប់ស្កាត់ និងបង្ការរោគ (Centers for Disease Control and Prevention - CDC) :
 - សូមទូរស័ព្ទទៅលេខ **1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO)** ឬ
 - សូមមើលវិបសៃត៍របស់ CDC នៅ www.cdc.gov/flu

