

ថ្នាំបង្ការរោគ គ្រុនផ្តាសាយធំ 2009 H1N1

ថ្នាំអសកម្ម
 (“ថ្នាំចាក់បង្ការរោគ”)

អ្វីដែលលោកអ្នកត្រូវដឹង

មានសេចក្តីថ្លែងព័ត៌មានថ្នាំបង្ការរោគ ជាច្រើន ជាភាសាអេស៉្បាញ និងជាភាសាផ្សេងៗទៀត ។ សូមមើលទៅ www.immunize.org/vis ។

1 តើគ្រុនផ្តាសាយធំ 2009 H1N1 ជាអ្វី?

គ្រុនផ្តាសាយធំ 2009 H1N1 (កូនកាលេស្វីន Swine Flu) ជាភាសាខ្មែរហៅថា ស្កររោគគ្រុនផ្តាសាយ ឬគ្រុនផ្តាសាយជ្រូក បានបណ្តាលដោយសារពូជមេរោគវីរុសថ្មីនៃគ្រុនផ្តាសាយធំ ។ វាបានឆ្លងរាលដាលទៅប្រទេសជាច្រើន ។

ដូចគ្នានឹងមេរោគគ្រុនផ្តាសាយធំផ្សេងៗទៀតដែរ រោគ 2009 H1N1 ឆ្លងរាលដាលពីមនុស្សម្នាក់ ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀត តាមរយៈការក្អក ការកណ្តស់ ហើយជួនកាលតាមរយៈការប៉ះនឹងវត្ថុអ្វីដែលមានប្រឡាក់មេរោគវីរុស ។

សញ្ញានៃរោគ 2009 H1N1 អាចរួមមាន :

- រហឹមរហៃ
- គ្រុនក្តៅ
- ឈឺបំពង់ក
- ឈឺសាច់ដុំ
- ស្រ្តីស្រាញ
- ក្អក
- កណ្តស់

មនុស្សខ្លះទៀតក៏អាចមានការរាករាស និងក្អកផងដែរ ។

មនុស្សភាគច្រើនបានស្រួលខ្លួនឡើងវិញ ក្នុងពេលមួយអាទិត្យ ។ ប៉ុន្តែមនុស្សមួយចំនួន អាចមានរោគហើមសួត ឬមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀត ។ រីឯមនុស្សខ្លះទៀត នឹងត្រូវចូលសំរាន្តនៅមន្ទីរពេទ្យ ហើយខ្លះទៀតអាចនឹងស្លាប់ ។

2 តើរោគ 2009 H1N1 ខុសគ្នាពីគ្រុនផ្តាសាយធំ (តាមរដូវ) ធម្មតា ដោយរបៀបណា?

មេរោគវីរុសគ្រុនផ្តាសាយធំតាមរដូវ ផ្តាសាយធំមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ ប៉ុន្តែវាមានភាពស្រដៀងនឹងគ្នាណាស់ ។

មនុស្សដែលធ្លាប់កើតមានគ្រុនផ្តាសាយធំ នៅពេលកន្លងទៅ តាមធម្មតាមានភាពស្ងប់រោគខ្លះ ចំពោះនឹងមេរោគវីរុសគ្រុនផ្តាសាយធំតាមរដូវ (ខ្លួនប្រាណរបស់គេបានកើនសមត្ថភាពខ្លះ ដើម្បីតតាំងនឹងមេរោគវីរុស) ។

មេរោគវីរុសគ្រុនផ្តាសាយធំ 2009 H1N1 គឺជាពូជមេរោគវីរុសគ្រុនផ្តាសាយធំថ្មីមួយ ។ វាមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំង អំពីមេរោគវីរុសគ្រុនផ្តាសាយធំតាមរដូវ ។

មនុស្សភាគច្រើនមានភាពស្ងប់រោគបន្តិចបន្តួច ឬគ្មានភាពស្ងប់រោគសោះ ចំពោះគ្រុនផ្តាសាយធំ 2009 H1N1 (ខ្លួនប្រាណរបស់គេមិនបានប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីតតាំងនឹងមេរោគវីរុសឡើយ) ។

3 ថ្នាំបង្ការរោគគ្រុនផ្តាសាយធំ 2009 H1N1

សព្វថ្ងៃនេះមានថ្នាំបង្ការរោគ ដើម្បីការពារប្រឆាំងនឹងគ្រុនផ្តាសាយធំ 2009 H1N1 ។

- ថ្នាំបង្ការរោគទាំងនេះ គឺបានផលិតឡើងដូចគ្នានឹងថ្នាំបង្ការរោគគ្រុន ផ្តាសាយធំតាមរដូវដែរ ។
- ថ្នាំទាំងនេះត្រូវបានរំពឹងថាមានសុវត្ថិភាព និងមានប្រសិទ្ធភាពដូចគ្នានឹងថ្នាំបង្ការរោគគ្រុនផ្តាសាយធំតាមរដូវដែរ ។
- ថ្នាំទាំងនេះនឹងមិនការពារជំងឺ “ដូចគ្រុនផ្តាសាយធំ” ដែលបានបណ្តាលមកពីមេរោគវីរុសផ្សេងៗទៀតឡើយ ។
- ថ្នាំទាំងនេះនឹងមិនការពារគ្រុនផ្តាសាយធំតាមរដូវទេ ។ **បើអ្នកចង់ការពារកុំឱ្យឆ្លងគ្រុនផ្តាសាយធំតាមរដូវ អ្នកគួរតែចាក់ថ្នាំបង្ការរោគគ្រុនផ្តាសាយធំតាមរដូវផងដែរ ។**

ថ្នាំបង្ការរោគអសកម្ម (ថ្នាំបង្ការរោគដែលបានសំឡាប់មេរោគវីរុសនៅក្នុងវា) ត្រូវបានចាក់ចូលទៅក្នុងសាច់ដុំ ដូចគ្នានឹងការចាក់ថ្នាំការពារគ្រុនផ្តាសាយធំ ជាប្រចាំឆ្នាំដែរ ។ **សន្លឹកនេះរៀបរាប់ អំពីថ្នាំបង្ការរោគអសកម្ម ។**

សព្វថ្ងៃនេះក៏មានថ្នាំបង្ការរោគរស់ បាញ់តាមច្រមុះ (ថ្នាំបង្ការរោគបាញ់ចូលតាមច្រមុះ) ផងដែរ ។ ព័ត៌មានអំពីថ្នាំនេះ មានរៀបរាប់នៅសន្លឹកមួយដោយឡែកទៀត ។

ថ្នាំបង្ការរោគអសកម្ម 2009 H1N1 មួយចំនួន មានសារធាតុរក្សាទុកមួយហៅថា ធ័រម៉េរ៉ូសាល់ (thimerosal) ដើម្បីរក្សាភាពរឹងមាំមានមេរោគ ។ មនុស្សខ្លះគេក៏បានឲ្យយោបល់ថា សារធាតុធ័រម៉េរ៉ូសាល់ អាចនឹងជាប់ទាក់ទងចំពោះរោគមនោវិកត គឺជំងឺរដិរវាយ និងរោគវិញ្ញាណក្នុងកុមារវ័យ ។ នៅក្នុងឆ្នាំ 2004 ពួកអ្នកជំនាញមួយក្រុមនៅវិទ្យាស្ថានពេទ្យ (Institute of Medicine) បានពិនិត្យមើលឡើងវិញ អំពីការសិក្សាជាច្រើន ដោយរកមើលទៅលើទ្រឹស្តីនេះ ហើយពុំបានរកឃើញទំនាក់ទំនងអ្វី រវាងនិងសារធាតុធ័រម៉េរ៉ូសាល់ និងរោគមនោវិកតឡើយ ។ ចាប់តាំងពីពេលនោះមក ការសិក្សាបន្ថែមក៏បានធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានថា ។

4 តើអ្នកណាខ្លះ គួរតែទទួលថ្នាំបង្ការរោគគ្រុនផ្តាសាយធំ 2009 H1N1 និងនៅពេលណា?

អ្នកណាខ្លះ

ក្រុមមនុស្សដែលបានឲ្យយោបល់ ដើម្បីទទួលថ្នាំបង្ការរោគ 2009 H1N1 ជាដំបូងគេគឺ :

- ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ
- មនុស្សរស់នៅនៅក្នុងមួយ ឬមើលថែទាំទារក អាយុក្មេងជាង 6 ខែ
- អ្នកថែរក្សាសុខភាព និងបុគ្គលិកពេទ្យផ្នែកសង្គ្រោះភាពអាសន្ន
- មនុស្សណាម្នាក់ មានអាយុចាប់តាំងពីអាយុ 6 ខែ រហូតដល់អាយុ 24 ឆ្នាំ
- មនុស្សណាម្នាក់ មានអាយុចាប់តាំងពីអាយុ 25 ឆ្នាំ រហូតដល់អាយុ 64 ឆ្នាំ ដែលមានលក្ខណៈរោគាវុរិះ ឬខ្សោយប្រព័ន្ធសុំរោគ

នៅពេលណាមានថ្នាំបង្ការរោគថែមទៀត ក្រុមទាំងនេះក៏គួរតែបានចាក់ថ្នាំបង្ការរោគដែរ :

- មនុស្សមានសុខភាពល្អ អាយុ 25 ឆ្នាំ រហូតដល់ 64 ឆ្នាំ
- មនុស្សចាស់អាយុ 65 ឆ្នាំ និងចាស់ជាង

រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធកំពុងតែផ្តល់ថ្នាំបង្ការរោគនេះ សំរាប់មនុស្សព្រមទទួលដោយស្ម័គ្រចិត្ត ។ តែជាយ៉ាងណាមិញ ច្បាប់រដ្ឋ ឬក្រុមហ៊ុនការងារ អាចនឹងផ្សំឲ្យមានការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគ សំរាប់មនុស្សមួយចំនួន ។

ពេលវេលា

ត្រូវចាក់ថ្នាំបង្ការរោគ យ៉ាងតិចបំរើសនៅពេលមានថ្នាំបង្ការរោគ ។

ក្មេងៗមានអាយុរហូតដល់ទៅ 9 ឆ្នាំ គួរតែទទួលថ្នាំបង្ការរោគពីរដូស្យ គឺពីរកំរិតចន្លោះគ្នាប្រហែលជាពីរខែ ។ ក្មេងៗដែលចាស់ជាង និងមនុស្សចាស់ ត្រូវការតែមួយដូស្យប៉ុណ្ណោះ ។

5 មនុស្សខ្លះមិនគួរតប្រឺទទួលថ្នាំបង្ការរោគទេ ឬគួរតែរង់ចាំ

បើអ្នកមានប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរ (ការគំរាមកំហែងជីវិត) ដោយមានប្រតិកម្មនឹងពងសត្វ ឬសារធាតុផ្សេងទៀតនៅក្នុងថ្នាំបង្ការរោគ អ្នកមិនត្រូវទទួលថ្នាំ 2009 H1N1 ទេ ។ បើអ្នកមានប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរអ្វីមួយ ត្រូវប្រាប់មនុស្សដែលផ្តល់ថ្នាំបង្ការរោគឲ្យអ្នក ។

- ក៏ត្រូវប្រាប់គេដែរ បើអ្នកធ្លាប់មាន :
- ប្រតិកម្មដែលគំរាមកំហែងជីវិត បន្ទាប់ពីទទួលថ្នាំបង្ការរោគគ្រុនផ្តាសាយធំតាមរដូវ មួយដូស្យ គឺមួយកំរិត
 - រោគ Guillain-Barré Syndrome (ជារោគកំរិតពង្រីកដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ ដែលកំហែងកាត់ថា GBS ដែរ) ។

ថ្នាំទាំងនេះមិនអាចនឹងជាមូលហេតុ ដើម្បីជៀសវាងថ្នាំបង្ការរោគទេ ប៉ុន្តែបុគ្គលិកពេទ្យ អាចជួយអ្នកសំរេចបាន ។

បើអ្នកមានជំងឺធុនស្រាល ឬធ្ងន់ធ្ងរ យើងឲ្យឱ្យអ្នកឲ្យរង់ចាំទំរាំអ្នកបានចូរស្បើយសិន មុននឹងទទួលថ្នាំបង្ការរោគ ។ បើអ្នកមានគ្រុនផ្តាសាយធុនស្រាល ឬមានជំងឺផ្សេងៗទៀត តាមធម្មតាមិនបាច់រង់ចាំទេ ។

ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ ឬស្ត្រីបំបៅដោះកូន អាចទទួលថ្នាំបង្ការរោគគ្រុនផ្តាសាយធំ 2009 H1N1 អសកម្មបាន ។

ថ្នាំបង្ការរោគ 2009 H1N1 អសកម្ម អាចនឹងបានឲ្យនៅ ពេលព្រមគ្នា ដូចថ្នាំបង្ការ រោគផ្សេងៗទៀតដែរ រួមទាំងថ្នាំបង្ការរោគគ្រុនផ្តាសាយធំតាមរដូវផង ។

6 តើមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីខ្លះ បណ្តាលមកពីថ្នាំ 2009 H1N1?

ថ្នាំបង្ការរោគ ក៏ដូចនឹងផ្សេងៗទៀតដែរ ដែលអាចបណ្តាលឲ្យមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរ ដូចជា មានប្រតិកម្មខ្លាំង ជាដើម ។ ប៉ុន្តែភាពគ្រោះថ្នាក់នៃថ្នាំបង្ការរោគណាមួយ ដែលបណ្តាល ឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរ ឬស្លាប់ គឺមានតិចតួចពេកណាស់ ។

មេរោគវិសុននៅក្នុងថ្នាំបង្ការរោគ 2009 H1N1 អសកម្ម ត្រូវបានសំលាប់ហើយ ដូច្នេះហើយ អ្នកមិនអាចកើតគ្រុនផ្តាសាយធំ អំពីថ្នាំបង្ការរោគឡើយ ។

ភាពគ្រោះថ្នាក់បណ្តាលមកពីថ្នាំបង្ការរោគ 2009 H1N1 អសកម្ម គឺស្រដៀងគ្នានឹង ថ្នាំបង្ការរោគគ្រុនផ្តាសាយធំអសកម្ម តាមរដូវដែរ :

- បញ្ហាស្រាលៗ :**
- ឈឺសង្កែប ឡើងក្រហម ឈឺយ៉ាងខ្លាំង ឬហើមនៅត្រង់កន្លែងមុខម្តុល
 - សន្លប់ស្មារតី (ភាគច្រើនក្នុងពួកជំងឺទង់ៗ)
 - ឈឺក្បាល ឈឺសាច់ដុំ • គ្រុនក្តៅ • រមួលពោះ

បើមានបញ្ហាទាំងនេះកើតឡើង តាមធម្មតាវាចាប់ផ្តើមភ្លាមបន្ទាប់ពីបានចាក់ថ្នាំ ហើយ មានរយៈពេលពី 1-2 ថ្ងៃ ។

- បញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរ :**
- ប្រតិកម្មដែលគំរាមកំហែងជីវិត ទៅនឹងថ្នាំបង្ការរោគ គឺកម្រមានណាស់ ។ បើ សិនជាវាកើតឡើង តាមធម្មតាវាមានក្នុងពេលពីរបីនាទី ទៅពីរម៉ោង បន្ទាប់ពី បានទទួលថ្នាំបង្ការរោគ ។
 - នៅក្នុងឆ្នាំ 1976 ប្រភេទដំបូងនៃថ្នាំបង្ការរោគផ្តាសាយ (swine flu ឬគ្រុន ផ្តាសាយជ្រូក) បានជាប់ទាក់ទងជាមួយនឹងករណីនៃរោគ Guillain-Barré Syndrome (GBS) ។ ចាប់តាំងពីពេលនោះមក ថ្នាំបង្ការរោគគ្រុនផ្តាសាយធំ មិនបានជាប់ទាក់ទងគ្នាច្បាស់ណាស់ ទៅនឹងរោគ GBS ទេ ។

7 ចុះបើសិនជាមានប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរវិញនោះ?

តើខ្ញុំគួរតែឃ្នាំរកមើលអ្វី?

លក្ខណៈចំឡែកអ្វីមួយខុសពីធម្មតា ដូចជាគ្រុនក្តៅខ្លាំង ឬអាកប្បកិរិយាប្រែប្រួល ។ សញ្ញានៃប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរ អាចរួមមាន ការពិបាកដកដង្ហើម ស្លុកស្លែង ឬការតឹងដង្ហើម មានកន្ទួលលើស្បែក ស្លែកស្លាំង ខ្សោយកំឡាំង ចង្វាក់បេះដូងដើរញាប់ៗ ឬរិលមុខ ។

តើខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងណា?

- ទូរស័ព្ទទៅគ្រូពេទ្យ ឬយកមនុស្សនោះទៅជួបគ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់ ។
- ប្រាប់គ្រូពេទ្យ អំពីអ្វីដែលបានកើតឡើង បានកើតឡើងនៅថ្ងៃខែឆ្នាំណា និងវេលា ម៉ោងប៉ុន្មាន ហើយបានទទួលថ្នាំបង្ការរោគពិពេលណា ។
- ស្នើគ្រូពេទ្យរបស់អ្នក ឲ្យរាយការណ៍អំពីប្រតិកម្ម ដោយបំពេញក្រដាសប្រព័ន្ធរាយ ការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍ប្រតិកម្មថ្នាំបង្ការរោគ (Vaccine Adverse Event Reporting System - VAERS) ។ ឬអ្នកអាចបំពេញសេចក្តីរាយការណ៍នេះ តាមវិបសៃត៍របស់ VAERS នៅឯ www.vaers.hhs.gov ឬដោយទូរស័ព្ទទៅលេខ 1-800-822-7967 ។

VAERS មិនផ្តល់ឱ្យវាទផ្នែកសុខភាពឡើយ ។

8 ការធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់ បណ្តាលមកពី ថ្នាំបង្ការរោគ

បើរូបអ្នក ឬកូនរបស់អ្នក មានប្រតិកម្មទៅនឹងថ្នាំបង្ការរោគ សមត្ថភាពរបស់អ្នក ដើម្បីប្តឹងផ្តល់ គឺបានកំរិតដោយច្បាប់ ។

តែជាយ៉ាងណាមិញ កម្មវិធីនៃរដ្ឋបាលសហព័ន្ធ បានបង្កើតឡើងដើម្បីជួយបង់ថ្លៃ ការថែទាំគ្រោះថ្នាក់ និងការចំណាយផ្សេងៗទៀត សំរាប់មនុស្សមួយចំនួន ដែលមាន ប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរ ទៅនឹងថ្នាំបង្ការរោគនេះ ។ សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីកម្មវិធីនេះ សូមទូរស័ព្ទលេខ 1-888-275-4772 ឬមើលវិបសៃត៍របស់កម្មវិធី នៅឯ :

www.hrsa.gov/countermeasurescomp/default.htm ។

9 តើខ្ញុំធ្វើយ៉ាងណា ឲ្យបានយល់ដឹងបន្ថែមទៀត?

- សាកសួរគ្រូពេទ្យរបស់អ្នក ។ គេអាចផ្តល់ព័ត៌មានដែលមានភ្ជាប់ជាមួយប្រអប់ថ្នាំ ឬផ្តល់យោបល់អំពីប្រភពព័ត៌មានផ្សេងៗទៀត ។
- សូមទូរស័ព្ទទៅក្រសួងសុខាភិបាលប្រចាំតំបន់ ឬក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋ ។
- សូមទាក់ទងទៅមណ្ឌលសំរាប់ទប់ស្កាត់ និងបង្ការជំងឺ (Centers for Disease Control and Prevention - CDC) :
 - សូមទូរស័ព្ទទៅលេខ 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) ឬ
 - សូមមើលវិបសៃត៍របស់ CDC នៅ www.cdc.gov/h1n1flu ឬ www.cdc.gov/flu
- សូមមើលវិបសៃត៍នៅឯ www.flu.gov