

PNEUMOCOCCAL POLYSACCHARIDE

ថ្នាំចាក់បង្ការជម្ងឺរលាកសួត នម្មកូកុល-ផលីសាការីដ៍

អ្វីដែលអ្នកចាំបាច់ត្រូវដឹង

មានព័ត៌មានប្រែប្រួលអំពីថ្នាំបង្ការរោគជាច្រើនជាភាសាអង់គ្លេស និងភាសាខ្មែរនៅទៀត។ សូមចុចទៅ www.immunize.org/vis ។

1 ជម្ងឺ Pneumococcal

ជម្ងឺ Pneumococcal បណ្តាលមកពីមេរោគម្យ៉ាងឈ្មោះ *Streptococcus pneumoniae* ។ វាជាបុព្វហេតុចេញមុខ បណ្តាលឱ្យមានជម្ងឺដែលធ្វើឱ្យមានការចាក់ថ្នាំបង្ការ និងមានសេចក្តីស្លាប់ នៅក្នុងសហរដ្ឋ។ អ្នកណាម្នាក់ក៏អាចមានជម្ងឺរលាកសួតបានដែរ ប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះអាចមានគ្រោះថ្នាក់ជាង អ្នកខ្លះទៀត៖

- មនុស្សអាយុ៦៥ឆ្នាំឡើងទៅ
- មនុស្សក្មេងបំផុត
- មនុស្សមានបញ្ហាសុខភាពផ្សេងៗ
- មនុស្សដែលមានប្រព័ន្ធសំរាប់ឱ្យស្តាំដល់រោគនានា-ចុះខ្សោយ
- មនុស្សជក់បារី

ជម្ងឺ Pneumococcal អាចនាំឱ្យខូចដល់៖

- សួត (Pneumonia)
- ឈាម (Bacteremia) និង
- ស្រោមខួរក្បាល (Meningitis)

ជម្ងឺរលាកសួត Pneumococcal អាចសម្លាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោម ២០ នាក់ដែលមានរោគ។ រោគ Bacteremia អាចសម្លាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោម ៥ នាក់ ហើយរោគ Meningitis អាចសម្លាប់មនុស្ស៣នាក់ ក្នុងចំណោម ១០ នាក់។

អ្នកណាដែលមានបញ្ហាសុខភាពដូចបានរៀបរាប់ក្នុងផ្នែកទី៣ ភាគច្រើនប្រហែលអាចស្លាប់នឹងជម្ងឺនេះ។

2 ថ្នាំចាក់បង្ការរោគ Pneumococcal polysaccharide (PPSV)

ការព្យាបាលការឆ្លងជម្ងឺ Pneumococcal ដោយប្រើថ្នាំ Penicillin និងថ្នាំផ្សេងៗទៀតធ្លាប់តែមានប្រសិទ្ធភាពគ្រាន់បើ។ ប៉ុន្តែមានបណ្តាញជម្ងឺខ្លះៗអាចទប់ទល់នឹងថ្នាំបាន។ ដូច្នេះធ្វើឱ្យការទប់ទល់នឹងជម្ងឺផ្សេងៗដោយប្រើការចាក់ថ្នាំវិវត្ត តែសំខាន់ទៅទៀត។

ថ្នាំចាក់បង្ការ PPSV អាចការពារមេរោគ Pneumococcal បាន២៣បែប ដោយរួមទាំងជម្ងឺណាដែលនឹងអាចបង្កឱ្យឈឺខ្លាំងផង។

មនុស្សចាស់ណាដែលមានសុខភាពល្អ ហើយដែលបានចាក់ថ្នាំបង្ការ អាចការពារបាននឹងជម្ងឺប្រហែលនេះ ភាគច្រើនក្នុងរយៈពេល២៣ខែក្រោយចាក់ថ្នាំរួច។ មនុស្សចាស់ជរា — ក្មេងៗក្រោម២ឆ្នាំ និងមនុស្សណាដែលមានជម្ងឺរ៉ាំរ៉ៃមកហើយមិនសូវជាត្រូវជាមួយថ្នាំនេះឡើយ ឬក៏អត់សោះតែម្តង។

មានថ្នាំចាក់ Pneumococcal មួយទៀតឈ្មោះ Pneumococcal Conjugate Vaccine – PCV ដែលតែងតែណែនាំជាប្រចាំសំរាប់ឱ្យក្មេងក្រោមអាយុ៥ឆ្នាំប្រើ។ PCV នឹងរៀបរាប់នៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងមួយទៀត។

3 តើអ្នកណាត្រូវទទួល PPSV?

- មនុស្សចាស់ទាំងអស់អាយុពី ៦៥ឆ្នាំឡើងទៅ។
- មនុស្សពី២ទៅ៦៤ឆ្នាំ ដែលមានបញ្ហាសុខភាពយូរអង្វែងមកហើយដូចជា៖
 - ជម្ងឺបេះដូង
 - ជម្ងឺសួត
 - ជម្ងឺក្នុងកោសិកា
 - ទឹកនោមផ្អែម
 - ញាតត្រឿងស្រវឹង
 - ជម្ងឺថ្លើម
 - មានធាយទឹកនៅសរសៃជាប់ខួរក្បាលនិងឆ្អឹងខ្នង ឬនៅកន្លែងបញ្ចូលសិរីរាង cochlear
- មនុស្សពី២ទៅ៦៤ឆ្នាំណាដែលមានជម្ងឺ ឬមានលក្ខណៈធ្វើឱ្យខ្លួនចេះតែខ្សោយទៅៗ ក្នុងការទប់ទល់នឹងការឆ្លងដូចជា៖
 - ជម្ងឺ Hodgkin
 - ជម្ងឺដុះសាច់នៅសរសៃឈាមកោសិកា-ស ឬមហារីកឈាម
 - ខូចតំរងទឹកនោម
 - មានដុះសាច់នៅក្នុងខួរឆ្អឹងជាច្រើន
 - សញ្ញាមិនធម្មតានៅមុំតំរងទឹកនោម
 - ជម្ងឺ HIV/AIDS
 - ខូច សិរីរាង spleen ឬគ្មាន spleen
 - ការវះកាត់បួរសិរីរាង
- មនុស្សពី២ទៅ៦៤ឆ្នាំណាដែលប្រើថ្នាំឬមានការព្យាបាលដើម្បីធ្វើឱ្យខ្លួនចេះតែខ្សោយទៅៗ ក្នុងការទប់ទល់នឹងការឆ្លងដូចជា៖
 - ប្រើថ្នាំ Steroids អស់រយៈពេលយូរ
 - ថ្នាំមហារីកខ្លះ
 - បញ្ចាំងភ្លើងបញ្ចូលថាមពល
- មនុស្សពី ១៩ ទៅ ៦៤ឆ្នាំ ណាដែល៖
 - ជាអ្នកជក់បារី
 - មានរោគប៊ឺត

PPSV ប្រហែលជាមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពដល់មនុស្សខ្លះ ពិសេសអ្នកដែលមិនសូវទប់ទល់នឹងការឆ្លងបាន។

ប៉ុន្តែមនុស្សទាំងនេះគួរតែត្រូវបានចាក់ថ្នាំបង្ការព្រោះពួកគេនឹងមានការលំបាកក្នុងការតែងតាំង បើគេមានជម្ងឺ Pneumococcal ។

ក្មេងដែលតែងតែមានជម្ងឺដំបៅត្រចៀក ជម្ងឺតឹងច្រមុះជាទិញ ឬជម្ងឺនឹងបំពង់ដកដង្ហើមផ្នែកខាងលើ ប៉ុន្តែនៅតែមានសុខភាពល្អដែរនោះ មិនចាំបាច់ត្រូវការ PPSV ទេព្រោះវានឹងគ្មានប្រសិទ្ធភាពចំពោះលក្ខណៈនោះឡើយ ។

4 តើត្រូវការថ្នាំ PPSV ក្នុងបំណងទៅ ហើយនៅពេលណា?

ធម្មតាត្រូវការតែមួយកំរិតទេ តែក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្លះអាចត្រូវការពីរកំរិត ។

- កំរិតទី២ត្រូវបានណែនាំសំរាប់មនុស្ស៦៥ឆ្នាំឡើងទៅ ដែលបានទទួលកំរិតទី១កាលពី- នៅក្រោមអាយុ៦៥ឆ្នាំហើយដែលបានទទួល៥ឆ្នាំឡើងទៅ ក្រោយពីកំរិតទី១ ។
- កំរិតទី២ត្រូវបានណែនាំសំរាប់មនុស្សអាយុ ២ឆ្នាំ រហូតដល់ ៦៤ ឆ្នាំ ដែល៖
 - មានការខូចខាត ជាលក្ខណៈ Spleen ឬក៏គ្មាន ជាលក្ខណៈ
 - មានជម្ងឺដែលមានកោសិការាងដូចកណ្តុរ
 - បានឆ្លងរោគ HIV និង AIDS
 - មានមហារីក ជម្ងឺដុះសាច់នៅសរសៃឈាមកោសិការ-ស ឬមហារីកឈាម មានដុះសាច់នៅក្នុងខួរឆ្អឹងជាច្រើន
 - មានសញ្ញាមិនធម្មតានៅមុំតំរង់ទឹកនោម
 - ការរក្សាប្រព័ន្ធប្រយុទ្ធជាមេរោគ ឬប្រព័ន្ធជាមេរោគ
 - ដែលកំពុងតែប្រើថ្នាំដើម្បីឱ្យភាពស្ងប់ចុះថយ (ដូចជាការព្យាបាល បញ្ចាំងក្លែងបញ្ចូលថាមពល និងថ្នាំ Steroids អស់រយៈពេលយូរ)

ពេលត្រូវការទទួលកំរិតទី២ ត្រូវចាំ៥ឆ្នាំសិនក្រោយពេលទទួលកំរិតទី១ ។

5 អ្នកខ្លះមិនត្រូវទទួល PPSV ឬត្រូវរង់ចាំ

- អ្នកណាដែលមានប្រតិកម្មនឹងថ្នាំ PPSV ដល់ទៅស្លាប់រស់ មិនត្រូវទទួលកំរិតទី២ទេ ។
- អ្នកណាដែលមានប្រតិកម្មខ្លាំងនឹងផ្នែកមួយនៃថ្នាំ មិនត្រូវទទួលថ្នាំនោះទេ ។ សូមប្រាប់ទៅអ្នកថែទាំរបស់អ្នកបើសិនអ្នកមានប្រតិកម្មខ្លាំង ។
- អ្នកណាដែលឈឺចាប់ល្មម ឬខ្លាំងចំពេលដែលការចាក់ថ្នាំបានគ្រោងទុក ប្រហែលត្រូវសុំឱ្យរង់ចាំ រហូតស្រួលខ្លួនវិញទើបទទួលការចាក់ថ្នាំ ។ អ្នកណាឈឺតិចតួចអាចចាក់ថ្នាំបាន ។
- ទោះជាគ្មានភ័ស្តុតាងថាថ្នាំ PPSV មានគ្រោះថ្នាក់ដល់ស្ត្រីមានគិកឬកូនក្នុងផ្ទៃក៏ ថ្នាំនេះមិនគួរចាក់ទេនៅពេលមានផ្ទៃពោះ ។ ស្ត្រីមានគិកដែលមានជម្ងឺរ៉ាំរ៉ៃ គួរពិភាក្សា ជាមួយអ្នកផ្តល់សុខភាពសិនមុនទទួលថ្នាំថ្នាំ ។ ស្ត្រីណាដែលមានលក្ខណៈមិនល្អស្រាប់ដឹង ថានឹងមានគ្រោះថ្នាក់ចំពោះជម្ងឺ Pneumococcal ត្រូវចាក់ថ្នាំមុនពេលមានគិក បើអាចធ្វើទៅបាន ។

6 តើថ្នាំ PPSV មានគ្រោះថ្នាក់អ្វីខ្លះ?

ប្រហែលមានមនុស្សចាក់ថ្នាំ PPSV ពាក់កណ្តាលដែលអាចមានហេតុផលមិនល្អ តិចតួច ដូចជាមានឡើងពិណក្រហម ឬឈឺត្រង់កន្លែងចាក់ ។ ការក្តៅខ្លួន ឈឺសាច់ដុំ ឬមានប្រតិកម្មរិតតែខ្លាំង គឺមានចំនួនតិចជាង១ភាគរយប៉ុណ្ណោះ ។

ថ្នាំចាក់ក៏ដូចថ្នាំដទៃដែរ អាចមានប្រតិកម្មខ្លាំងមួយបាន ។ ប៉ុន្តែគ្រោះថ្នាក់ក្នុងការចាក់ថ្នាំ ដែលនាំឱ្យឈឺចាប់ ឬស្លាប់ គឺមានតិចណាស់ ។

7 ចុះបើសិនមានប្រតិកម្មខ្លាំងវិញនោះ?

តើខ្ញុំត្រូវគិតសំគាល់អ្វី?

អ្នកត្រូវរកមើលលក្ខណៈមិនធម្មតាណាមួយ ដូចជាមានការប្តូរកំដៅខ្លួនខ្លាំង ឬប្តូរអាកប្បកិរិយា ។ សញ្ញានៃប្រតិកម្មខ្លាំងអាចមានដូចជាការពិបាកដកដង្ហើម ស្លាក ក្អកស្លុត ចេញពងលើស្បែក ឡើងស្នែក ចុះខ្សោយ បេះដូងដើរញាប់ ឬវិលមុខ ។

តើខ្ញុំត្រូវធ្វើដូចម្តេច?

- ទូរស័ព្ទទៅគ្រូពេទ្យ ឬ យកអ្នកនោះទៅជួបគ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់ ។
- ជំរាបគ្រូពេទ្យថាមានរឿងអ្វី ថ្ងៃណាម៉ោងណា ហើយចាក់ថ្នាំម៉ោងប៉ុន្មាន ។
- សុំឱ្យអ្នកផ្តល់សុខភាពរបស់អ្នករាយការណ៍ប្រតិកម្មដោយបំពេញក្រដាស Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS). ឬអ្នកអាចធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ដោយចុចទៅ www.vaers.hhs.gov ឬទូរស័ព្ទទៅ 1-800-822-7967.

VAERS ឥតមានតំបន់ឱ្យអ្នកទេ ។

8 តើខ្ញុំអាចដឹងបន្ថែមតាមរបៀបណា?

- សួរអ្នកផ្តល់សុខភាពរបស់អ្នក គេអាចឱ្យក្រដាសស្នាមស្តីអំពីការចាក់ថ្នាំ ឬគេអាចផ្តល់ព័ត៌មានអ្វីផ្សេងទៀត ។
- ទូរស័ព្ទទៅក្រសួងសុខាភិបាលប្រចាំតំបន់អ្នក ឬ ប្រចាំខេត្ត ។
- ទាក់ទងការិយាល័យ Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ដោយទូរស័ព្ទទៅ លេខ៖
 - 1-800-232-4636 (1-800-CDC.INFO)
 - ឬចុចទៅ www.cdc.gov/vaccines ។

