

៥

បើចាក់ថ្នាំការពារ ឌីផិអេតិ តើអាចមាន គ្រោះថ្នាក់អ្វីកើតឡើង?

បើមាន រោគខាន់ស្លាក់ រោគគេតណូស រោគក្អកមាន់ហើយ វាអាចមាន គ្រោះថ្នាក់ផង ចាក់ថ្នាំការពារ ឌីផិអេតិ ទៀត។

តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយ ថ្នាំចាក់ការពារ ក៏អាចមានបញ្ហា ខ្លាំងខ្លះដែរ ដូចជា ការប្រែប្រួលក្នុងខ្លួនយើងមិនអាចទទួលបាន។ មនុស្សភាគតិច ណាស់ដែលអាចមានឈឺ មានគ្រោះថ្នាក់ដល់ស្លាប់ បើចាក់បង្ការ។

បញ្ហាតិចៗដែលអាចកើតឡើង (ជានិច្ច)

- គ្រុនក្តៅ (ចំពោះក្មេង ប្រហែល មាន ១ ក្នុង ៤ អ្នក)
- ក្រហម ឬ ហើមនៅ កន្លែងចាក់ថ្នាំ(ចំពោះក្មេង ប្រហែលមាន ១ ក្នុង ក្មេង ៤ អ្នក)
- ឈឺចុក ដែលឆាប់ឈឺ នៅកន្លែងចាក់ថ្នាំ (ចំពោះក្មេង ប្រហែលមាន ១ ក្នុង ក្មេង ៤ អ្នក)

បញ្ហាភ្នែកនេះតែងតែកើតឡើង នៅពេល ចាក់ថ្នាំនៅលើកទី ៤ និង ទី ៥ បន្ទាប់ពី ចាក់ ឌីផិអេតិ ពីមុន។ ជួនកាល ចាក់ថ្នាំនៅលើកទី ៤ និង ទី ៥ វាអាចធ្វើឲ្យហើមពេញដៃ ឬ ជើង នៅកន្លែងចាក់ភ្នែក ពី ១ ថ្ងៃ ទៅ ៧ ថ្ងៃ (ចំពោះក្មេង ប្រហែល មាន ១ ក្នុង ក្មេង ៣០ អ្នក)។

បញ្ហាតិចៗដែលអាចកើតឡើងផ្សេងៗទៀត ដូចជា :

- មូម៉ៅច្រើន(ចំពោះក្មេង ប្រហែល មាន ១ ក្នុង ក្មេង ៣ អ្នក)
- ហត់ ឬ ញ៉ាំងអស់បាន(ចំពោះក្មេង ប្រហែល មាន ១ ក្នុង ក្មេង ១០ អ្នក)
- ក្អក(ចំពោះក្មេង ប្រហែល មាន ១ ក្នុង ក្មេង ៥០ អ្នក)

បញ្ហាភ្នែកនេះ តាមធម្មតាកើតឡើង ពេលបានចាក់ថ្នាំ ពី ១-៣ ថ្ងៃ រួច។

បញ្ហាឈឺឈាមដែរ (មិនទូរទៅ)

- ប្រកាច់(ញាក់ ឬ ចាប់ផ្តើម)(ប្រហែល មានក្មេង ១ ក្នុង ក្មេង ១៤,០០០អ្នក)
- យំ មិន ចេះបាត់ អស់រយៈពេល ពី ៣ ម៉ោងឡើងទៅ (ប្រហែល មាន ក្មេង ១ ក្នុងក្មេង ១,០០០ អ្នក)
- គ្រុនក្តៅខ្លាំង លើសពី ១០៥° (ប្រហែលមានក្មេង ១ ក្នុងក្មេង ១៦,០០០ អ្នក)

បញ្ហាខ្លាំងមែនទែន (តែកម្រមាន)

- គឺមានការទាស់ប្រឆាំងនឹងថ្នាំយ៉ាងខ្លាំង (មានតិចជាង ១ ក្នុង មួយលានអ្នក)
- មានបញ្ហាជាច្រើន ដ៏ខ្លាំងទៀតកើតឡើង បន្ទាប់ពីចាក់ថ្នាំការពារ ឌីផិអេតិ រួចដូចជា :
 - ប្រកាច់ យ៉ាងយូរ ដំណើរភ្នែក ឬ ដឹងខ្លួនតិច។
 - ខ្វះក្បាលខូចខ្ចីរហូត

ពួកនេះវាកម្រមានកើតឡើងហើយ ពិបាកនិយាយថាវាកើតឡើងមក ដោយសារការចាក់ថ្នាំការពារនោះ ឬយ៉ាងណាទេ។

ការពារកុំឲ្យមានគ្រុនក្តៅ គឺវាសំខាន់ណាស់ចំពោះក្មេងដែលមានជម្ងឺរោគប្រកាច់ ឬសំរាប់រៀនអ្វីក៏ដោយ។ ហើយវាសំខាន់ណាស់បើដឹងត្រូវត្រួតសារណាមាន រោគប្រកាច់។ យើងអាចបន្ថយកុំឲ្យមានគ្រុនក្តៅដោយឲ្យថ្នាំ អាស៊ីរីន-ហ្វូលី ជួយដោះស្រាយខ្លះពេលដែលបានចាក់ថ្នាំរួច ក្នុងរយៈពេល ២៤ ម៉ោង។ សូមមើលក្រដាសដែលគេឲ្យ មួយសំណុំដើម្បីបង្ហាត់បង្រៀនដូចតទៅ។

៦

តើអ្វីទៅ ដែលអាចធ្វើដំណើរប្រែប្រួលខ្លាំង ឬ តិចនៅក្នុងខ្លួន?

តើខ្ញុំត្រូវកត់សំគាល់អ្វី?

លក្ខណៈខ្លះ ដែលមិនធម្មតាហើយមាន ការប្រែប្រួលខ្លាំង ដូចជាគ្រុនក្តៅខ្លាំង ឬ ចរិតមិនធម្មតា។ វាកម្រមានការប្រែប្រួលខ្លាំង ពេលចាក់ថ្នាំរួច។ បើសិនជាមាន វានឹងកើតឡើងក្នុងរយៈ ពេល ពីព្រឹកទៅ ទេព្រឹកម៉ោង បន្ទាប់ពីចាក់ថ្នាំរួច។ វាឲ្យសញ្ញាដូចជា ពិបាកដកដង្ហើម ស្លក់ ដកដង្ហើមស្លក់ត្រេត្រេត ស្លាំង ខ្សោយ បេះដូងដើរលឿន វិលមុខ។ បើប្រសិនជាមានគ្រុនក្តៅ ឬ រោគប្រកាច់ វាត្រូវតែកើតឡើង នៅក្នុងរយៈពេលមួយអាទិត្យបន្ទាប់ ពីចាក់ថ្នាំរួច។

តើខ្ញុំនឹងត្រូវធ្វើអ្វីបន្ថែម?

- ទូរស័ព្ទទៅអ្នកទំរ ឬ ឲ្យនរណាជូនទៅអ្នកទំរភ្លាមៗ។
- ប្រាប់អ្នកទំរ អ្វីដែលប្រែប្រួល ថ្ងៃណា ពេលណាដែលកើតបន្ទាប់ ពីចាក់ថ្នាំរួច។
- សុំស្នើអ្នកទំរ រាំងហ្វឹមញ្ជោរ ឬកន្លែងថែរក្សារោគសាស្ត្រ កត់ទុកក្នុងបញ្ជី រាយការណ៍នូវពេលចាក់ថ្នាំការពារមានការប្រែប្រួលក្នុងខ្លួនហៅថា(វីអេស៊ីអេស) ឬ ទូរស័ព្ទ ១-៨០០-៨២២-៧៩៦៧។

៧

ការចាក់ថ្នាំការពាររបួស ប្រជាជាតិ ហើយគេមានវិធីការសងវិញ

អ្នកកម្រមានព្រឹត្តិការណ៍ ឬ បើក្មេងអ្នកមានការប្រែប្រួលខ្លាំងពេលចាក់ ថ្នាំការពាររួច វិធីខាងសហគ្រាសនឹងជួយចេញប្រាក់ទៅអ្នកដែលមានគ្រោះថ្នាក់។

បើចង់ដឹងដំណឹងសព្វគ្រប់ទៀត ពីរឿងការសង ក្រោយពីការចាក់ថ្នាំការពារ របួសប្រជាជាតិ សូមទូរស័ព្ទ ១-៨០០-៣៣៨-២៣៨២ ឬ ប្រើ វិបសៃ <http://www.hrsa.gov/osp/vicp/>

៨

តើខ្ញុំអាចរៀនថែមទៀតតាមរបៀបណា?

- សួរកន្លែងអ្នកទៅមើលថែរក្សារោគសាស្ត្រ។ គេអាចឲ្យបញ្ជីមើលពីលទ្ធផលពីចាក់ ថ្នាំការពារ ហើយដំណឹងផ្សេងៗ ហើយនិងកន្លែងរបស់វា។
- ទូរស័ព្ទទៅកន្លែងថែរក្សារោគសាស្ត្រសំរាប់ធ្វើឲ្យសាំងរោគ របស់រដ្ឋ ដែលនៅ ជិតផ្ទះអ្នក។
- ទូរស័ព្ទទៅកន្លែងការពារ និងបញ្ជប់កុំឲ្យមានរោគ ហៅថា (ស៊ីឌីស៊ី)
 - Call 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO)
 - ផែកមើល វិបសៃ ខាងវិធីធ្វើឲ្យសាំងនិងរោគ <http://www.cdc.gov/nip>



U.S. DEPARTMENT OF HEALTH & HUMAN SERVICES
Centers for Disease Control and Prevention
National Immunization Program

Vaccine Information Statement
DTaP (7/30/01) - Cambodian 42 U.S.C. § 300aa-26

Translation provided by Minnesota Department of Health