

សន្លឹកព័ត៌មានស្តីពីថ្នាំវ៉ាក់សាំង

ថ្នាំវ៉ាក់សាំង DTaP អ្វីដែលអ្នកត្រូវដឹង

(ជំងឺខាន់ស្លាក់
តេតាណូស ក្នុងកម្រិត)

Many Vaccine Information Statements are available in Khmer and other languages. See www.immunize.org/vis
សន្លឹកព័ត៌មានស្តីពីថ្នាំវ៉ាក់សាំងជាច្រើនមានជាភាសាខ្មែរ និងភាសាផ្សេងទៀត។ សូមចូលទៅ www.immunize.org/vis

1 ហេតុអ្វីត្រូវទទួលថ្នាំបង្ការ?

ជំងឺខាន់ស្លាក់ តេតាណូស និងក្នុងកម្រិតគឺជាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដែលបង្កឡើងដោយបាក់តេរី។ ជំងឺខាន់ស្លាក់ និងក្នុងកម្រិតចម្លងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀត។ តេតាណូសឆ្លងចូលខ្លួនប្រាណតាមរយៈស្នាមមុត ឬរបួស។

ជំងឺខាន់ស្លាក់ បណ្តាលឲ្យឡើងស្នាមនៅបំពង់ក។

- ជំងឺនេះបណ្តាលឲ្យមានបញ្ហាដកដង្ហើម រោគខ្លិន រោគចុះខ្សោយបេះដូង និងស្លាប់បាត់បង់ជីវិត។

តេតាណូស (ជំងឺរឹងថ្គាម) ធ្វើឲ្យតឹងសាច់ដុំជាមួយនឹងការឈឺចុកចាប់ ដែលជាធម្មតា ពេញខ្លួនប្រាណទាំងមូល។

- តេតាណូសអាចបណ្តាលឲ្យរឹងថ្គាម ដូច្នោះជនរងគ្រោះមិនអាចហាមាត់ ឬលេបបានឡើយ។ តេតាណូសអាចបណ្តាលឲ្យស្លាប់បាត់បង់ជីវិត 2 ករណីក្នុងចំណោម 10 ករណី។

ជំងឺក្នុងកម្រិត (ក្នុងកម្រិត) បណ្តាលឲ្យក្អកក្អាយខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យកុមារពិបាកញ័រ ផឹក ឬដកដង្ហើម។ ការក្អកក្អាយនេះអាចមានរយៈពេលច្រើនសប្តាហ៍។

- ជំងឺនេះអាចបណ្តាលឲ្យកើតជំងឺរលាកសួត ប្រកាច់ (ក្បន្តាក់ និងឈាមភ្នែក) ខូចខ្លួនក្បាល និងស្លាប់បាត់បង់ជីវិត។

ថ្នាំវ៉ាក់សាំងជំងឺខាន់ស្លាក់ តេតាណូស និងក្នុងកម្រិត (DTaP) អាចជួយបង្ការជំងឺទាំងនេះបាន។ កុមារភាគច្រើន ដែលបានទទួលថ្នាំវ៉ាក់សាំង DTaP នឹងទទួលបានការការពារក្នុងអំឡុងកុមារភាពទាំងមូល។ កុមារជាច្រើនថែមទៀតនឹងកើតជំងឺទាំងនេះ ប្រសិនបើយើងឈប់ផ្តល់ថ្នាំវ៉ាក់សាំង។

ថ្នាំវ៉ាក់សាំង DTaP គឺជាថ្នាំដែលមានសុវត្ថិភាពជាងថ្នាំវ៉ាក់សាំងមុនដែលគេហៅថាថ្នាំវ៉ាក់សាំង DTP។ ថ្នាំវ៉ាក់សាំង DTP លែងត្រូវបានគេយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅទៀតហើយ។

2 តើអ្នកណាគួរទទួលថ្នាំវ៉ាក់សាំង DTaP ហើយនៅពេលណា?

កុមារ គួរទទួលថ្នាំវ៉ាក់សាំង DTaP ចំនួន 5 ដូស ដោយថ្នាំវ៉ាក់សាំងមួយដូសៗ ត្រូវចាក់នៅអាយុដូចតទៅ ៖

- 2 ខែ
- 4 ខែ
- 6 ខែ
- 15-18 ខែ
- 4-6 ឆ្នាំ

ថ្នាំវ៉ាក់សាំង DTaP អាចផ្តល់ជូន ក្នុងពេលដំណាលគ្នានឹងថ្នាំវ៉ាក់សាំងដទៃទៀត។

3 កុមារមួយចំនួនមិនគួរទទួលថ្នាំវ៉ាក់សាំង DTaP ទេ ឬគួររង់ចាំ

- កុមារដែលមានជំងឺស្រាល ដូចជាជំងឺផ្តាសាយ អាចទទួលថ្នាំបង្ការនេះបាន។ ប៉ុន្តែជាធម្មតា កុមារដែលមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ ឬធ្ងន់ធ្ងរ គួររង់ចាំ រហូតដល់ពួកគេជាសះស្បើយសិន មុនពេលទទួលថ្នាំវ៉ាក់សាំង DTaP។
- កុមារ ដែលមានប្រតិកម្មអាឡាស៊ីដែលគំរាមដល់អាយុជីវិត បន្ទាប់ពីទទួលថ្នាំវ៉ាក់សាំង DTaP មួយដូសនោះ មិនគួរទទួលថ្នាំបង្ការនេះ មួយដូសទៀតទេ។
- កុមារ ដែលមានជំងឺប្រព័ន្ធប្រសាទ ឬខ្លួនក្បាលក្នុងរយៈពេល 7 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីទទួលថ្នាំវ៉ាក់សាំង DTaP មួយដូសនោះ មិនគួរទទួលថ្នាំបង្ការនេះ មួយដូសទៀតទេ។
- សូមពិភាក្សាជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់លោកអ្នក ប្រសិនបើកូនរបស់លោកអ្នក ៖
 - ប្រកាច់ ឬជួលបន្ទាប់ពីទទួលថ្នាំបង្ការ DTaP មួយដូស
 - ប្រែកាយមិនឈប់រយៈពេល 3 ម៉ោង ឬលើសពីនេះ បន្ទាប់ពីទទួលថ្នាំបង្ការ DTaP មួយដូស
 - មានជំងឺគ្រុនក្តៅលើស 105°F បន្ទាប់ពីទទួលថ្នាំបង្ការ DTaP មួយដូស។

សូមសួរវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់លោកអ្នកសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមទៀត។ កុមារទាំងនេះមួយចំនួនមិនគួរទទួលថ្នាំវ៉ាក់សាំងជំងឺក្នុងកម្រិតមួយដូសទៀតឡើយ ប៉ុន្តែអាចទទួលថ្នាំវ៉ាក់សាំងដែលគ្មានថ្នាំវ៉ាក់សាំងជំងឺក្នុងកម្រិតបាន ដែលគេហៅថា **ថ្នាំវ៉ាក់សាំង DT**។

4 កុមារអាយុច្រើន និងមនុស្សពេញវ័យ

ថ្នាំវ៉ាក់សាំង DTaP ពុំត្រូវបានចេញអាជ្ញាប័ណ្ណសម្រាប់យុវជន មនុស្សពេញវ័យ ឬកុមារអាយុ 7 ឆ្នាំ និងលើសពី 7 ឆ្នាំឡើយ។

ប៉ុន្តែមនុស្សវ័យកាន់តែច្រើននៅតែត្រូវការកិច្ចការពារ។ ថ្នាំវ៉ាក់សាំងមួយដែលគេហៅថា **ថ្នាំវ៉ាក់សាំង Tdap** មានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលនឹងថ្នាំវ៉ាក់សាំង DTaP ដែរ។ ថ្នាំវ៉ាក់សាំង Tdap តែមួយដូសត្រូវបានណែនាំសម្រាប់មនុស្សអាយុពី 11 ឆ្នាំដល់ 64 ឆ្នាំ។ ថ្នាំវ៉ាក់សាំងមួយទៀត ដែលគេហៅថា **ថ្នាំវ៉ាក់សាំង Td** ការពារចំពោះតេតាណូស និងជំងឺខាន់ស្លាក់ ប៉ុន្តែមិនការពារចំពោះជំងឺក្នុងកម្រិតទេ។ គេណែនាំឲ្យទទួលថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះរៀងរាល់ 10 ឆ្នាំម្តង។ មានសន្លឹកព័ត៌មានស្តីពីថ្នាំវ៉ាក់សាំង (Vaccine Information Statement) ដោយឡែកសម្រាប់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងទាំងនេះ។



5 តើមានហានិភ័យអ្វីខ្លះដោយសារថ្នាំវ៉ាក់សាំង DTaP?

ការកើតជំងឺខាន់ស្លាត តេតាណូស ឬក្អកមាន់មានហានិភ័យខ្ពស់ជាងការទទួលបានថ្នាំវ៉ាក់សាំង DTaP។

ទោះជាយ៉ាងណា ថ្នាំវ៉ាក់សាំង គឺដូចឱសថផងដែរ គឺអាចបង្កបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរ ដូចជាប្រតិកម្មអាឡាក់ស៊ីធ្ងន់ធ្ងរ។ ហានិភ័យដែលថ្នាំវ៉ាក់សាំង DTaP បង្កគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរ ឬធ្វើឲ្យស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនោះ គឺមានកម្រិតតិចបំផុត។

បញ្ហាស្រាល (ធម្មតា)

- គ្រុនក្តៅ (កុមារប្រហែលម្នាក់ក្នុងចំណោម 4 នាក់)
 - ស្នាមក្រហម ឬហើមត្រង់កន្លែងចាក់ថ្នាំ (កុមារប្រហែលម្នាក់ក្នុងចំណោម 4 នាក់)
 - ដំបៅ ឬឆាបឆាយត្រង់កន្លែងចាក់ថ្នាំ (កុមារប្រហែលម្នាក់ក្នុងចំណោម 4 នាក់)
- បញ្ហាទាំងនេះកើតឡើងកាន់តែញឹកញាប់ថែមទៀតបន្ទាប់ពីចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំង DTaP ជួសទី 4 និងទី 5 គឺញឹកញាប់ជាងថ្នាំវ៉ាក់សាំងជួសមុនៗ។ ជួនកាល បន្ទាប់ពីចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំង DTaP ជួសទី 4 ឬទី 5 រួច ដៃ ឬជើងទាំងមូល ដែលចាក់ថ្នាំនោះ ឡើងហើមរយៈពេលពី 1-7 ថ្ងៃ (កុមារប្រហែលម្នាក់ក្នុងចំណោម 30 នាក់)។

បញ្ហាស្រាលដទៃទៀតរួមបញ្ចូល ៖

- មួរម៉ៅ (កុមារប្រហែលម្នាក់ក្នុងចំណោម 3 នាក់)
 - នឿយហត់ ឬមិនសូវមានចំណង់អាហារ (កុមារប្រហែលម្នាក់ក្នុងចំណោម 10 នាក់)
 - ក្អក (កុមារប្រហែលម្នាក់ក្នុងចំណោម 50 នាក់)
- ជាទូទៅ បញ្ហាទាំងនេះកើតឡើងរយៈពេល 1-3 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំង។

បញ្ហាធ្ងន់ល្មម (មិនធម្មតា)

- ប្រកាច់ (កន្ត្រាក់ ឬឈរភ្នែក) (កុមារប្រហែលម្នាក់ក្នុងចំណោម 14,000 នាក់)
- រ៉ៃស្រកយំមិនឈប់រយៈពេល 3 ម៉ោង ឬលើសពី 3 ម៉ោង (កុមារប្រហែលម្នាក់ក្នុងចំណោម 1,000 នាក់)
- គ្រុនក្តៅខ្លាំងលើសពី 105°F (កុមារប្រហែលម្នាក់ក្នុងចំណោម 16,000 នាក់)

បញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរ (កម្រណាស់)

- ប្រតិកម្មអាឡាក់ស៊ីធ្ងន់ធ្ងរ (តិចជាងម្តងក្នុងចំណោមមួយលានដួស)
 - បញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរដទៃទៀតជាច្រើនត្រូវបានរាយការណ៍ថា កើតមាន បន្ទាប់ពីចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំង DTaP។ បញ្ហាទាំងនេះរួមបញ្ចូល៖
 - ប្រកាច់យូរ សន្លប់បាត់ស្មារតី ឬស្មារតីថយចុះ
 - ខូចខ្លួនរាងជាអចិន្ត្រៃយ៍
- បញ្ហាទាំងនេះគឺកម្រណាស់ ដូច្នេះគេពិបាកនិយាយថា តើ បញ្ហាទាំងនេះបង្កឡើងដោយថ្នាំវ៉ាក់សាំង ឬយ៉ាងណាទេ។

ការគ្រប់គ្រងគ្រុនក្តៅមានសារៈសំខាន់ជាពិសេសចំពោះកុមារដែលធ្លាប់ប្រកាច់។ ការគ្រប់គ្រងគ្រុនក្តៅគឺជាការសំខាន់ផងដែរ ប្រសិនបើសមាជិកម្នាក់ទៀតក្នុងគ្រួសារធ្លាប់ប្រកាច់។ អ្នកអាចកាត់បន្ថយគ្រុនក្តៅ និងការឈឺចុកចាប់ ដោយឲ្យថ្នាំបន្ថយការឈឺចុកចាប់ដែលគ្មានថ្នាំ aspirin ដល់កូនអ្នក នៅពេលចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំង និងរយៈពេល 24 ម៉ោងបន្ទាប់ អនុលោមតាមសេចក្តីណែនាំក្នុងកញ្ចប់ថ្នាំវ៉ាក់សាំង។

6 ចុះបើមានប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរ?

តើខ្ញុំគួរប្រយ័ត្នចំពោះអ្វីខ្លះ?

- សូមប្រយ័ត្នចំពោះអ្វីដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកព្រួយបារម្ភ ដូចជាសញ្ញាបង្ហាញពីប្រតិកម្មអាឡាក់ស៊ីធ្ងន់ធ្ងរ គ្រុនក្តៅខ្លាំង ឬការប្តូរឥរិយាបថ។
- សញ្ញាបង្ហាញពីប្រតិកម្មអាឡាក់ស៊ីធ្ងន់ធ្ងរ អាចរួមបញ្ចូលកន្ទួល ហើមមុខ និងបំពង់ក ពិបាកដកដង្ហើម ចង្កាក់បេះដូងញាប់ វិលមុខ និងកម្លាំងចុះខ្សោយ។ បញ្ហាទាំងនេះនឹងចាប់ផ្តើមកើតឡើងប៉ុន្មាននាទីទៅប៉ុន្មានម៉ោង ប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីការចាក់ថ្នាំបង្ការ។

តើខ្ញុំគួរធ្វើអ្វីខ្លះ?

- ប្រសិនបើលោកអ្នកគិតថា វាគឺជាប្រតិកម្មអាឡាក់ស៊ីធ្ងន់ធ្ងរ ឬស្ថានភាពណាមួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ដទៃទៀតដែលមិនអាចរង់ចាំបាន សូមទូរស័ព្ទទៅ 9-1-1 ឬយកអ្នកជំងឺទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដែលជិតបំផុត។ បើមិនអញ្ជឹងទេ សូមទូរស័ព្ទទៅវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់លោកអ្នក។
 - បន្ទាប់មក ប្រតិកម្មគួររាយការណ៍ទៅប្រព័ន្ធរាយការណ៍ផលអាក្រក់នៃថ្នាំវ៉ាក់សាំង (Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS))។ វេជ្ជបណ្ឌិតរបស់លោកអ្នកអាចដាក់បញ្ជូនរបាយការណ៍នេះ ឬលោកអ្នកអាចរាយការណ៍ដោយផ្ទាល់តាមរយៈវេបសាយ VAERS នៅ www.vaers.hhs.gov ឬតាមរយៈហៅទូរស័ព្ទមក 1-800-822-7967។
- VAERS គឺសម្រាប់តែការរាយការណ៍ប្រតិកម្មផ្សេងៗប៉ុណ្ណោះ។ ប្រព័ន្ធនេះពុំផ្តល់ជំនួយបន្ទាន់វេជ្ជសាស្ត្រទេ។

7 កម្មវិធីជាតិបង់សំណងរបួសដោយសារថ្នាំវ៉ាក់សាំង (National Vaccine Injury Compensation Program)

កម្មវិធីជាតិបង់សំណងរបួសដោយសារថ្នាំវ៉ាក់សាំង (National Vaccine Injury Compensation Program (VICP)) គឺជាកម្មវិធីរបស់រដ្ឋសហព័ន្ធដែលបានបង្កើតឡើងដើម្បីបង់សងអ្នកទាំងឡាយដែលអាចរងរបួសដោយសារតែថ្នាំវ៉ាក់សាំងមួយចំនួន។ បុគ្គលដែលជឿជាក់ថា ខ្លួនអាចធ្លាប់រងរបួសដោយសារថ្នាំវ៉ាក់សាំងមួយអាចធ្វើការសិក្សាអំពីកម្មវិធី និងអំពីការដាក់ពាក្យទាមទារសំណង ដោយទូរស័ព្ទមក 1-800-338-2382 ឬចូលទៅវេបសាយ VICP នៅ www.hrsa.gov/vaccinecompensation។

8 តើខ្ញុំអាចសិក្សាបន្ថែមទៀតដោយរបៀបណា?

- សួរវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់លោកអ្នក។
- ទូរស័ព្ទទៅក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋ ឬនៅមូលដ្ឋានរបស់លោកអ្នក។
- ទាក់ទងមជ្ឈមណ្ឌលទប់ស្កាត់ និងបង្ការជំងឺឆ្លង (CDC):
 - ទូរស័ព្ទមកលេខ 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) ឬ
 - ចូលទៅវេបសាយ CDC នៅ www.cdc.gov/vaccines

Vaccine Information Statement
DTaP Vaccine

5/17/2007

Khmer

