

# ថ្នាំបង្ការជំងឺស្លឹតដៃជើង

## អ្វីដែលអ្នកត្រូវដឹង

Many Vaccine Information Statements are available in Spanish and other languages. See [www.immunize.org/vis](http://www.immunize.org/vis).  
សារអំពីព័ត៌មានថ្នាំបង្ការមួយចំនួន មានសរសេរជាភាសាអេស្បាញ និងភាសាដទៃទៀត។ សូមទស្សនា គេហទំព័រ [www.immunize.org/vis](http://www.immunize.org/vis).

### 1 តើអ្វីជាជំងឺស្លឹតដៃជើង?

ស្លឹតដៃជើង ជាជំងឺដែលបណ្តាលពីវីរុស ។ មេរោគនេះចូលក្នុងខ្លួនមនុស្សតាមមាត់ ។ ជាទូទៅវាមិនបង្ករឱ្យកើតជំងឺធ្ងន់ធ្ងរឡើយ ។ តែពេលខ្លះ វាបណ្តាលឱ្យងាប់អវយវ៍ (មិនអាចកម្រើកដៃ ឬជើងបាន) ហើយវាអាចបណ្តាលឱ្យកើតជំងឺ រលាកស្រោមខួរក្បាល (រមាស់សរសៃខួរ ក្បាល) ។ វាអាចសម្លាប់អ្នកជំងឺបាន ជាទូទៅវាធ្វើឱ្យងាប់សាច់ដុំ សម្រាប់ប្រើក្នុងការដក ដង្ហើម ។

ជំងឺស្លឹតដៃជើង ធ្លាប់ជាជំងឺធម្មតា នៅសហរដ្ឋអាមេរិក ។ វាធ្វើឱ្យអ្នកជំងឺពិការ និងសម្លាប់មនុស្សអស់រាប់ពាន់នាក់ ក្នុងមួយឆ្នាំ នៅមុនពេលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ រកឃើញថ្នាំបង្ការ ។

### 2 ហេតុអ្វីត្រូវចាក់ថ្នាំបង្ការ?

**ប្រវត្តិ ៖** កាលដែលមានការរាតត្បាតគ្រប់ទីកន្លែងនៃជំងឺស្លឹតដៃជើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិក ក្នុងឆ្នាំ 1916 បានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន 6,000 នាក់ ហើយធ្វើឱ្យមនុស្សពិការជាង 27,000 ទៀត ។ នៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1950 មានជំងឺស្លឹតដៃជើងកើតឡើងជាង 25,000 ករណី ត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានកើតឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំ ។ ការចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺស្លឹតដៃជើង បានចាប់ផ្តើមក្នុងឆ្នាំ 1955 ។ ចូលមកដល់ឆ្នាំ 1960 ការកើតជំងឺនេះ បានរាយការណ៍មកថាបានថយចុះប្រហែល 3,000 ករណី ហើយមកដល់ឆ្នាំ 1979 មានរបាយការណ៍ថា មានប្រហែល 10 ករណីប៉ុណ្ណោះបានកើតឡើង ។ ភាពជោគជ័យនៃការចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺស្លឹតដៃជើង នៅសហរដ្ឋអាមេរិក និងនៅប្រទេសដទៃទៀត បានបង្កឱ្យមានការព្យាយាម នៅទូទាំងពិភពលោក ក្នុងការលុបបំបាត់ជំងឺនេះ ។

**បច្ចុប្បន្ន ៖** ជំងឺស្លឹតដៃជើង ត្រូវបានលុបបំបាត់ចេញអស់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយ ។ តែជំងឺនេះ បន្តស្ថិតនៅជាជំងឺធម្មតានៅឡើយនៅតាមប្រទេសមួយចំនួន ក្នុងពិភពលោក ។ វាអាចមាន មនុស្សតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលឆ្លងវីរុសជំងឺស្លឹតដៃ ជើងពីប្រទេសដទៃយកមកចម្លងក្នុងស្រុកយើង ប្រសិនបើយើងមិនបានចាក់ថ្នាំបង្ការទេនោះ ។ ប្រសិនបើសេចក្តីព្យាយាម លុបបំបាត់ជំងឺនេះ ពីពិភពលោកមានភាពជោគជ័យនោះ នៅថ្ងៃណា មួយ មនុស្សយើងនឹងលែងត្រូវការថ្នាំបង្ការទៀត ហើយ ។ តែមុនថ្ងៃនោះចូលមកដល់យើងនៅតែ ត្រូវចាក់ថ្នាំបង្ការឱ្យកូនៗយើងជានិច្ច ។

### 3 នរណាគួរចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺស្លឹតដៃជើង និងត្រូវចាក់នៅពេលណា?

IPV ជាថ្នាំចាក់ ដែលត្រូវចាក់តាមសាច់ដុំភ្លៅ ឬសាច់ដុំដៃ អាស្រ័យលើអាយុរបស់កុមារ ។ វាអាចចាក់បានក្នុងពេលតែមួយជាមួយនឹងថ្នាំបង្ការដទៃទៀតដែរ ។

- កុមារ**  
កុមារត្រូវចាក់ថ្នាំបង្ការ IPV ចំនួន 4 ដូស ក្នុងចំណោមអាយុដូចខាងក្រោម ៖
- ចាក់មួយដូស ពេលអាយុ 2 ខែ
  - ចាក់មួយដូស ពេលអាយុ 4 ខែ
  - ចាក់មួយដូស ពេលអាយុ 6-18 ខែ
  - ចាក់ដូសរំលឹកពេលអាយុ 4-6 ឆ្នាំ

**មានថ្នាំបង្ការខ្លះ “ដាក់បញ្ចូលគ្នា”** (ថ្នាំបង្ការបី ឬនួនមុខចូលគ្នា ចាក់តែមួយដង) ជាមួយនឹងថ្នាំបង្ការ IPV ។ កុមារដែលចាក់ថ្នាំបង្ការទាំងនេះ អាចត្រូវចាក់មួយដូស (ដូសទី 5) ទៀតនៃថ្នាំបង្ការជំងឺស្លឹតដៃជើង ។ នេះមិនមែនជាបញ្ហា ទេ ។

- មនុស្សចាស់**  
មនុស្សចាស់ដែលមានអាយុ 18 ឆ្នាំ និងចាស់ជាងនេះ មិនចាំបាច់ចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺស្លឹតដៃជើងឡើយ ពីព្រោះថា ពួកគេបានទទួលថ្នាំនេះរួចហើយកាលពីពួកគេនៅតូច ។ តែមានមនុស្សចាស់ខ្លះ ស្ថិតក្នុងហានិភ័យខ្ពស់ ហើយគួរពិចារណាចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺស្លឹតដៃជើង ដូចតទៅ ៖
- (1) អ្នកដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីកន្លែងផ្សេងៗនៃពិភពលោក ដែលនៅមានជំងឺស្លឹតដៃជើងនៅឡើយ
  - (2) បុគ្គលិកមន្ទីរពិសោធន៍ ដែលអាចប្រឈមជាមួយនឹងវីរុសជំងឺស្លឹតដៃជើង និង
  - (3) បុគ្គលិកថែទាំសុខភាព ព្យាបាលអ្នកជំងឺដែល អាចកើតជំងឺស្លឹតដៃជើង ។

- មនុស្សចាស់ ដែលស្ថិតក្នុងចំណោមក្រុមទាំងបីនេះ ៖
- អ្នកដែលមិនធ្លាប់បានចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺស្លឹតដៃជើងពីមុនមក គួរតែចាក់ថ្នាំបង្ការ IPV ចំនួន 3 ដូស ៖
    - ពីរដូស ដែលឃ្លាតពីគ្នាចំនួន 1 ទៅ 2 ខែ និង
    - ដូសទីបី ឃ្លាតពីគ្នា 6 ទៅ 12 ខែ បន្ទាប់ពីដូសទីពីរ ។
  - អ្នកដែលបានចាក់ថ្នាំបង្ការ **1 ឬ 2 ដូស** កាលពីមុន គួរតែទទួលដូសដែលនៅសល់ 1 ឬ 2 ដូសដែលនៅសល់ ។



វាមិនសំខាន់ទេចំពោះរយៈពេលដែលចាក់ដូសពីដំបូងនោះ ។

- អ្នកដែលបានទទួលថ្នាំបង្ការជំងឺស្វិតដៃជើង 3 ដូស ឬច្រើនជាងនេះកាលពីពេលមុន អាចត្រូវចាក់ IPV រៀងរាល់ដូសទៀត ។

គ្រូពេទ្យរបស់អ្នក អាចផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមដល់អ្នក ។

**4 អ្នកខ្លះ មិនគួរចាក់ថ្នាំបង្ការ IPV ឬគួររង់ចាំសិន**

**អ្នកទាំងនេះ មិនគួរចាក់ថ្នាំ IPV ឡើយ ៖**

- អ្នកណាម្នាក់ដែលមានប្រតិកម្មខ្លាំងក្លា ចំពោះសមាសធាតុថ្នាំបង្ការណាមួយនៃ IPV រួមទាំងថ្នាំ អង់ទីប៊ីយ៉ូទិក ស្រ្តីបតូមីស៊ីន ឬប៊ូលីមីស៊ីន មិនគួរចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺស្វិតដៃជើងឡើយ ។ សូមប្រាប់គ្រូពេទ្យរបស់អ្នកឲ្យបានដឹង បើអ្នកមាន ប្រតិកម្មធាតុធ្ងន់ធ្ងរណាមួយ ។
- អ្នកណាដែលមានប្រតិកម្មបញ្ហាសទិសធ្ងន់ធ្ងរ ចំពោះការចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺស្វិតដៃជើងកាលពី មុន មិនគួរចាក់ម្តងទៀតឡើយ ។

**អ្នកទាំងនេះ គួររង់ចាំសិន ៖**

នរណាម្នាក់ដែលមានជម្ងឺមធ្យម ឬធ្ងន់ធ្ងរ ក្នុងពេលត្រូវចាក់ថ្នាំនេះ ជាធម្មតាគួររង់ចាំឲ្យជំងឺ ជាសិន ទើបអាចចាក់ថ្នាំបង្ការស្វិតដៃជើងនេះបាន ។ អ្នកឈឺតិចតួច ដូចជាផ្តាសាយ អាចចាក់ថ្នាំនេះបាន ។

សួរគ្រូពេទ្យរបស់អ្នក សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម ។

**5 តើមានហានិភ័យអ្វីចំពោះថ្នាំបង្ការ IPV?**

អ្នកខ្លះដែលចាក់ថ្នាំ IPV មានការឈឺចាប់ត្រង់បរិវេណចាក់មូល ។ គេនៅមិនទាន់បានដឹងនៅឡើយទេថា ថ្នាំបង្ការ IPV អាចបង្កជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរ ហើយមនុស្សភាគច្រើន ដែលចាក់ថ្នាំនេះ មិនដែលមានបញ្ហាអ្វី កើតឡើងនោះទេ ។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ថ្នាំទាំងអស់សុទ្ធតែអាចបង្ករលាកចាញ់ធ្ងន់ធ្ងរ បាន ដូចជាប្រតិកម្ម បញ្ហាសទិសធ្ងន់ធ្ងរ ឬអាចបណ្តាលឲ្យស្លាប់បាន ។ ហានិភ័យពីថ្នាំបង្ការជំងឺស្វិតដៃជើង ដែលបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរ មានកំរិតតិចតួចណាស់ ។

**6 ចុះប្រសិនបើមានបញ្ហាមធ្យម ឬធ្ងន់ធ្ងរកើតឡើង ត្រូវធ្វើដូចម្តេច?**

**តើខ្ញុំគួរកមើលអ្វី?**

- ចូរកមើលស្ថានភាពណាដែលខុសប្រក្រតី ដូចជាប្រតិកម្មបញ្ហាសទិសធ្ងន់ធ្ងរ គ្រុនក្តៅខ្លាំង ឬអាកប្បកិរិយាខុសប្រក្រតី ។ ប្រសិនបើមានប្រតិកម្មបញ្ហាសទិសធ្ងន់ធ្ងរកើតឡើង វានឹងកើតឡើងក្នុងរវាងពីរបីនាទី ទៅពីរបីម៉ោង បន្ទាប់ពីចាក់រួច ។ សញ្ញានៃប្រតិកម្មបញ្ហាសទិសធ្ងន់ធ្ងរ មានដូចជា ពិបាកដកដង្ហើម

ខ្សោយកម្លាំង ដកដង្ហើមឮដឹកៗ ឬរឺកៗ បេះដូងដើរញាប់ ឡើងបន្ទាល ត្រអាក វិលមុខ ស្លេក ឬ ហើមបំពង់ក ។

**តើខ្ញុំគួរធ្វើអ្វី?**

- ហៅទូរស័ព្ទមកជួបគ្រូពេទ្យ ឬបញ្ជូនអ្នកជំងឺ មកជួបគ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់ ។
- ប្រាប់គ្រូពេទ្យរបស់អ្នកពីអ្វីដែលបានកើតឡើង កាលបរិច្ឆេទ និងពេលវេលាដែលបានកើតឡើង និងពេលដែលអ្នកជំងឺបានទទួលការចាក់ថ្នាំ បង្ការ ។
- ប្រាប់ដល់អ្នកផ្តល់សេវាឲ្យអ្នក ធ្វើរបាយការណ៍ ពីប្រតិកម្ម បញ្ហាសទិសដោយការបំពេញសំណុំ បែបបទ Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS-ប្រព័ន្ធការធ្វើរបាយការណ៍ហេតុការណ៍ប្រតិកម្មបញ្ហាសទិសរបស់ថ្នាំ បង្ការ) ។ ឬអ្នកក៏អាចរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ តាមរយៈ គេហទំព័ររបស់ VAERS តាមរយៈអាសយដ្ឋាន [www.vaers.hhs.gov](http://www.vaers.hhs.gov) ឬដោយការហៅទូរស័ព្ទ មកកាន់លេខ **1-800-822-7967** ។ VAERS មិនផ្តល់ជូនព័ត៌មានវេជ្ជសាស្ត្រ ឡើយ ។

**7 កម្មវិធីផ្តល់សំណងរបួសស្នាមបណ្តាល ពីថ្នាំបង្ការ?**

National Vaccine Injury Compensation Program (VICP-កម្មវិធីជាតិផ្តល់សំណង របួសស្នាមបណ្តាលពីថ្នាំបង្ការ) ត្រូវបាន បង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 1986 ។

អ្នកដែលជឿជាក់ថាខ្លួនអាចមានរបួសស្នាម បណ្តាលពីថ្នាំបង្ការ អាចអានឲ្យបានដឹងពី កម្មវិធីផ្តល់សំណង និងរបៀបដាក់ពាក្យទារសំណង ដោយការហៅទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ **1-800-338-2382** ឬទស្សនាគេហទំព័ររបស់ VICP ដែលមានអាសយដ្ឋាន [www.hrsa.gov/vaccinecompensation](http://www.hrsa.gov/vaccinecompensation) ។

**8 តើខ្ញុំអាចបានដឹងពីតម្លៃបន្ថែមដោយរបៀបណា?**

- សួរគ្រូពេទ្យរបស់អ្នក ។ ពួកគេអាច អាចផ្តល់ឲ្យអ្នកនូវកញ្ចប់ព័ត៌មាន ថ្នាំបង្ការ ដល់អ្នក ឬប្រាប់អ្នកពីប្រភពព័ត៌មានផ្សេងទៀតដល់អ្នក ។
- ចូរហៅទូរស័ព្ទទៅកាន់នាយកដ្ឋានសុខាភិបាលប្រចាំតំបន់ ឬនាយកដ្ឋានសុខាភិបាលប្រចាំរដ្ឋរបស់អ្នក ។
- ចូរទាក់ទងជាមួយនឹង Centers for Disease Control and Prevention (CDC-មជ្ឈមណ្ឌល គ្រប់គ្រង និងការពារជំងឺ) ៖
  - ហៅមកលេខ **1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO)** ទស្សនាគេហទំព័ររបស់ CDC តាមរយៈអាសយដ្ឋាន [www.cdc.gov/vaccines](http://www.cdc.gov/vaccines)