

ថ្នាំបង្ការ Td ឬ Tdap

អ្វីដែលអ្នកត្រូវដឹង

(តេតានុស-ខាន់ស្តាក់
ឬតេតានុស-ខាន់ស្តាក់-ក្អកមាន)

ថ្នាំបង្ការ

Many Vaccine Information Statements are available in Spanish and other languages.
See www.immunize.org/vis.
សារអំពីព័ត៌មានថ្នាំបង្ការមួយចំនួន មានសរសេរជាភាសាអេស្បាញ និងភាសាជប៉ុន។ សូមទស្សនា គេហទំព័រ www.immunize.org/vis ។

1 ហេតុអ្វីត្រូវចាក់ថ្នាំបង្ការ ?

ជំងឺតេតានុស ខាន់ស្តាក់ និងជំងឺក្អកមាន អាចជាជំងឺដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ មួយ ។

តេតានុស (ជំងឺរឹងថ្នាម) ធ្វើឲ្យឈឺការកន្ត្រាក់សាច់ដុំ និងធ្វើឲ្យសាច់ដុំឡើងវិញ ជាធម្មតារ៉ាប់រងរាលដាលសាច់ដុំ ពេញរាងកាយ ។

- វាធ្វើឲ្យសាច់ដុំថ្លៃមុខ និងកឡើងតឹង ដូច្នេះហើយបានជាអ្នកជំងឺមិនអាចហារមាត់ រួច ឬមិនអាចលេបអ្វីចូលបាន ជួនកាល អ្នកជំងឺមិនអាចដកដង្ហើមបានទៀតផង ។
- ជំងឺតេតានុស សម្រាប់មនុស្សប្រហែលជា 1 នាក់ ក្នុងចំណោម 5 នាក់ដែលកើត ជំងឺនេះ ។

ជំងឺខាន់ស្តាក់ អាចបណ្តាលឲ្យគ្រោះថ្នាក់ឡើងប៉ោង ក្នុងបំពង់កផ្នែកខាងក្រោយ ។

- វាអាចនាំឲ្យពិបាកដកដង្ហើម អ្នកជំងឺគ្មានចលនាស្លឹកស្តើង បេះដូងឈប់ធ្វើចលនា ហើយក៏អាចបណ្តាលឲ្យស្លាប់ទៀតផង ។

ក្អកខ្លាំង (ជំងឺក្អកមាន) បណ្តាលឲ្យអ្នកជំងឺក្អកខ្លាំង ដែល អាចធ្វើឲ្យពិបាកដកដង្ហើម ធ្វើឲ្យក្អក និងវិខានដំណេក ។

- វាអាចបណ្តាលឲ្យអ្នកជំងឺស្រកទំងន់ ឆេះឆាវ ស្រាំស្លឹងជំនី ហើយអាចឲ្យអ្នកជំងឺ សន្លប់ទៀតផង ។ មានចំនួនអ្នកកើតជំងឺនេះរហូតដល់ទៅ 2 នាក់ ក្នុងចំណោមយុវវ័យ 100 នាក់ និង 5 នាក់ ក្នុង ចំណោមមនុស្សចាស់ 100 នាក់ ដែលកើតជំងឺក្អកមាន ត្រូវសំរាកពេទ្យ ឬកើតជំងឺផ្សេងៗទៀតមកជាមួយ ដោយរួមទាំង ជំងឺរលាកទងស្បែក និងស្លាប់បាត់បង់ជីវិត ។

ជំងឺទាំងបីប្រភេទនេះ បណ្តាលមកពីមេរោគបាត់តេរី ។ ជំងឺខាន់ស្តាក់ និងជំងឺក្អកមាន អាចឆ្លងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ បាន ។ ជំងឺតេតានុសឆ្លងចូលក្នុងរាងកាយ មនុស្សតាមស្នាមមុត ដាច់ស្បែក ឬរបួស ។

នៅសហរដ្ឋអាមេរិក មានមនុស្សចំនួន 200,000 នាក់ ក្នុងមួយឆ្នាំ កើតជំងឺខាន់ស្តាក់ និងជំងឺក្អកមាន ហើយមានករណីរាប់រយ បានកើតជំងឺតេតានុស នៅមុនពេលមានថ្នាំចាក់បង្ការ ។ ចាប់ តាំងពីមានថ្នាំចាក់បង្ការមក ករណីកើតជំងឺតេតានុស និងជំងឺខាន់ស្តាក់ មានការធ្លាក់ចុះ ប្រហែលជា 99% ហើយជំងឺក្អកមាន បានធ្លាក់ចុះប្រហែលជា 92% ។

កុមារដែលមានអាយុ 6 ឆ្នាំ និងក្មេងជាងនេះ ត្រូវទទួលថ្នាំបង្ការ DTaP ដើម្បីការពារពួកគេកុំឲ្យកើតជំងឺទាំងបីប្រភេទនេះ ។ តែ កុមារដែលមានអាយុច្រើនជាងនេះ យុវវ័យ និងមនុស្សចាស់ ក៏ត្រូវការការពារផងដែរ ។

2 ថ្នាំបង្ការ សម្រាប់យុវវ័យ និងមនុស្សចាស់៖ Td និង Tdap

មានថ្នាំបង្ការចំនួនពីរ សម្រាប់ការពារកុមារដែលមានអាយុ 7 ឆ្នាំ និងចាស់ជាងនេះ ពីជំងឺទាំងនេះ ៖

- **ថ្នាំបង្ការ Td vaccine** ត្រូវបានយកមកប្រើប្រាស់អស់រយៈពេល ជាច្រើនឆ្នាំ ។ វាជាថ្នាំបង្ការជំងឺតេតានុស និងជំងឺខាន់ស្តាក់ ។
- **ថ្នាំបង្ការ Tdap** ត្រូវបានចេញលិខិតឲ្យប្រើប្រាស់ក្នុងឆ្នាំ 2005 ។ វាជាថ្នាំបង្ការ ដំបូងសម្រាប់យុវវ័យ និងមនុស្សចាស់ ដែលជួយការពារជំងឺក្អកមាន តេតានុស និងជំងឺខាន់ស្តាក់ ។

ថ្នាំបង្ការ Td សម្រាប់ចាក់រំពួក គឺបានណែនាំឲ្យចាក់ក្នុងរវាង 10 ឆ្នាំម្តង ។ រីឯថ្នាំបង្ការ Tdap វិញ ត្រូវចាក់តែម្តងទេ ក្នុងមួយ ជីវិត ។

3 តើអ្នកត្រូវចាក់ថ្នាំបង្ការមួយណា និងចាក់នៅ ពេលណា ?

- ចាប់ពីអាយុ 7 ឆ្នាំ ដល់ 18 ឆ្នាំ
- ការចាក់ថ្នាំបង្ការ Tdap ឲ្យគ្រប់ជួស គឺត្រូវចាក់ក្នុងពេលអ្នកមានអាយុ 11 ឬ 12 ឆ្នាំ ។ ជួសនេះ អាចចាក់បានដែរពេលកុមារ មានអាយុ 7 ឆ្នាំ សម្រាប់កុមារដែលមិនបានចាក់ DTaP មួយជួស ឬច្រើនជួសពេលគេនៅតូច ។

Td/Tdap VIS (1/24/12) - Cambodian

- កុមារ និងយុវវ័យ ដែលមិនបានចាក់ DTaP គ្រប់ចំនួន ពេលដែលគេមានអាយុគ្រប់ 7 ឆ្នាំ គួរតែចាក់ឲ្យគ្រប់ចំនួន ដោយការចាក់រួមគ្នានៃ Td និង Tdap ។

អាយុ 19 ឆ្នាំ និងចាស់ជាងនេះ

- មនុស្សចាស់ទាំងអស់ គួរចាក់ថ្នាំបង្ការ Td ជាលក្ខណៈរំពួក ក្នុងរវាង 10 ឆ្នាំ ម្តង ។ មនុស្សចាស់ដែលមានអាយុក្រោម 65 ឆ្នាំ ដែលមិនធ្លាប់បានទទួលថ្នាំបង្ការ Tdap គួរចាក់ថ្នាំ Tdap នេះ មួយជួស សម្រាប់ជាជួសចាក់រំពួកមួយ ។ មនុស្សចាស់ ដែលមានអាយុ 65 ឆ្នាំ ឬចាស់ជាងនេះ អាច ចាក់ Tdap មួយជួសជាការរំពួក ។
- មនុស្សចាស់ (រួមទាំងស្ត្រី ដែលអាចមានផ្ទៃពោះ ព្រមទាំងមនុស្សដែលមានអាយុ 65 ឆ្នាំ ឬចាស់ជាងនេះ) ដែលរំពឹងថាត្រូវនៅក្បែរទារកដែលមានអាយុក្រោម 12 ខែ គួរតែចាក់ថ្នាំបង្ការ Tdap មួយជួស ដើម្បីជួយការពារទារកពីជំងឺក្អកមាន ។
- អ្នកឯកទេសថែទាំសុខភាព ដែលប៉ះពាល់អ្នកជំងឺដោយផ្ទាល់ នៅមន្ទីរពេទ្យ ឬគ្លីនិក គួរចាក់ថ្នាំបង្ការ Tdap មួយជួស ។

ការការពារក្រោយពេលមានរបួស

- អ្នកដែលមុត របួលក្នុងផ្ទៃ អាចត្រូវចាក់ថ្នាំបង្ការ Td ឬ Tdap មួយជួស ដើម្បី ការពារការឆ្លងមេរោគតេតានុស ។ ថ្នាំបង្ការ Tdap គួរប្រើជាមួយនឹងនរណា ដែល មិនធ្លាប់បានទទួលជួសនេះពីមុនមក ។ យើងគួរតែយកថ្នាំបង្ការ Td មកប្រើ ប្រសិនបើយើងមិនមានថ្នាំបង្ការ Tdap ទេនោះ ឬគួរយកមកប្រើជាមួយ ៖
 - នរណាម្នាក់ ដែលបានទទួលជួស Tdap រួចមកហើយ
 - កុមារដែលមានអាយុពី 7 ដល់ 9 ឆ្នាំ ដែលបានទទួលថ្នាំបង្ការ DTaP គ្រប់ចំនួនជួសកាលពីនៅតូច ឬប្រើជាមួយ
 - មនុស្សចាស់ដែលមានអាយុចាប់ពី 65 ឆ្នាំឡើងទៅ ។

ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ

- ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ ដែលមិនធ្លាប់បានទទួលជួសនៃថ្នាំបង្ការ Tdap គួរតែចាក់មួយជួស ក្រោយពីពោះបានចំនួន 20 សប្តាហ៍ និងជាការល្អគួរចាក់ក្នុងពេលពោះពោះបាន បីខែ ។ បើស្ត្រីមានគភ៌ មិនបានទទួលថ្នាំបង្ការ Tdap ក្នុងពេលពោះពោះទេនោះ នាងគួរតែបានទទួលមួយជួស ភ្លាមៗក្រោយពេលសម្រាល ។ ស្ត្រីមានគភ៌ ដែល បានទទួលថ្នាំបង្ការ Tdap កាលពីពេលមុនរួចហើយ ហើយត្រូវការចាក់ថ្នាំបង្ការ តេតានុស ឬថ្នាំបង្ការជំងឺខាន់ស្តាក់ ក្នុងពេលពោះពោះ គួរតែចាក់ Td ។

ថ្នាំបង្ការ Tdap ឬ Td អាចចាក់បានក្នុងពេលតែមួយ ដូចថ្នាំបង្ការ ដទៃទៀតដែរ ។

4 អ្នកខ្លះមិនគួរចាក់ថ្នាំបង្ការនេះទេ ឬគួររង់ចាំសិន

- អ្នកដែលមានការប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិត ពីការប្រតិបត្តិថ្នាំ ក្រោយការចាក់ថ្នាំ បង្ការមួយជួស នៃថ្នាំបង្ការ ជំងឺតេតានុស ខាន់ស្តាក់ ឬក្អកមាន មិនគួរចាក់ថ្នាំបង្ការ Td ឬ Tdap ឡើយ ។
- អ្នកណាម្នាក់ដែលមានប្រតិកម្មខ្លាំងក្លា ចំពោះសមាសធាតុថ្នាំបង្ការណាមួយ មិនគួរចាក់ ថ្នាំបង្ការនេះឡើយ ។ សូមប្រាប់ គ្រូពេទ្យរបស់អ្នកឲ្យបានដឹង ប្រសិនបើអ្នកដែលមក ចាក់ថ្នាំបង្ការ មានប្រតិកម្មថ្នាំធ្ងន់ធ្ងរ ។
- នរណាម្នាក់ដែលកើតជំងឺរលត់ស្មារតី ឬកើតជំងឺក្នុងរយៈពេលវែង ឬកើតជំងឺច្រើនមុខ ក្នុងរវាង 7 ថ្ងៃ ក្រោយពេលបានទទួលថ្នាំ DTP ឬ DTaP មួយជួស មិនគួរចាក់ Tdap ឡើយ ប្រសិនបើ មិនមានការរកឃើញថា មូលហេតុនៃការកើតជំងឺ ដោយសាររឿងផ្សេង ក្រៅពីថ្នាំបង្ការទេនោះ ។ អ្នកទាំងនេះ ប្រហែលជាអាចទទួលថ្នាំបង្ការជំងឺ Td បាន ។



- ចូរព្រាប់ឲ្យគ្រូពេទ្យបានដឹង ប្រសិនបើអ្នកមកចាក់ថ្នាំបង្ការ កើតជំងឺណាមួយដូចជា ៖
 - ជំងឺឃ្នង ឬបានបញ្ជាក់ជំងឺប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទផ្សេងទៀត
 - ហើម ឬឈឺខ្លាំង ក្រោយពេលចាក់មួយដួសមុន នៃថ្នាំបង្ការ DTP, DTaP, DT, Td ឬថ្នាំបង្ការ Tdap ឬ
 - កើត Guillain Barré Syndrome (GBS-ជំងឺពិការប្រព័ន្ធ សរសៃប្រសាទ) ។

នរណាម្នាក់ដែលឈឺមធ្យម ឬធ្ងន់ធ្ងរ ក្នុងថ្ងៃមកចាក់ថ្នាំបង្ការនេះ គួររង់ចាំរហូតដល់ជាសះស្បើយ មុននឹងចាក់ថ្នាំបង្ការ Tdap ឬ Td ។ អ្នកណាដែលឈឺតិចតួច ឬក្តៅខ្លួនតិចៗ អាចចាក់ ថ្នាំបង្ការនេះបាន ។

5 តើមានហានិភ័យអ្វីទេចំពោះថ្នាំបង្ការ Tdap និង Td?

ថ្នាំបង្ការ ក៏ដូចជាថ្នាំទូទៅ តែងតែមានហានិភ័យតិចតួច ចំពោះប្រតិកម្មបញ្ហាសទិសចំពោះគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិត ឬបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀត ។

បាត់ស្មារតីបន្តិច និងមានរោគសញ្ញាដែលពាក់ព័ន្ធ (ដូចជាមានចលនាញាប់ញាត់) អាចកើតឡើង ក្រោយពេលធ្វើទម្រង់ការវេជ្ជសាស្ត្រណាមួយ មានរួមទាំងចាក់ថ្នាំបង្ការ ។ ចូរអង្គុយ ឬដេកចំនួនប្រហែលជា 15 នាទី ក្រោយពេលចាក់ថ្នាំបង្ការ អាចជួយការពារការវិលមុខ និងរបួសស្នាម បណ្តាលពីការដួល ។ ចូរព្រាប់ឲ្យគ្រូពេទ្យបានដឹង ប្រសិនបើអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងរួច មានអារម្មណ៍វិលមុខ ឬឈឺក្បាលតិចៗ ឬមើលឃើញអ្វីខុស ប្រក្រតី ឬហ៊ឹងត្រចៀក ។

ការកើតជំងឺតេតានុស ខាន់ស្លាក់ ឬជំងឺក្អកមាន់ អាចបង្កឲ្យមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំង ជាងបញ្ហាពីថ្នាំបង្ការ Td ឬ Tdap ។

បញ្ហានានាដែលគេបានរាយការណ៍ឲ្យបានដឹង ក្រោយទទួលថ្នាំបង្ការ Td និង Tdap មានដូចខាងក្រោម ។

បញ្ហាតិចតួច
(អាចកត់សំគាល់ឃើញបាន តែមិនបង្កការរំខានដល់សកម្មភាព ឡើយ)

- Tdap**
- ឈឺ (ប្រហែលជា 3 នាក់ក្នុងចំណោម 4 នាក់យុវវ័យ និង 2 នាក់ក្នុងចំណោម 3 នាក់មនុស្សចាស់)
 - ឡើងក្រហម ឬហើមត្រង់បរិវេណចាក់ម្តុល (ប្រហែល 1 ក្នុង 5 នាក់)
 - គ្រុនក្តៅតិចតួច ដែលខ្លួនឡើងកំដៅយ៉ាងហោចណាស់ក៏ 100.4°F (រហូតដល់ទៅ 1 នាក់ ក្នុងចំណោម 25 នាក់យុវវ័យ និង 1 នាក់ក្នុង 100 នាក់មនុស្សចាស់)
 - ឈឺក្បាល (ប្រហែល 4 នាក់ ក្នុងចំណោម 10 នាក់យុវវ័យ និង 3 នាក់ក្នុងចំណោម 10 នាក់មនុស្សចាស់)
 - ហេរហត់ (ប្រហែលជា 1 នាក់ក្នុងចំណោម 3 នាក់យុវវ័យ និង 1 នាក់ក្នុងចំណោម 4 នាក់មនុស្សចាស់)
 - ចង់ក្អក ក្អក រាគ ឈឺពោះ (រហូតដល់ទៅ 1 នាក់ក្នុងចំណោម 4 នាក់យុវវ័យ និង 1 នាក់ក្នុងចំណោម 10 នាក់មនុស្សពេញវ័យ)
 - រងារញ័រញ័ក ឈឺខ្លួន ឈឺសន្លាក់ ឡើងកន្ទួល ហើមកូនកណ្តុរ (មិនធម្មតា)

- Td**
- ឈឺ (រហូតដល់ទៅ 8 ក្នុងចំណោម 10 នាក់)
 - ឡើងក្រហម ឬហើមត្រង់បរិវេណចាក់ម្តុល (រហូតដល់ទៅ 1 នាក់ក្នុងចំណោម 3 នាក់)
 - គ្រុនក្តៅតិចតួច (រហូតដល់ទៅមួយ 1 នាក់ ក្នុងចំណោម 15 នាក់)
 - ឈឺក្បាល ឬអស់កម្លាំង (មិនប្រក្រតី)

មញ្ញាមធ្យម
(ធ្វើឲ្យរំខានដល់សកម្មភាពនានា តែមិនចាំបាច់ព្យាបាលឡើយ)

- Tdap**
- ឈឺត្រង់បរិវេណចាក់ម្តុល (ប្រហែល 1 នាក់ ក្នុងចំណោម 20 នាក់យុវវ័យ និង 1 នាក់ ក្នុងចំណោម 100 នាក់មនុស្សចាស់)
 - ឡើងក្រហម ឬហើមត្រង់បរិវេណចាក់ម្តុល (រហូតដល់ទៅ 1 នាក់ ក្នុងចំណោម 16 នាក់យុវវ័យ និង 1 នាក់ ក្នុងចំណោម 25 នាក់មនុស្សចាស់)
 - គ្រុនឡើងកំដៅលើសពី 102°F (ប្រហែល 1 នាក់ ក្នុងចំណោម 100 នាក់ យុវវ័យ និង 1 នាក់ ក្នុងចំណោម 250 នាក់មនុស្សចាស់)
 - ឈឺក្បាល (1 នាក់ ក្នុងចំណោម 300 នាក់)
 - ចង់ក្អក ក្អក រាគ ឈឺពោះ (រហូតដល់ទៅ 3 នាក់ ក្នុងចំណោម 100 នាក់យុវវ័យ និង 1 នាក់ ក្នុងចំណោម 100 នាក់មនុស្សចាស់)

- Td**
- គ្រុនឡើងកំដៅលើសពី 102°F (កម្រ)
- Tdap ឬ Td**
- ហើមដៃខ្លាំង ត្រង់បរិវេណចាក់ម្តុល (រហូតដល់ទៅ 3 នាក់ ក្នុងចំណោម 100 នាក់) ។

បញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរ
(មិនអាចធ្វើសកម្មភាពធម្មតាបាន ត្រូវឲ្យពេទ្យព្យាបាល)

- Tdap ឬ Td**
- ហើម ឈឺខ្លាំង ចេញឈាម និងឡើងក្រហម លើដៃ ត្រង់បរិវេណចាក់ម្តុល (កម្រ) ។
- ប្រតិកម្មបញ្ហាសទិសធ្ងន់ធ្ងរ អាចកើតឡើង ក្រោយពេល ទទួលថ្នាំបង្ការណាមួយ ។ តែចំនួន ប៉ាន់ស្មានដែលករណីនេះ អាចកើតឡើងមានចំនួនតិចជាងមួយដង ក្នុងមួយលានដួស ។

6 តើត្រូវធ្វើដូចម្តេច បើមានប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរកើតឡើង?

តើខ្ញុំអ្នកមើលអ្វី?
ចំពោះស្ថានភាពមិនប្រក្រតី មានដូចជាប្រតិកម្មបញ្ហាសទិសធ្ងន់ធ្ងរ ឬគ្រុនក្តៅខ្លាំង ។ ប្រសិនបើមានប្រតិកម្មបញ្ហាសទិសធ្ងន់ធ្ងរកើតឡើង វានឹងកើតឡើងក្នុងរវាងពីរបីនាទី ទៅមួយម៉ោង បន្ទាប់ពីចាក់រួច ។ សញ្ញានៃប្រតិកម្មបញ្ហាសទិសធ្ងន់ធ្ងរ មានដូចជា ពិបាកដកដង្ហើម ខ្សោយកម្លាំង ដកដង្ហើមឮដឹកៗ ឬអ្វីកៗ បេះដូងដើរញាប់ ឡើងបន្ទាលត្រអាក វិលមុខ ស្លេក ឬ ហើមបំពង់ក ។

- តើខ្ញុំអ្នកធ្វើអ្វី?**
- ហៅទូរស័ព្ទមកជួបគ្រូពេទ្យ ឬបញ្ជូនអ្នកជំងឺមកជួបគ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់ ។
 - ប្រាប់គ្រូពេទ្យរបស់អ្នកអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើង និងពេលវេលាដែលបានកើតឡើង និងពេលដែលអ្នកជំងឺបានទទួលការចាក់ថ្នាំបង្ការ ។
 - ប្រាប់ដល់អ្នកផ្តល់សេវាឲ្យអ្នក ធ្វើរបាយការណ៍ពីប្រតិកម្ម បញ្ហាសទិសដោយការបំពេញសំណុំរបបបទ Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS-ប្រព័ន្ធការធ្វើរបាយការណ៍ហេតុការណ៍ប្រតិកម្មបញ្ហាសទិសរបស់ថ្នាំ បង្ការ) ។ ឬអ្នកក៏អាចរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ តាមរយៈ គេហទំព័ររបស់ VAERS តាមរយៈអាសយដ្ឋាន www.vaers.hhs.gov ឬដោយការហៅទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ **1-800-822-7967** ។

VAERS មិនផ្តល់ជូនព័ត៌មានវេជ្ជសាស្ត្រឡើយ ។

7 កម្មវិធីផ្តល់សំណងរបួសស្នាមបណ្តាលពីថ្នាំបង្ការ

The National Vaccine Injury Compensation Program (VICP-កម្មវិធីជាតិផ្តល់សំណងរបួសស្នាមបណ្តាលពីថ្នាំបង្ការ) ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 1986 ។ អ្នកដែលជឿជាក់ថាខ្លួនអាចមានរបួសស្នាមបណ្តាលពីថ្នាំបង្ការ អាចអានឲ្យបានដឹងពីកម្មវិធីផ្តល់សំណង និងរបៀបដាក់ពាក្យ ទាសំណង ដោយការហៅទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ **1-800-338-2382** ឬទស្សនាគេហទំព័ររបស់ VICP ដែលមានអាសយដ្ឋាន www.hrsa.gov/vaccinecompensation ។

8 តើខ្ញុំអាចបានដឹងពីតិរិះបន្ថែមដោយរបៀបណា?

- គ្រូពេទ្យរបស់អ្នក អាចផ្តល់ឲ្យអ្នកនូវកញ្ចប់ព័ត៌មានថ្នាំ បង្ការ ដល់អ្នក ឬប្រាប់អ្នកពីប្រភពព័ត៌មានផ្សេងទៀតដល់អ្នក ។
- ចូរហៅទូរស័ព្ទទៅកាន់នាយកដ្ឋានសុខាភិបាលប្រចាំតំបន់ ឬនាយកដ្ឋានសុខាភិបាលប្រចាំរដ្ឋរបស់អ្នក ។
- ចូរទាក់ទងជាមួយនឹង Centers for Disease Control and Prevention (CDC-មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រង និងការពារជំងឺ) ៖
 - ហៅមកលេខ **1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO)** ឬ
 - ទស្សនាគេហទំព័ររបស់ CDC តាមរយៈអាសយដ្ឋាន www.cdc.gov/vaccines