

B 血清群腦膜炎球菌疫苗 (MenB): 須知事項

Many Vaccine Information Statements are available in Traditional Chinese and other languages. See www.immunize.org/vis
許多疫苗資訊聲明有西班牙語及其他語言版本。請瀏覽 www.immunize.org/vis

1 為何要接種疫苗？

腦膜炎球菌病是由一種稱作腦膜炎雙球菌的細菌引起的嚴重疾病。它會導致腦膜炎(腦膜和脊髓感染)和血液感染。腦膜炎球菌病經常在沒有警告的情況下發病——對健康人群亦是如此。

腦膜炎球菌病可透過近距離接觸(咳嗽或接吻)或長時間接觸在人與人之間傳播,尤其是同一個家庭生活的人之間。

目前至少有 12 種腦膜炎雙球菌(稱作「血清群」)。A、B、C、W 和 Y 血清群導致多數腦膜炎球菌病。

任何人都有可能患上腦膜炎球菌病,但特定人群的風險更高,包括:

- 不足一歲的嬰兒
- 16 歲到 23 歲的青少年和年輕成人
- 患有某些影響免疫系統之疾病的人群
- 工作中經常需要處理腦膜炎雙球菌菌株的微生物學家
- 因為社區爆發疾病而面臨風險的人群

即使接受治療,每 100 個腦膜炎球菌病感染者中仍會有 10 到 15 人死亡。並且,每 100 個倖存者約有 10 到 20 人會因疾病而致殘,例如聽力損失、腦部損傷、腎臟損傷、截肢、神經系統問題或因接受植皮手術導致嚴重疤痕。

B 血清群腦膜炎球菌 (MenB) 疫苗可幫助預防 B 血清群導致的腦膜炎球菌病。建議接種其他腦膜炎球菌疫苗以幫助預防 A、C、W 和 Y 血清群。

2 B 血清群腦膜炎球菌疫苗

Food and Drug Administration (FDA) (美國食品藥物管理局) 已核准兩種 B 血清群腦膜炎球菌疫苗——Bexsero® 和 Trumenba®。

建議 10 歲以上 B 血清群腦膜炎球菌感染高危險群定期接種這些疫苗,這些人包括:

- 因 B 血清群腦膜炎球菌病爆發流行而有患病風險的人
- 脾臟損傷或被摘除的任何人
- 患有稱作「持續性補體成分缺乏症」的罕見免疫系統疾病的任何人
- 目前服用依庫麗單抗(亦稱作 Soliris®)藥物的任何人
- 工作中經常需要處理腦膜炎雙球菌菌株的微生物學家

16 歲到 23 歲的任何人也可接種這些疫苗,以提供針對大多數 B 血清群腦膜炎球菌病的短期保護;16 歲到 18 歲是接種的最佳年齡。

為獲得最佳預防效果,須接種超過 1 劑 B 血清群腦膜炎球菌疫苗。所有劑量必須使用相同的疫苗。請詢問您的健康護理提供者,了解接種的劑數與時間。

3 某些人不應接種這些疫苗

請告訴為您接種疫苗的人:

- **您曾經有任何嚴重、危及生命的過敏反應。**
如果您曾在接種一劑 B 血清群腦膜炎球菌疫苗後出現危及生命的過敏反應,或對該疫苗的任何成分嚴重過敏,則不應接種此疫苗。告訴您的健康護理提供者任何您曾經發生的嚴重過敏,包括嚴重的乳膠過敏。他/她會為您說明疫苗的成分。
- **您目前懷孕或正在哺乳。**
有關此疫苗對孕婦或哺乳母親有何潛在風險的資訊並不多。僅當確實有需要時方可在懷孕期間使用疫苗。

如果您患有感冒等輕度疾病,您很可能在當天就可接種疫苗。如果您患有中度或重度疾病,則應該等到康復後再接種。您的醫生能為您提供建議。

4 疫苗反應風險

任何藥物，包括疫苗在內，都可能產生反應。這些反應通常都很輕微，可以自行消失，但也可能產生嚴重反應。

接種 B 血清群腦膜炎球菌疫苗的人，有一半以上在接種疫苗後出現輕微反應。這些反應會持續 3 到 7 天，並包括：

- 注射部位出現疼痛、發紅或腫脹
- 疲勞或疲憊
- 頭痛
- 肌肉或關節疼痛
- 發燒或發冷
- 嘔吐或腹瀉

接種此疫苗後可能出現的其他問題：

- 在接受任何醫療程序（包括接種疫苗）後有時會出現暈厥。在接種疫苗後坐臥約 15 分鐘有助於預防暈厥及因跌倒而受傷。如果您感到眩暈、視力發生變化或出現耳鳴，請告訴您的健康護理提供者。
- 有些人會感覺肩膀疼痛，而且比注射後通常會產生的痠痛更嚴重且持續更久。此情況十分罕見。
- 任何藥物都可能導致嚴重的過敏反應。疫苗造成如此反應的情況十分罕見，估計一百萬劑接種中約發生 1 例，並且通常會在接種疫苗後幾分鐘至幾小時內發生。

就像任何藥物一樣，疫苗造成嚴重傷害或死亡的概率很小。

疫苗的安全性始終得到監控。欲瞭解更多資訊，請瀏覽：www.cdc.gov/vaccinesafety

5 如果出現嚴重反應，該怎麼辦？

我該注意什麼？

- 留意任何引起您擔心的情況，如嚴重過敏反應、發高燒或行為異常的跡象。

嚴重過敏反應的跡象可能包括蕁麻疹、面部及喉嚨腫脹、呼吸困難、心跳加快、頭暈及虛弱。這些跡象通常會在接種疫苗後幾分鐘至幾小時後開始出現。

我該怎麼辦？

- 如果您認為是**嚴重過敏反應**或其他不能耽擱的緊急情況，請致電 9-1-1 並前往最近的醫院，否則請致電您的診所。

隨後，本次反應應向 Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) (疫苗不良事件報告系統) 通報。您的醫生應提交此報告，或者您可透過 VAERS 網站 www.vaers.hhs.gov 或致電 1-800-822-7967 自行報告。

VAERS 不提供醫療意見。

6 國家疫苗傷害賠償計劃

National Vaccine Injury Compensation Program (VICP) (國家疫苗傷害賠償計劃) 是一項聯邦計劃，其創立是為了對可能因某些疫苗而受到傷害之人士作出賠償。

認為自己可能受到疫苗傷害的人士可透過致電

1-800-338-2382 或瀏覽 VICP 網站

www.hrsa.gov/vaccinecompensation 對該計劃進行瞭解，並知道如何提出索償。提出索償是有時間限制的。

7 如何獲知更多？

- 請詢問您的健康護理提供者，其會向您提供疫苗的包裝說明書或建議其他資訊來源。
- 致電您當地或州衛生部門。
- 聯絡 Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (疾病控制和預防中心)：
 - 致電 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) 或
 - 瀏覽 CDC 網站：www.cdc.gov/vaccines

Vaccine Information Statement
Serogroup B Meningococcal Vaccine

8/9/2016

Traditional Chinese

Office Use Only



42 U.S.C. § 300aa-26