

VAKCINA PROTIV TETANUSA I DIFTERIJE (Td)

Što je potrebno da znate prije nego li vi ili vaše dijete dobije vakcinu?



U.S. DEPARTMENT OF HEALTH & HUMAN SERVICES
Centers for Disease Control and Prevention
National Immunization Program

Td - Croatian 6/10/94

O BOLESTIMA

Tetanus (blokada vilice) i difterija su ozbiljne bolesti. Tetanus izaziva bakterija koja prodre u tijelo kroz posjekotinu ili ranu.

Difterija se prenosi kada bakterije predju sa inficirane osobe u nos ili grlo drugih osoba.

Tetanus izaziva:

Ozbiljne, bolne grčeve mišića

Može da dovede do:

- "blokade" vilice tako da pacijent ne može da otvori usta ili da guta

Difterija izaziva:

debelu naslagu u nosu, grlu ili disajnim organima

Može da dovede do:

- disajnih problema
- problema srca
- paralize
- smrti

O VAKCINAMA

Prednosti vakcina

Vakcinacija je najbolji način da se zaštiti od tetanusa i difterije. Zahvaljujući vakcinaciji javlja se sve manje oboljenja. Bolesti se rijetko javljaju kod djece jer većina primi DTP (difterija, tetanus i veliki kašalj), DtaP (difterija, tetanus i acellular veliki kašalj) ili DT (difterija i tetanus) vakcine. Ukoliko bi se prestalo sa vakcinisanjem, bilo bi mnogo više slučajeva bolesti.

Kada trebate primiti vakcinu?

Td se primijenjuje za osobe stare 7 godina ili više.

Osobe koje nisu primile bar 3 doze neke od vakcina protiv tetanusa ili difterije (DTP, DTaP ili DT) u životu, treba da prime Td vakcinu. Kada osoba primi treću dozu, potrebno je primiti Td vakcinu svakih 10 godina tijekom cijelog života.

Druge vakcine se mogu primiti u isto vrijeme.

Potrebno je reći liječniku ili medicinskoj sestri ako je osoba koja treba da primi vakcinu:

- ikada doživjela ozbiljne alergijske reakcije ili druge probleme sa Td ili nekom drugom vakcinom protiv tetanusa i difterije (DTP, DtaP ili DT)
- sada ima zdravstvene probleme
- je trudna

Ukoliko imate dileme, pitajte liječnika ili medicinsku sestru.

Što su rizici od Td vakcine?

Kao i sa svakim lijekom, postoje mali rizici od pojave ozbiljnih problema, koji mogu uključiti čak i smrt, nakon primanja ove vakcine.

Rizici od vakcine su daleko manji od rizika koje može izazvati bolest ukoliko bi se prestalo sa davanjem vakcine.

Skoro sve osobe koje prime Td vakcinu nemaju problema od nje.

Blagi problemi

Ako se ovi problemi pojave, oni počnu nakon nekoliko sati ili dan, dva poslije primanja vakcine. Mogu trajati 1 - 2 dana.

- Crvenilo ili otok na mjestu prijema injekcije

Ovi problemi mogu biti izraženiji kod odraslih osoba koje primaju vakcinu.

Može se primijeniti acetaminophen ili ibuprofen (lijek koji ne sadrži aspirin) za smanjenje otečenosti.

Ozbiljni problemi

Ovi problemi se događaju **veoma rijetko**:

- Ozbiljne alergijske reakcije
- Duboki bol i mrtvilo mišića u gornjem dijelu ruke. Ovo se može pojaviti 2 dana do 4 tjedna nakon injekcije i može trajati više mjeseci.

Što uraditi ako dodje do ozbiljne reakcije:

- ☞ Pozovite liječnika ili prebacite oboljelu osobu do liječnika
- ☞ Zapišite što se dogodilo, dan i vrijeme kada se to dogodilo
- ☞ Zamolite vašeg liječnika, medicinsku sestru ili zdravstveno odjeljenje da prijave Izvještaj o neželjenim posljedicama vakcinacije (Vaccine Adverse Event Report) ili nazovite (besplatan broj) 1-800-822-7967.

Nacionalni program za odštetu u slučaju povreda prilikom vakcinisanja (National Vaccine Injury Compensation program) obezbijedjuje kompenzaciju (isplatu) osobama za koje se smatra da su ozlijeđeni vakcinacijom. Za detaljne informacije nazovite: (800) 338-2382 (besplatan poziv)

Ukoliko želite više informacija, obratite se vašem liječniku ili medicinskoj sestri. Ona/on vam mogu dati informacije iz pakovanja vakcine ili predložiti druge izvore informacija.

