

VACCINATION CONTRE L'HEPATITE A

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR

1 Qu'est-ce-que l'hépatite A ?

L'hépatite A est une grave maladie du foie causée par le virus de l'hépatite A (VHA). Ce virus (VHA) est présent dans les selles d'une personne contaminée. Le virus se propage généralement par contact physique et parfois par l'absorption d'aliments ou d'eau contaminée par le VHA.

L'hépatite A peut entraîner :

- symptômes légers de la grippe
- jaunisse (peau ou yeux jaunes)
- douleurs abdominales intenses et diarrhées importantes

L'hépatite A nécessite souvent une hospitalisation. Dans de très rares cas, l'hépatite A peut entraîner la mort.



Une personne atteinte d'hépatite A peut facilement communiquer la maladie aux personnes dans son entourage.

Le vaccin contre l'hépatite A peut prévenir l'hépatite A.

2 Qui doit recevoir le vaccin et quand ?

- Les personnes âgées de plus de 2 ans voyageant ou travaillant dans des pays où le taux d'hépatite A est élevé, tels que les pays d'Amérique Centrale et du Sud, les Caraïbes, le Mexique, l'Asie (à l'exception du Japon), l'Afrique, et les pays d'Europe du Sud et de l'Est. *La série de vaccins doit être commencée au moins un mois avant le voyage.*
- Les personnes vivant dans les communautés soumises à des épidémies prolongées d'hépatite A.

- Les personnes vivant dans des communautés où le taux d'hépatite A est élevé, par exemple : les amérindiens, les natifs de l'Alaska et des îles pacifiques, ainsi que certaines communautés religieuses.
- Les homosexuels masculins.
- Les toxicomanes.
- Les personnes atteintes d'une maladie chronique du foie.
- Les personnes qui reçoivent des concentrés de coagulation.

Deux doses du vaccin, administrées à 6 mois d'intervalle minimum, sont nécessaires pour assurer une protection de longue durée.

Le vaccin contre l'hépatite A peut être administré en même temps que d'autres vaccins.



3 Certaines personnes ne doivent pas recevoir le vaccin contre l'hépatite A, ou doivent attendre

Les personnes qui ont déjà fait une réaction allergique grave à une dose précédente du vaccin contre l'hépatite A ne doivent pas recevoir une nouvelle dose.

Les personnes légèrement malades lors du vaccin peuvent recevoir l'injection. Les personnes atteintes d'une maladie sérieuse ou grave lors de la vaccination doivent attendre d'être guéries avant de recevoir l'injection. Demandez conseil à votre médecin ou infirmière.

Les contre indications du vaccin contre l'hépatite A pour la femme enceinte n'ont pas encore été complètement exclues. Cependant, il est reconnu que le risque pour la femme enceinte ou le fœtus est minime.

Demandez conseil à votre médecin ou infirmière.

4

Quels sont les risques du vaccin contre l'hépatite A ?

Comme tous les médicaments, les vaccins peuvent entraîner des réactions allergiques graves. Le vaccin contre l'hépatite A comporte très peu de risques de réaction allergique ou de mort.

Le vaccin est beaucoup moins dangereuse que la maladie elle-même.

Problèmes bénins

- douleur au site d'injection (*peut atteindre 1 cas sur 2 chez les personnes adultes et 1 cas sur 5 chez les enfants*)
- maux de tête (*peut atteindre 1 cas sur 6 chez les personnes adultes et 1 cas sur 20 chez les enfants*)
- perte d'appétit (*peut atteindre 1 cas sur 12 chez les enfants*)
- fatigue (*peut atteindre 1 cas sur 14 chez les personnes adultes*)

S'ils surviennent, ces symptômes se présentent en règle générale de 3 à 5 jours après l'injection et se prolongent de 1 à 2 jours.

Problèmes graves

- Réaction allergique grave dans les minutes ou les quelques heures qui suivent l'injection (*très rare*).

5

Que faire en cas de réaction sérieuse ou grave ?

Quels sont les symptômes à surveiller ?

Tout symptôme qui sort de l'ordinaire, tel que fièvre élevée ou changement dans le comportement. Les signes d'une réaction allergique comprennent difficultés respiratoires, voix enrouée ou respiration sifflante, éruption cutanée, pâleur, faiblesse, accélération du rythme cardiaque ou étourdissement.

Que faire ?

- Contactez un médecin ou emmenez immédiatement la personne chez un médecin.
- Expliquez au médecin ce qui c'est passé, la date et l'heure de la réaction et de la vaccination.
- Demandez à votre médecin, à une infirmière ou au service santé de remplir un formulaire VAERS (rapport de réaction adverse à la vaccination) ou contactez VAERS directement au 1-800-822-7967.

6

Pour en savoir davantage

- Demandez à votre médecin ou infirmière de vous remettre un dépliant sur le vaccin ou de vous suggérer d'autres sources d'informations.
- Contactez le programme d'immunisation du département pour la santé publique de votre état.
- Contactez les centres CDC pour le contrôle et la prévention des maladies :
 - Composez le **1-800-232-2522** (anglais)
 - Composez le **1-800-232-0233** (espagnol)
 - Consultez le site Internet du programme national d'immunisation à l'adresse suivante : <http://www.cdc.gov/nip> ou le site du CDC consacré à l'hépatite à : <http://www.cdc.gov/ncidod/diseases/hepatitis/hepatitis.htm>

IMMUNOGLOBULINE (IG)

L'immunoglobuline peut apporter une immunisation *temporaire* au virus de l'hépatite A.

Qui doit recevoir une IG ?

- Les personnes entrées en contact avec le virus de l'hépatite A peuvent recevoir une dose d'IG dans les deux semaines qui suivent le contact.
- Les personnes voyageant dans des pays où le taux d'hépatite A est très élevé (si elles n'ont pas reçu le vaccin contre l'hépatite A)

Quand l'IG doit-elle être administrée ?

L'IG peut être administrée avant tout contact avec le virus de l'hépatite A ou dans les deux semaines qui suivent le contact.

Avantages

L'IG immunise contre le virus de l'hépatite A pendant une période de 3 à 5 mois, en fonction de la dose.

Risques

Rares : enflure, éruption cutanée ou réaction allergique.



U.S. DEPARTMENT OF HEALTH & HUMAN SERVICES
Centers for Disease Control and Prevention
National Immunization Program

French - Hepatitis A (8/25/98)
Vaccine Information Statement
42 U.S.C. § 300aa-26

Translation provided by the Minnesota Department of Health