

H1N1 2009 ຢາວັກຊີນໂຂ້ຫວັດໃຫຍ່

ຊະນິດເຊື້ອຕາຍ
("ວັກຊີນໂຂ້ຫວັດໃຫຍ່")

ສິ່ງທີ່ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງຮູ້

ມີເອກະສານຂໍ້ມູນຫຼາຍຢ່າງກ່ຽວກັບວັກຊີນໃຫ້ທ່ານເປັນພາສາສະເປນ ແລະພາສາອື່ນໆ. ເບິ່ງທີ່ www.immunize.org/vis.

1 ໂຂ້ຫວັດໃຫຍ່ສາຍພັນ H1N1 2009 ແມ່ນຫຍັງ?

ໂຂ້ຫວັດໃຫຍ່ສາຍພັນ H1N1 2009 (ບາງຄັ້ງເອີ້ນວ່າ ໂຂ້ຫວັດໝູ) ມີສາເຫດມາຈາກເຊື້ອໂວຣັສໂຂ້ຫວັດໃຫຍ່ສາຍພັນໃໝ່. ມັນໄດ້ແຜ່ຂະຫຍາຍໄປສູ່ຫຼາຍປະເທດ.

ຄືກັນກັບເຊື້ອໂວຣັສໂຂ້ຫວັດໃຫຍ່ອື່ນໆ, ເຊື້ອໂວຣັສ H1N1 2009 ແຜ່ລາມຈາກຄົນໜຶ່ງໄປຫາອີກຄົນໜຶ່ງ ຜ່ານການ ໂອ, ຈາມ, ແລະບາງຄັ້ງ ໂດຍຜ່ານການຈັບບາຍສິ່ງຂອງທີ່ເປັນເປື້ອນເຊື້ອໂວຣັສນີ້.

ອາການຂອງການຕິດເຊື້ອໂວຣັສ H1N1 2009 ສາມາດລວມມີ:

- ອິດເມື່ອຍ
- ເປັນໂຂ້
- ເຈັບຄໍ
- ປວດເມື່ອຍກ້າມຊີ້ນ
- ໝາວສັ່ນ
- ໂອ
- ຈາມ

ບາງຄົນຍັງມີອາການຖອກທ້ອງ ແລະປວດຮາກ.

ຄົນສ່ວນຫຼາຍຮູ້ສຶກດີຂຶ້ນພາຍໃນໜຶ່ງອາທິດ. ແຕ່ບາງຄົນກໍເປັນໂຣກປອດບວມ ທີ່ເຈັບເປັນຮ້າຍແຮງແບບອື່ນໆ. ບາງຄົນອາດຕ້ອງໄດ້ນອນປິ່ນປົວໃນໂຮງໝໍ ແລະບາງຄົນກໍເຖິງກັບເສັ້ນຊີວິດ.

2 ໂຂ້ຫວັດໃຫຍ່ສາຍພັນ H1N1 2009 ແຕກຕ່າງຈາກໂຂ້ຫວັດທຳມະດາ (ໂຂ້ຫວັດຕາມລະດູການ) ແນວໃດ?

ໂວຣັສໂຂ້ຫວັດຕາມລະດູການປ່ຽນແປງຕິດປີ, ແຕ່ວ່າ ມັນກໍມີສ່ວນກ່ຽວພັນກັນຢ່າງແໜ້ນແກ່ນ.

ຜູ້ຄົນທີ່ເຄີຍຕິດເຊື້ອໂຂ້ຫວັດໃຫຍ່ໃນອະດີດ ທຳມະດາແລ້ວ ແມ່ນມີພູມຄຸ້ມກັນຕ້ານກັບເຊື້ອໂວຣັສໂຂ້ຫວັດໃຫຍ່ ຕາມລະດູການ (ຮ່າງກາຍສ້າງຄວາມສາມາດໃນການຕໍ່ສູ້ກັບເຊື້ອໂວຣັສຕ່າງໆ).

ເຊື້ອໂວຣັສໂຂ້ຫວັດໃຫຍ່ສາຍພັນ H1N1 2009 ແມ່ນເຊື້ອໂວຣັສສາຍພັນໃໝ່.

ມັນແຕກຕ່າງຈາກໂວຣັສໂຂ້ຫວັດໃຫຍ່ ຕາມລະດູການ.

ຄົນສ່ວນຫຼາຍມີພູມຕ້ານທານໃນຮ່າງກາຍຕໍ່ ໂຂ້ຫວັດໃຫຍ່ສາຍພັນ H1N1 2009 ຢູ່ເລັກນ້ອຍ ທີ່ ບໍ່ມີເລີຍ (ຮ່າງກາຍ ບໍ່ໄດ້ຖືກກະກຽມໃຫ້ຕໍ່ສູ້ກັບເຊື້ອໂວຣັສ).

3 ວັກຊີນປ້ອງກັນໂຂ້ຫວັດໃຫຍ່ສາຍພັນ H1N1 2009

ຢາວັກຊີນມີໃຫ້ທ່ານເພື່ອປ້ອງກັນໂຂ້ຫວັດໃຫຍ່ສາຍພັນ H1N1 2009.

- ຢາວັກຊີນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຜະລິດຂຶ້ນຄືກັນກັບວັກຊີນໂຂ້ຫວັດໃຫຍ່ຕາມລະດູການ.
- ຢາວັກຊີນເຫຼົ່ານີ້ຄາດວ່າມີຄວາມປອດພ້ອມແລະມີປະສິດທິພາບຄືກັບຢາວັກຊີນໂຂ້ຫວັດໃຫຍ່ຕາມລະດູການ.
- ມັນຈະບໍ່ປ້ອງກັນການເຈັບເປັນທີ່ມີອາການ "ຄ້າຍຄືໂຂ້ຫວັດໃຫຍ່" ຊຶ່ງມີສາເຫດມາຈາກໂວຣັສອື່ນໆ.
- ມັນຈະບໍ່ປ້ອງກັນໂຂ້ຫວັດໃຫຍ່ຕາມລະດູການ. **ທ່ານຄວນຮັບການສັກຢາວັກຊີນໂຂ້ຫວັດໃຫຍ່ຕາມລະດູການອີກດ້ວຍ, ຖ້າຫາກ ທ່ານຕ້ອງການປ້ອງກັນໂຂ້ຫວັດໃຫຍ່ຕາມລະດູການ.**

ວັກຊີນຊະນິດເຊື້ອຕາຍ (ວັກຊີນຊິ່ງຂ້າເຊື້ອໂວຣັສໃນວັກຊີນແລ້ວ) ຈະຖືກສັກເຂົ້າທາງກ້າມຊີ້ນ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ ວັກຊີນ ປ້ອງກັນໂຂ້ຫວັດໃຫຍ່ປະຈຳປີ. **ເອກະສານນີ້ອະທິບາຍກ່ຽວກັບວັກຊີນຊະນິດເຊື້ອຕາຍ.**

ວັກຊີນຊະນິດເຊື້ອເປັນ, ຊຶ່ງສິດພິ່ນເຂົ້າທາງດັງ (ວັກຊີນສິດພິ່ນເຂົ້າທາງດັງ) ຍັງມີໄວ້ໃຫ້ທ່ານໃຊ້. ຊຶ່ງຈະອະທິບາຍໄວ້ໃນເອກະສານ ອື່ນຕ່າງຫາກ.

ວັກຊີນສາຍພັນ H1N1 2009 ຊະນິດເຊື້ອຕາຍ ບາງອັນປະກອບດ້ວຍສານກັ້ນບູດຊິ່ງເອີ້ນວ່າ ສານທີ່ເມີໂຮໂຊນ (thimerosal) ເພື່ອປ້ອງກັນ ເຊື້ອພະຍາດ. ບາງຄົນໄດ້ແນະນຳວ່າ ສານທີ່ເມີໂຮໂຊນ ອາດກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຣກ ບັນຍາອ່ອນ (autism). ໃນປີ 2004 ກຸ່ມຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ສະຖາບັນການແພດໄດ້ທົບທວນເບິ່ງຜົນການສຶກສາຫຼາຍອັນເພື່ອສຶກສາເບິ່ງສະເພາະທີ່ດສະດີກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້, ແລະພົບວ່າ ບໍ່ມີການ ກ່ຽວພັນກັນຫຍັງລະຫວ່າງສານທີ່ເມີໂຮໂຊນ ແລະ ໂຣກ ບັນຍາອ່ອນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນຍັງມີການສຶກສາເພີ່ມເຕີມ ຊຶ່ງກໍໄດ້ມີການສະຫຼຸບຜົນແບບດຽວກັນນີ້.

4 ໃຜຄວນຮັບການສັກຢາວັກຊີນປ້ອງກັນໂຂ້ຫວັດໃຫຍ່ສາຍພັນ H1N1 2009 ແລະເມື່ອໃດ?

ໃຜ

ກຸ່ມຄົນທີ່ແນະນຳໃຫ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນສາຍພັນ H1N1 2009 ກ່ອນໝູ່ແມ່ນ:

- ຜູ້ຍິງຖືພາ
- ຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ກັບ ຫຼື ດູແລ ເດັກທາຣົກທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 6 ເດືອນ
- ເຈົ້າໜ້າທີ່ດູແລສຸຂະພາບ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການແພດສຸກເສີນ
- ຜູ້ໃດກໍໄດ້ທີ່ມີອາຍຸຕັ້ງແຕ່ 6 ເດືອນ ຮອດ 24 ປີ
- ຜູ້ໃດກໍໄດ້ທີ່ມີອາຍຸແຕ່ 25 ປີ ຮອດ 64 ປີ ຊຶ່ງເປັນຜູ້ມີບັນຫາທາງການດ້ານສຸຂະພາບແບບຊຳເຮື້ອ ຫຼື ມີລະບົບພູມຕ້ານທານຮ່າງກາຍອອນແອ

ເມື່ອໃດທາງການວັກຊີນໃຫ້ໃຊ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ກຸ່ມເຫຼົ່ານີ້ຄວນໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນອີກດ້ວຍ:

- ຜູ້ທີ່ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງທີ່ມີອາຍຸ 25 ຮອດ 64 ປີ
- ຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ມີອາຍຸ 65 ປີຂຶ້ນໄປ

ຮັບການກຳລັງຈັດຫາຢາວັກຊີນນີ້ເພື່ອແຈກຢາຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ. ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຕາມກົດໝາຍຮັບຮູ້ ຫຼື ນາຍຈ້າງ ອາດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະເພາະບາງຄົນໄປຮັບການສັກຢາວັກຊີນ.

ເມື່ອໃດ

ໄປຮັບການສັກຢາວັກຊີນທັນທີທີ່ມີວັກຊີນໃຫ້ສັກ.

ເດັກນ້ອຍທີ່ອາຍຸຈົນຮອດ 9 ປີ ຄວນສັກຢາວັກຊີນສອງຄັ້ງ, ໂດຍຫ່າງກັນປະມານໜຶ່ງເດືອນ. ເດັກທີ່ສູງອາຍຸກວ່າ ແລະຜູ້ໃຫຍ່ຕ້ອງການສັກຢາວັກຊີນ ພຽງຄັ້ງດຽວເທົ່ານັ້ນ.

5 ບາງຄົນບໍ່ຄວນຮັບການສັກຢາວັກຊີນ ຫຼື ຄວນລໍຖ້າ

ທ່ານບໍ່ຄວນສັກຢາວັກຊີນປ້ອງກັນໂຂ້ຫວັດໃຫຍ່ສາຍພັນ H1N1 2009 ຖ້າຫາກ ທ່ານມີ **ອາການແພ້ຮຸນແຮງ** (ເຖິງຂັ້ນເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ ຊີວິດ) ຕໍ່ ໂຂ້, ຫຼື ຕໍ່ສາມອິນຊີທີ່ຢູ່ໃນວັກຊີນ. ຈົ່ງບອກບຸກຄົນທີ່ສັກຢາວັກຊີນໃຫ້ທ່ານ ຖ້າຫາກ ທ່ານມີອາການແພ້ຮຸນແຮງໃດໆ.

- ນອກຈາກນີ້ ຈົ່ງບອກເພິ່ນເຂັ້ມດຽວກັນ ຖ້າຫາກ ທ່ານເຄີຍມີ:
- ອາການແພ້ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍເຖິງຊີວິດ ຫຼັງຈາກ ສັກຢາວັກຊີນປ້ອງກັນໂຂ້ຫວັດໃຫຍ່ຕາມລະດູການໄປໜຶ່ງຊຸດແລ້ວ,
 - ໂຮກ Guillain-Barré Syndrome (ການເຈັບເປັນກ່ຽວກັບອຳມະພາດທີ່ຮຸນແຮງ ຊຶ່ງເອີ້ນວ່າ GBS).

ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ອາດບໍ່ແມ່ນເຫດຜົນໃນການຫຼີກເວັ້ນການສັກຢາວັກຊີນ, ແຕ່ວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ດ້ານການແພດກໍສາມາດຊ່ວຍທ່ານຕັດສິນໃຈໄດ້.

ຖ້າຫາກ ທ່ານເຈັບເປັນຂັ້ນປານກາງ ຫຼື ຮຸນແຮງ, ທ່ານອາດໄດ້ຮັບຄຳແນະນຳວ່າ ໃຫ້ລໍຖ້າ ຈົນກວ່າທ່ານຈະຫາຍປ່ວຍ ກ່ອນ ທີ່ຈະຮັບການສັກຢາວັກຊີນ. ຖ້າຫາກ ທ່ານເປັນຫວັດເລັກນ້ອຍ ຫຼື ເຈັບເປັນແນວອື່ນ, ທ່ານຈະຕາຍແລ້ວ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງລໍຖ້າ.

ຜູ້ຍິງຖືພາ ຫຼື ຜູ້ຍິງທີ່ລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມຕົນເອງ ສາມາດຮັບການສັກຢາວັກຊີນສາຍພັນ H1N1 2009 ຊະນິດເຊື້ອຕາຍໄດ້.

ວັກຊີນສາຍພັນ H1N1 2009 ຊະນິດເຊື້ອຕາຍ ສາມາດສັກໄດ້ພ້ອມດຽວກັນກັບການສັກ ວັກຊີນອື່ນໆ, ລວມທັງ ວັກຊີນປ້ອງກັນ ໂຂ້ຫວັດໃຫຍ່ຕາມລະດູການ.

6 ແມ່ນຫຍັງຄືຄວາມສ່ຽງຈາກການສັກຢາວັກຊີນ ປ້ອງກັນໂຂ້ຫວັດໃຫຍ່ສາຍພັນ H1N1 2009?

ຢາວັກຊີນນີ້ ຄືກັບຢາຊະນິດອື່ນໆ, ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາຮ້າຍແຮງໄດ້, ເຊັ່ນ ເຮັດໃຫ້ມີອາການແພ້ຢາງຮຸນແຮງ. ແຕ່ຄວາມສ່ຽງຈາກວັກຊີນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດ ອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງນັ້ນ, ຫຼື ເຮັດໃຫ້ເສັຽຊີວິດນັ້ນ, ແມ່ນມີໜ້ອຍຫຼາຍ.

ໂວຣັສໃນຢາວັກຊີນສາຍພັນ H1N1 2009 ຊະນິດເຊື້ອຕາຍແມ່ນຖືກຂ້າຕາຍແລ້ວ, ສະນັ້ນ ທ່ານບໍ່ສາມາດເປັນໂຂ້ຫວັດໃຫຍ່ ໄດ້ເນື່ອງຈາກການສັກຢາວັກຊີນນີ້.

ຄວາມສ່ຽງຕ່າງ ຈາກວັກຊີນສາຍພັນ H1N1 2009 ຊະນິດເຊື້ອຕາຍ ແມ່ນຄ້າຍຄືກັບ ວັກຊີນປ້ອງກັນໂຂ້ຫວັດຕາມລະດູການ ຊະນິດເຊື້ອຕາຍ:

- ບັນຫາເລັກນ້ອຍຕ່າງໆ:**
- ເຈັບ, ເປັນຜິ່ນແດງ, ຊ້າ, ຫຼື ບວມ ໃນບໍລິເວນທີ່ສັກຢາວັກຊີນ
 - ເປັນລົມ (ສ່ວນຫຼາຍໄວໜຸ່ມ)
 - ປວດຫົວ, ປວດເນື້ອຍກ້າມຊີ້ນ • ເປັນໂຂ້ • ປວດຮາກ
- ຖ້າຫາກ ບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ເກີດຂຶ້ນ, ທ່ານຈະຕາຍແລ້ວ ມັກຈະເລີ່ມເປັນທັນທີຫຼັງຈາກສັກຢາ ແລະເປັນປະມານ 1-2 ມື້.

- ບັນຫາຮ້າຍແຮງ:**
- ອາການແພ້ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍເຖິງຊີວິດຊຶ່ງເກີດຈາກການໃຊ້ວັກຊີນ ແມ່ນມີໜ້ອຍຫຼາຍ. ຖ້າຫາກວ່າ ເກີດຂຶ້ນ, ທ່ານຈະຕາຍແລ້ວໃນສອງສາມມາດ ຈົນເຖິງສອງສາມຊົ່ວໂມງ ຫຼັງຈາກສັກຢາວັກຊີນນີ້ແລ້ວ.
 - ໃນປີ 1976, ຢາວັກຊີນໂຂ້ຫວັດໝູ່ຊະນິດເຊື້ອຕາຍທີ່ມີກ່ອນໜ້ານີ້ ແມ່ນມີຄວາມກ່ຽວພັນກັບກໍລະນີຂອງໂຮກ Guillain-Barré Syndrome (GBS). ນັບແຕ່ນັ້ນມາ, ວັກຊີນໂຂ້ຫວັດໃຫຍ່ກໍບໍ່ມີຄວາມກ່ຽວພັນຢ່າງຈະແຈ້ງຕໍ່ກັບໂຮກ GBS.

7 ຈະເຮັດແນວໃດ ຖ້າຫາກ ມີອາການແພ້ຮຸນແຮງ?

ຂ້າພະເຈົ້າຄວນຜັງເບິ່ງອາການໃດ?
ອາການຜິດປົກກະຕິໃດໆ, ເຊັ່ນ ເປັນໂຂ້ຂັ້ນສູງ ຫຼື ຄວາມປະພຶດປ່ຽນແປງ. ອາການແພ້ຮຸນແຮງສາມາດລວມມີ ຫາຍໃຈຍາກ, ສຽງແທບ ຫຼື ຫາຍໃຈຫວິດ, ອາການໂຮກລົມພິດ, ໜ້າຊືດ, ອ່ອນເຜັຽ, ຫົວໃຈເຕັ້ນໄວ ຫຼື ອື່ນໆ.

- ຂ້າພະເຈົ້າຄວນເຮັດຫຍັງແດ່?**
- ໂທຮຫາທ່ານໝໍ, ຫຼື ໄປພາຄົນເຈັບໄປຫາໝໍທັນທີ.
 - ຈົ່ງບອກທ່ານໝໍວ່າເກີດຫຍັງຂຶ້ນ, ເກີດຂຶ້ນວັນທີແລະເວລາໃດ, ແລະ ເມື່ອໃດທີ່ໄດ້ສັກຢາວັກຊີນ.
 - ຂໍໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຂອງທ່ານລາຍງານອາການແພ້ ໂດຍການຂຽນໃສ່ ໃນແບບຟອມລະບົບລາຍງານອາການທີ່ບໍ່ດີ ຫຼື ການເກີດຜິດຂ້າງຄຽງຈາກການໃຊ້ຢາວັກຊີນ (Vaccine Adverse Event Reporting System, VAERS). ຫຼື ທ່ານສາມາດຍິນລາຍງານນີ້ຜ່ານເວັບໄຊ VAERS ທີ່ www.vaers.hhs.gov, ຫຼື ໂທຫາເບີ **1-800-822-7967**.

VAERS ບໍ່ສະໜອງຄຳແນະນຳທາງການແພດ.

8 ການຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍການບາດເຈັບໃນການສັກຢາວັກຊີນນີ້

ຖ້າຫາກ ທ່ານ ຫຼື ລູກຂອງທ່ານມີອາການແພ້ຕໍ່ຢາວັກຊີນ, ທ່ານສາມາດຟ້ອງຮອງໂຕ້ຟ້າຍໃຕ້ກົດໝາຍ ຢ່າງຈຳກັດ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໂຄງການຂອງຮັບຮຽນກ່ຽວກັບໂຖກສ້າງຂຶ້ນມາເພື່ອຊ່ວຍຈ່າຍຄ່າປິ່ນປົວ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສະເພາະອື່ນໆ ຂອງບາງກຸ່ມຄົນທີ່ມີອາການແພ້ຮຸນແຮງຕໍ່ຢາວັກຊີນນີ້. ສຳຫຼັບຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບໂຄງການນີ້, ຈົ່ງໂທໂປ **1-888-275-4772** ຫຼື ໄປທີ່ເວັບໄຊຂອງໂຄງການທີ່: www.hrsa.gov/countermeasurescomp/default.htm.

9 ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດຮຽນຮູ້ຕື່ມໄດ້ແນວໃດ?

- ຖາມຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຂອງທ່ານ. ເຂົາເຈົ້າສາມາດໃຫ້ໃບຊຸດຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວັກຊີນ ຫຼື ແນະນຳແຫຼ່ງຂໍ້ມູນອື່ນໆໃຫ້ທ່ານໄດ້.
- ໂທຮຫາ ພະແນກສຸຂະພາບປະຈຳທ້ອງຖິ່ນ ຫຼື ຣັຖ.
- ຕິດຕໍ່ສູນຄວບຄຸມແລະປ້ອງກັນໂຮກ (Centers for Disease Control and Prevention, CDC):
 - ໂທຮ **1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO)** ຫຼື
 - ເຂົ້າເບິ່ງໃນເວັບໄຊຂອງ CDC ທີ່ www.cdc.gov/h1n1flu ຫຼື www.cdc.gov/flu
- ເຂົ້າເບິ່ງໃນເວັບໄຊ www.flu.gov

