

ຢາວັກຊີນກັນໂຮກເປັຍຫລ່ອຍ

ສິ່ງ ທີ່ ທ່ານ ຕ້ອງ ຮູ້

1 ໂຮກເປັຍຫລ່ອຍ Polio ແຜ່ນຫຍັງ ?

ໂຮກເປັຍຫລ່ອຍເກີດຈາກເຊື້ອວາຍຣາສ໌. ມັນເຂົ້າໄປຫາຮ່າງກາຍຂອງ ເດັກ (ຫຼື ຜູ້ໃຫຍ່) ໂດຍຜ່ານທາງປາກ. ບາງຄັ້ງມັນກໍ່ຈະປ່ຽນໄປເກີດ ເຈັບປ່ວຍທີ່ອັນຕາຍໂດຍໝັ້ນໝາຫຍັງ. ແຕ່ບາງຄັ້ງມັນອາດທຳໃຫ້ ເກີດເປັນເປັຍຫລ່ອຍ (ບໍ່ສາມາດທີ່ໜຶ່ງຕິງແຂນຫຼືຂາ). ໂຮກນີ້ສາມາດ ທຳໃຫ້ຜູ້ປ່ວຍຕາຍ ສ່ວນຫຼາຍຍ້ອນວ່າມັນເຮັດໃຫ້ລະບົບກຳມເນື້ອທີ່ເປັນປະໂຫຍດໃນສ່ວນຫາຍໃຈໝົດແຮງຫລ່ອຍລົງ.

ໂຮກເປັຍຫລ່ອຍເຄີຍເປັນໂຮກຊະນິດໜຶ່ງທີ່ແຜ່ຊຳເຮື້ອຢູ່ໃນສຫາຣັຖ. ມັນທຳໃຫ້ຄົນເປັນເປັຍຫລ່ອຍແລະສັຍຊີວິດເປັນຈຳນວນຫຼາຍພັນຄົນຕໍ່ ກ່ອນທີ່ຄົນເຮົາຈະຜລິດຢາວັກຊີນມາຊ່ວຍປ້ອງກັນໂຮກນີ້.

2 ເປັນຫຍັງຈຶ່ງໃຊ້ຢາວັກຊີນປ້ອງກັນໂຮກນີ້

ຢາວັກຊີນຕ້ານໂຮກເປັຍຫລ່ອຍ Inactivated Polio Vaccine (IPV)
ສາມາດປ້ອງກັນຄົນ ເຮົາໄປໃຫ້ຕິດໂຮກນີ້ໄດ້.

ປະຫວັດ: ໃນປີ 1916 ຫາພາຍດເປັຍຫລ່ອຍຮະບາດຢູ່ ສຫາຣັຖ ອາເມຣິກາ ໄດ້ດັບຊີວິດຄົນ 6,000 ແລະຄົນປ່ອຍໃຫ້ເປັນເປັຍຫຼງຍກວ່າ 27,000 ຄົນ. ໃນຕອນຕົ້ນປີ 1950 ມີຄົນຫຼາຍກວ່າ 20,000 ລາຍ ເປັນເປັຍຫລ່ອຍນີ້. **ຢາວັກຊີນກັນໂຮກເປັຍຫລ່ອຍນີ້ເລີ່ມໃຊ້ໃນປີ 1955.** ໃນປີ 1960 ເຫັນວ່າຈຳນວນຜູ້ທີ່ເປັນໂຮກເປັຍຫລ່ອຍນີ້ລຸດ ລົງຮະຫວ່າງ 3,000 ແລະໃນປີ 1979 ມີພຽງ 10 ລາເທົ່ານັ້ນ. ຜົນສຳເລັດຂອງການໃຊ້ຢາວັກຊີນກັນໂຮກເປັຍຫລ່ອຍ ໃນສຫາຣັຖ ໂດຍກາຍເປັນຮາກເຫງົ້າຂອງຄວາມຕັ້ງໃຈພຍາຍາມທີ່ຈະກຳຈັດພາຍດນີ້ໃຫ້ໝົດໄປໃນໂລກ.

ໃນປະຈຸບັນນີ້: ໃນສຫາຣັຖນີ້ 20 ກວ່າປີຜ່ານມາແລ້ວ ບໍ່ເຫັນມີ ປະກົດການເຮື່ອງໂຮກເປັຍຫລ່ອຍລະບາດ. ແຕ່ວ່າໂຮກນີ້ກໍຍັງຄົງມີຢູ່ ແລະລະບາດສເມີມາຢູ່ໃນບາງປະເທດ. ຄົນປ່ວຍທີ່ເປັນໂຮກນີ້ພຽງຜູ້ຮວງວາກທີ່ອິ່ນກໍສາມາດລະບາດພາຍດນີ້ຄືນໄດ້ອີກ. ຖ້າເຮົາຫາກບໍ່ໃຊ້ຢາວັກຊີນປ້ອງກັນໄວ້. ຖ້າວ່າຄວາມພຍາຍາມທີ່ຈະ ກຳຈັດພາຍດນີ້ຈາກໂລກເຮົາຫາກໄດ້ຜົນສຳເລັດ, ວັນນັ້ນພວກເຮົາ ຈະບໍ່ເປັນຫວ່າງທີ່ຈະໃຊ້ຢາວັກຊີນປ້ອງກັນອີກຕໍ່ໄປ. ກວ່າຈະເຖິງວັນນັ້ນ ພວກເຮົາກໍຍັງຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ໃຫ້ລູກຂອງເຮົາໃຊ້ຢາວັກຊີນປ້ອງກັນໄວ້.

3 ໃຜຄວນຈະໄດ້ສັກຢາວັກຊີນກັນໂຮກເປັຍຫລ່ອຍນີ້

ຢາວັກຊີນ ໂອຟີວີ (IPV) ເປັນຢາສັກ, ອາດຈະສັກໃສ່ທີ່ແຂນຫຼືຂາ, ຂຶ້ນກັບອາຍຸ. ຢາວັກຊີນກັນໂຮກເປັຍຫລ່ອຍນີ້ອາດຈະເອົາໃຫ້ພ້ອມກັນ ກັບຢາວັກຊີນກັນໂຮກຊະນິດອື່ນກໍໄດ້.

- ເດັກນ້ອຍ:**
ຄົນສ່ວຍໃຫຍ່ຄວນຈະໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນ ກັນໂຮກເປັຍຫລ່ອຍ ເມື່ອຕອນ ຍັງເປັນເດັກ. ເດັກນ້ອຍຄວນໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນນີ້ໃຫ້ຄົບ 4 ຊຸດດັ່ງຕໍ່ ໄປນີ້:
- ✓ ຊຸດນຶ່ງ ຕອນອາຍຸໄດ້ 2 ເດືອນ
 - ✓ ຊຸດນຶ່ງ ຕອນອາຍຸໄດ້ 6-18 ເດືອນ
 - ✓ ຊຸດນຶ່ງ ຕອນອາຍຸໄດ້ 4 ເດືອນ
 - ✓ ຊຸດນຶ່ງ ເສີມຟລັງ ຕອນອາຍຸໄດ້ 4-6 ປີ

ຜູ້ໃຫຍ່
ຜູ້ໃຫຍ່ບໍ່ຈຳເປັນໃຊ້ຢາວັກຊີນປ້ອງກັນໂຮກເປັຍຫລ່ອຍເພາະພວກເພິ່ນກໍໄດ້ຮັບມາແລ້ວໃນຄາວຍັງເປັນເດັກ. ແຕ່ຜູ້ໃຫຍ່ຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ຖືວ່າເຂົ້າຢູ່ໃນເຂດກັນດານ ເພາະມີບັນຫາທາງສຸຂະພາບ ຄວນຈະສັກຢາວັນ ນີ້ກັນໄວ້ຄື:

- (1) ຜູ້ທີ່ເດີນທາງເຂົ້າໄປໃນເຂດບໍ່ຮິເວນທີ່ໂຮກເປັຍຫລ່ອຍລະບາດຢູ່ສເມີມາ
- (2) ພັນກຸງານແພດປະຈຳ ໃນຫ້ອງຫົດລອງກຸກກ້າວ້າກັບເຊື້ອໂຮກເປັຍ ຫລ່ອຍ ແລະ
- (3) ພັນກຸງານແພດຜູ້ທີ່ເປັນປົວຄົນໃຂ້ທີ່ອາດກຳລັງເປັນ ໂຮກເປັຍຫລ່ອຍຢູ່.

ຜູ້ໃຫຍ່ໃນສາມຈຳພວກທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ຜູ້ທີ່ບໍ່ທັນໄດ້ສັກຢາວັກຊີນປ້ອງກັນໂຮກເປັຍຫລ່ອຍນີ້ຈຳເທື່ອຄວນໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນ ກັນໂຮກເປັຍຫລ່ອຍ ໃຫ້ຄົບ 3 ຊຸດ:

- ✓ ຊຸດທຳອິດນັ້ນ ຈະໄດ້ເມື່ອໃດກໍໄດ້
- ✓ ຊຸດທີສອງນັ້ນ ໃຫ້ຮັບ 1-2 ເດືອນ ຫຼັງຈາກຮັບຂະນານທຳອິດ
- ✓ ຊຸດທີສາມນັ້ນໃຫ້ຮັບ 6-12 ເດືອນ ຫຼັງຈາກຮັບຂະນານທີສອງ

ຜູ້ໃຫຍ່ສາມຈຳພວກກ່າວຂ້າງເທິງນີ້ທີ່ໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນກັນໂຮກ ເປັຍຫລ່ອຍນີ້ມາແລ້ວພຽງເທື່ອ 1-2 ຊຸດ ຄວນຮັບອີກຕື່ມ ໃຫ້ຄົບຕາມຈຳນວນທີ່ກຳນົດໄວ້ 1 ຫຼື 2 ຊຸດ. ບໍ່ຕ້ອງເປັນຫວ່າງ ວ່າຕັ້ງແຕ່ດຽວນີ້ກັບຄືນຫາຊຸດທຳອິດນັ້ນ ນເວລາຈະລວ່ງເລີຍມາຄົນແລ້ວເທົ່າໃດກໍຕາມ.

ຜູ້ໃຫຍ່ສາມຈຳພວກກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນ **ເຖິງ 3 ຊຸດ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າ.** (ຊະນິດ IPV ຫຼື ຊະນິດ OPV ຢອດເຂົ້າທາງປາກ)

ອາດຕ້ອງໄດ້ຮັບອີກນຶ່ງຊຸດໃຫຍ່ສຸດທ້າຍ ຊະນິດສັກ (IPV).

ຈຶ່ງສອບຖາມນຳທ່ານໝື່ຍຂອງທ່ານ ເພື່ອລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມ.

ຢາວັກຊີນ ໂອຟີວີ ຊະນິດຢອດທາງປາກ : ບໍ່ໄດ້ແຜ່ນຳໃຫ້ໄຊ້ໄປອີກແລ້ວ

ຢາວັກຊີນກັນໂຮກເປັຍຫລ່ອຍຊະນິດຢອດທາງປາກ ເພິ່ນບໍ່ຫວຽນໃຫ້ໄຊ້ຮັກອີກແລ້ວ, ຢາວັກຊີນກັນໂຮກ ເປັຍຫລ່ອຍນີ້ ສອງຊະນິດດ້ວຍກັນຄື: ຢາໂອຟີວີ **IPV** ຊຶ່ງແຜ່ນຢາສັກທີ່ເພິ່ນໄດ້ສັກໂດຍສະຫງວນໃຫ້ຢູ່ສຫາຣັຖໃນປະຈຸບັນນີ້ ແລະຢາວັກຊີນກັນໂຮກເປັຍຫລ່ອຍ ຊະນິດ **ໂອຟີວີ (OPV)** ຊຶ່ງແຜ່ນຊະນິດຢອດທາງປາກແລະຊຶ່ງຕິງແຂນຫຼືຂາເປັນຢູ່.

ຈົນກະທັ້ງປະຈຸບັນນີ້, ຢາໂອຟີວີ (OPV) ໄດ້ຖືກຫວຽນ ສຳຮັບໃຊ້ບໍ່ເດັກ ໃນສຫາຣັຖ. ຢາໂອຟີວີ (OPV) ນີ້ໄດ້ກຳຈັດໂຮກເປັຍ ຫລ່ອຍນີ້ ຈາກພາຍເມືອງເຮົາໃຫ້ໝົດໄປ ແລະເພິ່ນຍັງໃຊ້ຢານີ້ຢູ່ໃນຫຼາຍປະເທດໃນໂລກ.

ຢາວັກຊີນທັງສອງນີ້ມີຄຸນນະພາບປຸກປັ້ນຮ່າງກາຍໃຫ້ມີພູມຕ້ານກັບໂຮກເປັຍຫລ່ອຍໄດ້, ແຕ່ວ່າຢາໂອຟີວີ (OPV) ນີ້ມັນ ເກີດວ່າ ເພາະວ່າ ມັນສັກສາຍໃຫ້ພາຍດນີ້ລາມຕິດຜູ້ອື່ນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສຳຮັບຄົນຈຳນວນໜຶ່ງ (ປະມານ ໜຶ່ງໃນ 2.4 ລ້ານຄົນ ຢາໂອຟີວີ (OPV) ອາດທຳໃຫ້ເປັນເປັຍໄດ້. ແຕ່ມີນ້ອຍສຸດໃນປະຈຸບັນນີ້, ຜູ້ຊຽວຊານແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າຢາວັກຊີນກັນໂຮກເປັຍຫລ່ອຍຊະນິດຢອດ ເຂົ້າທາງປາກແຜ່ນນັບວ່າປອດພ້ອມສຸດ, ເພິ່ນຈະໃຊ້ຢາຊະນິດໃນກໍລະນີເພິ່ນເຫັນວ່າ. **ຢາວັກຊີນກັນໂຮກເປັຍຫລ່ອຍຊະນິດສັກໂອຟີວີ (IPV)** ຄືພວກເຮົາໃຊ້ກັນໃນປະຈຸບັນນີ້ຈະບໍ່ມາໃຫ້ເປັນເປັຍຫລ່ອຍ. ຖ້າຫາກທ່ານຫຼືລູກຂອງທ່ານຈະໃຊ້ຢາວັກຊີນກັນໂຮກເປັຍຫລ່ອຍຊະນິດຢອດນີ້ ຈຶ່ງອ່ານບົດຄວາມສບັບເພິ່ນຕື່ມວ່າດ້ວຍ ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ຢາວັກຊີນໂອຟີວີ (OPV) (Supplemental Vaccine Information Statements).

4 ຜູ້ທີ່ມີບັນຫາທາງດ້ານສຸຂະພາບທີ່ບໍ່ສາມາດຈະຮັບຢາ ວັກຊີນກັນ ໂຮກເບີຍຫລ່ອຍນີ້ ຫຼື ຄວນເລື່ອນເວລາ ລໍຖ້າໄປກ່ອນ.

ຄົນຈຳນວນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ບໍ່ຄວນຈະຮັບຢາວັກຊີນກັນ ໂຮກເບີຍຫລ່ອຍຊະນິດສັກ (IPV):

- ບຸກຄົນໃດທີ່ຮ່າງກາຍແພ້ຢາຕ້ານເຊື້ອ, ປະເພດຢາມີໂອນັ້ນຊິນ, ຢາສເດັບໄດມັຍຊິນ, ຫຼື ຢາ ໄປລີໂອເລຊິນ ຍີ, ບໍ່ຕ້ອງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ສັກຢາບ້ອງກັນໂຮກເບີຍຫລ່ອຍ.
- ຜູ້ໃດທີ່ເກີດມີອາການແພ້ຢາວັກຊີນຊະນິດຢອດເຂົ້າທາງປາກ ທີ່ຜ່ານມາ. ບໍ່ຕ້ອງໃຫ້ເພິ່ນໃຊ້ອີກ.

ຄົນຈຳນວນນີ້ຄວນຈະເລື່ອນເວລາລໍຖ້າໄປກ່ອນ:

- ຜູ້ໃດທີ່ປ່ວຍໂຂ້ໝັກຫຼືປານກາງກົງກັນກັບນິ້ນັດໝາຍໄປສັກຢາ ກັນໂຮກນີ້ ຄວນຈະລໍຖ້າໄປກ່ອນຈົນຫາຍເປັນປົກກະຕິດີ ແລ້ວຈຶ່ງຈະກັບມາຮັບຢາວັກຊີນນີ້. ຜູ້ໃດທີ່ບໍ່ສາຍເລັກນ້ອຍ ເຊັ່ນເປັນຫວັດນັ້ນ ອາດຈະໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນນີ້ໄດ້.

ຈົ່ງປຶກສານຳທ່ານໝໍຂອງທ່ານ ຖ້າຢາກຮູ້ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

5 ພ້ອມອັນຕະຣາຍທີ່ເນື່ອງມາຈາກການໃຊ້ຢາວັກ ຊີນນີ້ມີຫຍັງແດ່ ?

ບາງຄົນທີ່ສັກຢາວັກຊີນມາແລ້ວຈະຮູ້ສຶກເຈັບເລັກນ້ອຍຢູ່ທີ່ບ່ອນເຂັ້ມ ສັກ. ຢາວັກຊີນທ ັ້ໃຊ້ສັກຢູ່ໃນທຸກວັນນີ້ກໍບໍ່ເຄີຍສ້າງຄວາມເດືອດຮ້ອນ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃດແລະ ຄົນສ່ວນຫຼາຍສັກໄປແລ້ວກໍບໍ່ພົບບັນຫາໃດໆທັງສິ້ນ ຍ້ອນຢານີ້.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຢາວັກຊີນ ກໍເໝືອນກັບຢາອື່ນໆ, ອາດສາມາດສ້າງ ບັນຫາເດືອດຮ້ອນຕ່າງໆແກ່ສຸຂະພາບໄດ້. ເຊັ່ນການແພ້ຢາຢ່າງໝັກ. ການຖືກເຄາະຮ້າຍເສັຍສຸຂະພາບຍ້ອນຜິດຂອງຢາຫຼືເຖິງຂັ້ນຕາຍຍ້ອນ ເນື່ອງຈາກສັກຢາວັກຊີນນີ້ມີເປົ້າເຊັ່ນນ້ອຍທີ່ສຸດ.

6 ປະຕິກິຣິຍາທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນມີຫຍັງແດ່ ?

ຂ້າພະເຈົ້າຈະຊອມເບິ່ງຫຍັງແດ່ທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ?

ຈົ່ງຊອມເບິ່ງອາການທີ່ຜິດປົກກະຕິເກີດຂຶ້ນ, ເຊັ່ນອາການແພ້ທີ່ ຮ້າຍແຮງ, ໃຂ້ຂັ້ນສູງ, ການປະພຶດຕົນຜິດສັງເກດ.

ຖ້າຫາກມີອາການແພ້ຕ່າງໆເກີດຂຶ້ນ, ມັນຈະປາກົດຂຶ້ນຜ່ານໃນສອງ ສາມນາທີ ຫາສອງສາມຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກສັກຢາແລ້ວ. ອາການຕ່າງໆ ເຫຼົ່ານັ້ນມີຄື ຫາຍໃຈຜິດ, ຮູ້ສຶກອ່ອນເພີຍ, ຄໍແຫຍ ຫຼື ຫາຍໃຈ ຫອບແຫດ, ຫົວໃຈເຕັ້ນໄວ, ເປັນວິນ, ຜັງຄໍໃຄໍ, ອອກຕຸ່ມນິ້ນ ມ່ານຫຼືຮ່າງກາຍເປັນສີມ້ານເຂົ້າ.

ຂ້າພະເຈົ້າຄວນຈະເຮັດຫຍັງແດ່ ?

- ໂທຮສັບຫາທ່ານໝໍ ຂອງທ່ານ ຫຼື ນຳເອົາຄົນນັ້ນໄປຫາທ່ານໝໍ ທັນທີ.

- ບອກເລື່ອງທີ່ເກີດຂຶ້ນສູ່ທ່ານໝໍຝັງ. ວັນເວລາ ທີ່ເກີດເຫດ, ວັນເວລາທີ່ສັກຢາເຂົ້າ.
- ຈົ່ງຖາມທ່ານໝໍຂອງທ່ານ, ນາງພຍາບານ, ກະຊວງ ສາທາຣະນະສຸກ ໃຫ້ຮູ້ວິທີຂຽນຟອມຮາຍງານເລື່ອງເຫດເກີດຂຶ້ນ ຍ້ອນຢາວັກຊີນ [Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS)] ຫຼື ໂທຮສັບຟຣີໄປຫາເພິ່ນດ້ວຍທ່ານເອງທີ່ **1-800-822-7967**.

ການຮາຍງານເລື່ອງປະຕິກິຣິຍາທີ່ເກີດຂຶ້ນຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຊ່ຽວຊານໄດ້ ຊອກຮູ້ບັນຫາຕ່າງໆກ່ຽວກັບຢານັ້ນ.

7 ໂຄງການແຫ່ງຊາດເພື່ອທົດແທນຄ່າເສັຍຫາຍໃຫ້ ແກ່ຜູ້ທີ່ ໄດ້ ຮັບເຄາະ ເນື່ອງຈາກການຢາວັກຊີນກັນໂຮກ.

ໃນກໍລະນີທີ່ທ່ານຫຼືລູກຂອງທ່ານໄດ້ຮັບພ້ອມອັນຕະຣາຍທີ່ເກີດຈາກການ ໃສ່ຢາວັກຊີນ ທາງຮັຖບານໄດ້ຈັດຕັ້ງໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອໄວ້ແລ້ວ ເພື່ອຈ່າຍຄ່າປິ່ນປົວ ໃຫ້ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍ.

ສຳຮັບຮາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບໂຄງການແຫ່ງຊາດເພື່ອທົດແທນ ຄ່າເສັຍຫາຍໃຫ້ຜູ້ເຄາະເນື່ອງຈາກການໃສ່ຢາວັກຊີນ {National Vaccine Injury Compensation Program} ໂທຮຫາ **1-800-338-2382** ຫຼື ຈະຕິດຕໍ່ເຂົ້າໄປເບິ່ງທາງ ອິນເທີເນັດ <http://www.hrsa.gov/bhpr/vicp>

8 ເຮັດວິທີໃດຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ເພີ່ມກ່ຽວກັບເລື່ອງ ໂຮກນີ້?

- ສອບຖາມເລື່ອງນຳທ່ານໝໍຫຼືນາງພຍາບານ. ເພິ່ນຈະເອົາເອກກະ ສານເລື່ອງການ ໃຊ້ຢາວັກຊີນເມື່ອໃຫ້ທ່ານໄປອ່ານຫຼື ຈະແນະນຳ ທ່ານໄປຊອກຄົນຫາ ເອົາຢູ່ທີ່ສູນເພິ່ນແຜ່ຂ່າວຂໍ້ມູນອື່ນໆ.
- ໂທຮສັບໄປຖາມຜແນກສາທາຣະນະສຸກທ້ອງຖິ່ນຫຼືກະຊວງ ສາທາຣະນະສຸກ ຂອງຮັຖບານ ກ່ຽວກັບການໃຊ້ຢາວັກຊີນ.
- ຕິດຕໍ່ສູນກາງຄວບຄຸມແລະປ້ອງກັນພຍາດ (CDC).
- Call **1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO)**
- ຈະເບິ່ງໃນ ອິນເທີເນັດ <http://www.cdc.gov/nip>



U.S. DEPARTMENT OF HEALTH & HUMAN SERVICES
Centers for Disease Control and Prevention
National Immunization Program

Vaccine Information Statement
Polio (1/1/2000) 42 U.S.C. § 300aa-26