

ຢາປ້ອງກັນໂຮກເປັຍຫລ່ອຍຊະນິດຢອດເຂົ້າທາງປາກ

ສິ່ງ ທີ່ ທ່ານ ຕ້ອງ ຮູ້

1 ໂຮກເປັຍຫລ່ອຍ Polio ແມ່ນຫຍັງ ?

ໂຮກເປັຍຫລ່ອຍເກີດຈາກເຊື້ອວາຍຣາສ໌. ມັນເຂົ້າໄປຫາຮ່າງກາຍຂອງ ເດັກ (ຫຼື ຜູ້ໃຫຍ່) ໂດຍຜ່ານທາງປາກ. ບາງຄັ້ງມັນກໍ່ຈະປ່ຽນໄປເກີດ ເຈັບປ່ວຍທີ່ອັນຕະລາຍໃດທີ່ໜັກໜາຫຍັງ. ແຕ່ບາງຄັ້ງມັນອາດທ້າໃຫ້ ເກີດເປັນເປັຍຫລ່ອຍ (ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະໝົງຕົງແຂນຫຼືຂາ). ໂຮກນີ້ສາມາດທ້າໃຫ້ຜູ້ປ່ວຍຕາຍ ເພາະວ່າມັນເຮັດໃຫ້ລະບົບກ້າມເນື້ອທີ່ເປັນປະໂຫຍດໃນສ່ວນຫາຍໃຈໝົດແຮງແລະຫລ່ອຍລົງ.

ໂຮກເປັຍຫລ່ອຍເຄີຍເປັນໂຮກຊະນິດນຶ່ງທີ່ແຜ່ຊຳເຮື້ອຢູ່ໃນສຫາຣັຖ. ມັນທ້າໃຫ້ຄົນເປັນເປັຍຫລ່ອຍແລະເສຍຊີວິດເປັນຈຳນວນຫຼາຍພັນຄົນຕໍ່ ປີ ກ່ອນທີ່ຄົນເຮົາຈະພົບວ່າຢາວັກຊີນເຜື່ອມາໃຊ້ປ້ອງກັນຕ້ານກັບໂຮກນີ້.

2 ເປັນຫຍັງຈຶ່ງໃຊ້ຢາວັກຊີນປ້ອງກັນໂຮກເປັຍຫລ່ອຍນີ້

ຢາວັກຊີນຕ້ານໂຮກເປັຍຫລ່ອຍ Polio Vaccine ຈະປ້ອງກັນຄົນເຮົາຈາກການຕິດໂຮກນີ້.

ປະຫວັດ: ໃນປີ 1916 ຫ່າງພາຍດເປັຍຫລ່ອຍຮະບາດຢູ່ ສຫາຣັຖ ອາເມຣິກາ ໄດ້ດັບຊີວິດຄົນ 6,000 ແລະຄົນປ່ວຍໃຫ້ເກີດເປັນເປັຍ ຫຼງຍກວ່າ 27,000 ຄົນ. ໃນຕອນຕົ້ນປີ 1950 ມີຄົນຫຼາຍກວ່າ 20,000 ລາຍເປັນເປັຍຫລ່ອຍນີ້. ຢາວັກຊີນກັນໂຮກເປັຍຫລ່ອຍເລີ່ມໃຊ້ໃນປີ 1955. ໃນປີ 1960 ເຫັນວ່າຈຳນວນຄົນທີ່ເປັນໂຮກເປັຍຫລ່ອຍນີ້ລຸດລົງຮະຫວ່າງ 3,000 ແລະໃນປີ 1979 ມີພຽງ 10 ລາຍ ເທົ່ານັ້ນ. ຜົນສຳເຣັດຂອງການໃຊ້ຢາວັກຊີນກັນໂຮກເປັຍຫລ່ອຍ ໃນສຫາຣັຖ ໄດ້ກາຍເປັນຮາກເຫງົ້າຂອງຄວາມຕັ້ງໃຈພາຍາມທີ່ຈະກຳ ຈັດພາຍດນີ້ໃນທົ່ວໂລກໃຫ້ໝົດໄປ.

ໃນປະຈຸບັນ: 20 ກວ່າປີຜ່ານມາແລ້ວໃນສຫາຣັຖ ບໍ່ເຫັນມີປະກົດການເຮືອງໂຮກເປັຍຫລ່ອຍຮະບາດ. ແຕ່ວ່າໂຮກນີ້ກໍຍັງຄົງມີຢູ່ແລະລະບາດສເມີມາຢູ່ໃນບາງປະເທດ. ຄົນປ່ວຍທີ່ເປັນໂຮກນີ້ພຽງຜູ້ດຽວຈາກທີ່ອື່ນກໍອາດສາມາດແຜ່ລະບາດພາຍດນີ້ຄືນໄດ້ອີກ. ຖ້າເຮົາບໍ່ໃຊ້ຢາວັກຊີນ ປ້ອງກັນໄວ້. ຖ້າວ່າຄວາມພາຍາມກຳ ຈັດພາຍດນີ້ຈາກໂລກເຮົາໄດ້ ຜົນສຳເຣັດ, ວັນນັ້ນພວກເຮົາຈະບໍ່ເປັນຫວ່າງການໃຊ້ຢາວັກ ຊີນ ປ້ອງກັນ. ກວ່າຈະເຖິງວັນນັ້ນພວກເຮົາກໍຍັງຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ໃຫ້ລູກ ຂອງພວກເຮົາໃຊ້ຢາວັກຊີນເພື່ອປ້ອງກັນໄວ້ກ່ອນ.

3 ຢາວັກຊີນກັນໂຮກເປັຍຫລ່ອຍມີຢູ່ສອງຊະນິດ

ຢາວັກຊີນກັນໂຮກເປັຍຫລ່ອຍມີສອງຊະນິດດັວຍັກຄີ:

ຢາ ໂອຟີວີ [(IPV) (Inactivated Polio Vaccine)]: ຢາວັກຊີນ ປຸງຈາກເຊື້ອໄພລີໂອ ແລ້ວ: ເປັນຊະນິດທີ່ໄຊ້ສັກ

ໂອຟີວີ: (IPV) ແມ່ນຢາວັກຊີນ ທີ່ສຫງວນໃຫ້ໃຊ້ປ້ອງກັນ ໂຮກເປັຍ ຫລ່ອຍໃຫ້ເກືອບໝົດທຸກຄົນທີ່ຢູ່ໃນສຫາຣັຖ.

ໂອຟີວີ (OPV) ແມ່ນຢາວັກຊີນຕ້ານເຊື້ອໄພລີໂອ ຊະນິດຢອດເຂົ້າ ທາງປາກ): ເປັນຢາຢອດ, ຢອດເຂົ້າທາງປາກ. ຈົນເຖິງລະຍະນີ້, ຢາໄພລີໂອນີ້

ແມ່ນເຜີ້ນສຫງວນສຳຣັບໃຊ້ກັບເດັກໃນສຫາຣັຖ. ຕໍ່ມາເພິ່ນກໍບໍ່ໄດ້ແນະນຳ ໃຫ້ໃຊ້ອີກອີກເລີຍ ນອກຈາກວ່າ ໃນກໍຣະນີ ພິເສດ. ຢາວັກຊີນໂອຟີວີ ໄດ້ກຳຈັດໂຮກເປັຍຫລ່ອຍນີ້ ໄດ້ຜົນດີທີ່ສຸດ ໃນສຫາຣັຖ ແລະເພິ່ນຍັງໃຊ້ຢານີ້ຢູ່ໃນອີກຫຼາຍປະເທດ.

ຢາວັກຊີນທັງສອງຊະນິດນີ້ມີຄຸນະພາບເພື່ອສ້າງຮ່າງກາຍໃຫ້ມີພູມຕ້ານ ທານຕໍ່ເຊື້ອພາຍດ ເປັຍຫລ່ອຍ, ແຕ່ວ່າຢາໂອຟີວີ (OPV) ມີແນວດີລິ່ນ ເພາະວ່າມັນມີຄວາມພິເສດຄືສາມາດ ກຳຈັດແລະຄວບຄຸມເຊື້ອໂຮກ ບໍ່ໃຫ້ລະບາດແຜ່ໄປໃສ່ຜູ້ອື່ນໄດ້.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສຳຣັບຄົນຈຳນວນນຶ່ງ (ປະມານ ນຶ່ງໃນ 2.4 ລ້ານ ຄົນ ທີ່ເປັນເປັຍຫລ່ອຍນັ້ນກໍເນື່ອງມາຈາກຕິດເຊື້ອຢາ. ໂອກາດສ່ຽງທີ່ ຈະຕິດໂຮກຈາກເຊື້ອຢານັ້ນມີນ້ອຍທີ່ສຸດ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານແຈ້ງວ່າໃຊ້ຢາ ວັກຊີນກັນໂຮກເປັຍຫລ່ອຍຊະນິດຢອດເຂົ້າທາງປາກນັ້ນຈະມີໂອກາດ ນ້ອຍທີ່ສຸດທີ່ຈະເກີດເປັນເປັຍຫລ່ອຍຍ້ອນເຊື້ອຢາເອງ. ຢາວັກຊີນກັນໂຮກເປັຍຫລ່ອຍຊະນິດສັກໂອຟີວີ (IPV) ທີ່ໃຊ້ກັນໃນປະຈຸບັນນີ້ ຈະບໍ່ ທ້າ ໃຫ້ເປັນເປັຍຫລ່ອຍ.

4 ໃຜຄວນຈະໃຊ້ຢາວັກຊີນ ໂອຟີວີ ກັນໂຮກເປັຍຫລ່ອຍຊະນິດ ຢອດເຂົ້າ ທາງປາກ ?

ຢາກັນໂຮກຊະນິດທີ່ຢອດເຂົ້າທາງປາກ OPV ເພິ່ນເຊົາໃຫ້ໃຊ້ກັນ ແລ້ວໃນສະຫະຣັຖ ເພິ່ນສົມຄວນໃຫ້ໃຊ້ໃນບາງສະພາບການເທົ່ານັ້ນຄື:

- (1) ຂບວນເຜີຍແຜ່ຊັກຊວນປວງຊີນໃຫ້ປຸກຄວາມທົນທານໃຫ້ຮ່າງກາຍຕົນເພື່ອຮະຽັບໂຮກເປັຍຫລ່ອຍທີ່ພວນຮະບາດ.
- (2) ເດັກຜູ້ບໍ່ເຄີຍສັກຢາກັນໂຮກເປັຍຫລ່ອຍມາກ່ອນແລະ ຈະເດີນ ທາງໃນ 4 ອາທິດ ໄປປະເທດບ່ອນທີ່ໂຮກເປັຍຫລ່ອຍຮະບາດຢູ່. ເດັກເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນໂອຟີວີ OPV ເປັນຂນານທຳອິດ.
- (3) ເດັກທີ່ມີແມ່ບໍ່ເຫັນດີໃຫ້ສັກຄືບຕາມຈຳນວນທີ່ຍິ່ງບອກໄວ້. ເດັກເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນ ໂອຟີວີ ຊະນິດສຳຣັບ ສອງຊຸດ ໃນບັນດັ້ນຂອງຊຸດສັກຢາປ້ອງກັນ ກ່ອນທີ່ຈະໃຊ້ຢາປ້ອງກັນຊະນິດ ຢອດເຂົ້າທາງປາກ ເປັນຊຸດທີ່ສາມຫຼືສີ່ ຫຼືທັງສອງຊຸດ.
- (4) ບຸກຄົນໃດທີ່ເປັນໂຮກແພ່ຢາຕ່າງໆທີ່ຮ້າຍແຮງເຊັ່ນແພ່ຢາຕ້ານ ເຊື້ອ, ຢານີໂອມັຍຊີນ, ຢາສເຕັບໂຕມັຍຊີນ, ຫຼືຢາໂປລີໂອໄມຊີນ ບິ, ຫຼືບຸກຄົນໃດທີ່ແພ່ຢາສັກປ້ອງກັນໂຮກເປັຍຫລ່ອຍໂອຟີວີ ມາແລ້ວ ບຸກຄົນເຫຼົ່ານີ້ ຄວນຈະໃຊ້ຢາປ້ອງກັນໂຮກເປັຍຫລ່ອຍຊະນິດຢອດ ເຂົ້າທາງປາກໂອຟີວີ ແທນ.

ຖ້າທ່ານ ຫຼື ລູກຂອງທ່ານ ຢູ່ໃນນຶ່ງໃນສີ່ຈຳພວກທີ່ກ່າວມາຢູ່ຂ້າງເທິງ ນີ້, ຈຶ່ງຖາມທ່ານໝໍຂອງທ່ານວ່າເມື່ອໃດຄວນຈະໃຫ້ເຂົ້າກິນຫຼືສັກຢາ ປ້ອງກັນນີ້. ຈຶ່ງຖາມໃຫ້ຮູ້ລິ້ຍແຕ່ງການເປັນພາຍດເປັຍຫລ່ອຍເນື່ອງ ຈາກເຊື້ອຢາປ້ອງກັນກ່ອນທີ່ທ່ານຈະຮັບຢາວັກຊີນ ຊະນິດຢອດ ເຂົ້າທາງປາກ ໂອຟີວີ.

ຢາວັກຊີນ ປ້ອງກັນໂຮກເປັຍຫລ່ອຍແນວຢອດເຂົ້າທາງປາກ ໂອຟີວີ ເພິ່ນໃຫ້ໃຊ້ພ້ອມກັນກັບຢາວັກຊີນປ້ອງກັນໂຮກຊະນິດອື່ນກໍໄດ້.

OPV Supplement - 1/1/2000

5 ຜູ້ທີ່ມີບັນຫາທາງດ້ານສຸຂະພາບ ບໍ່ຄວນໃຊ້ຢາວັກຊີນ ໄອຟີວີຊະນິດຢອດເຂົ້າທາງປາກ ຄວນລໍຖ້າ ຫຼືເລື່ອນໄປກ່ອນ.

ຜູ້ທີ່ບໍ່ຄວນຮັບຢາວັກຊີນກັນ ໄອຟີວີຊະນິດຢອດເຂົ້າທາງປາກ:

- ຜູ້ທີ່ໃຊ້ຢາສເຕີຣອຍ ລະຍະຍາວນານ, ຫຼື ຢາອື່ນໆທີ່ສົ່ງຜົນ ສະຫວັນ ຕໍ່ລະບົບຕ້ານທານຂອງຮ່າງກາຍ
- ຜູ້ທີ່ເປັນໂຣກມະເລັງ ຫຼື ພວກກໍາລັງໃຊ້ຢາເຄມີປິດໂຣກມະເລັງ.
- ຜູ້ທີ່ເປັນໂຣກເອດສ໌ ຫຼື ຕິດເຊື້ອໂຣກເອດສ໌ (AIDS) ຫຼື ມີເຊື້ອໂຣກອິນ໌ໆ (HIV) ມີຜົນສະຫວັນ ຕໍ່ລະບົບຕ້ານທານຂອງຮ່າງກາຍ.
- ຖ້າຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງຫາກມີບັນຫາຄ້າຍຄືຂອງຄົນສາມກຸ່ມທີ່ກ່າວມາ ຂ້າງເທິງນີ້ ຈະເປັນຜູ້ກໍາກັບປ່ຽນຜ້າອ້ອມ ຫຼື ປົວຣະບັດໄດ້ຊິດ ເດັກທີ່ໄດ້ຮັບວັກຊີນກັນ ໂຣກເປັຍຫລ່ອຍ, ຢາວັກຊີນກັນໂຣກນັ້ນ ບໍ່ໃຫ້ແມ່ນຊະນິດຢອດເຂົ້າທາງປາກ ໄອຟີວີ.
- ເດັກກໍບໍ່ຄວນໄປໃຊ້ຢາວັກຊີນກັນໂຣກຊະນິດຢອດເຂົ້າທາງປາກ ຖ້າວ່າມີຜູ້ທີ່ມາຮັກສາເບິ່ງແຍງເດັກເຊັ່ນເປັນຜູ້ປ່ຽນຜ້າອ້ອມບໍ່ເຄີຍໂດຍສັກຢາກັນໂຣກເປັຍຫລ່ອຍຊະນິດໃດເລີຍ.
- ຜູ້ໃດທີ່ເກີດອາການແພ້ຢາວັກຊີນປ້ອງກັນໂຣກເປັຍຫລ່ອຍຊະນິດ ຢອດເຂົ້າທາງປາກໃນຜ່ານມາ. ບໍ່ຄວນຈະໃຫ້ໃຊ້ອີກຕໍ່ໄປ.

ຜູ້ທີ່ຄວນຈະເລື່ອນລໍຖ້າໄປກ່ອນ:

- ຜູ້ໃດທີ່ເກີດປ່ວຍໃຊ້ຊ້າກາງ ຫຼືໜັກ ຢ່າງແຮງ ໃນເວລາດຽວກັນທີ່ຈະໃຫ້ຮັບຢາກັນໂຣກນີ້ ຄວນໂຈະໂວ້ກ່ອນຈົນກະທັ້ງເຊົາເປັນ ປົກກະຕິແລ້ວ ຈຶ່ງໃຊ້ຢາວັກຊີນປ້ອງກັນໂຣກເປັຍຫລ່ອຍ ຊະນິດ ຢອດເຂົ້າທາງປາກ. ຜູ້ທີ່ເປັນໃຊ້ເລັກນ້ອຍເຊັ່ນ ເປັນໃຊ້ຫວັດ ນັ້ນ ເພິ່ນກໍຈະຢາກໃຫ້ໄດ້.

ຈຶ່ງປຶກສານຳທ່ານໝໍຂອງທ່ານ ຖ້າຢາກຮູ້ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

6 ພ້ອມຕະຣາຍເນື່ອງຈາກການໃຊ້ຢາວັກຊີນປ້ອງກັນໂຣກ ເປັຍຫລ່ອຍຊະນິດຢອດເຂົ້າທາງປາກ ໄອຟີວີມີຫຍັງແດ່ ?

ຢາວັກຊີນກັນໂຣກເປັຍຫລ່ອຍຊະນິດຢອດເຂົ້າທາງປາກນີ້ອາດສາມາດ, ທຳໃຫ້ຄົນເປັນເປັຍຫລ່ອຍໄດ້. ໃນແຕ່ລະປີມັນໄດ້ເປັນສາຍເຫດໃຫ້ຄົນເປັນເປັຍຫລ່ອຍຈຳນວນໜຶ່ງ (ປະມານ 1 ຮາຍໃນ 2.4 ລ້ານຄົນ ທີ່ໃຊ້ຢາວັກຊີນທີ່ເປັນເປັຍຫລ່ອຍ) ນັບຕັ້ງແຕ່ປີທີ່ໃຊ້ຢານີ້ມາ. ເຊື້ອຢາ ວັກຊີນກັນໂຣກເປັຍຫລ່ອຍ ຊະນິດຢອດເຂົ້າທາງປາກສາມາດກໍ່ພຍາດ ເປັຍຫລ່ອຍໃນຮ່າງກາຍຄົນໄດ້ຊຶ່ງແມ່ນຜູ້ທີ່ໄດ້ກິນຢາວັກຊີນຫຼື ໃຫ້ແກ່ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບປົວຣະບັດຜູ້ຕິດເຊື້ອເຊົ້ານີ້. ໃນປະຈຸບັນນີ້ ໂຣກເປັຍຫລ່ອຍໄດ້ ຖືກແຈ້ງການໃຫ້ຊາບຈາກການຄວບຄຸມ ຂອງນັກວິຊາການຂອງສຫາຣັຖວ່າ ການສັກຢາວັກຊີນກັນໂຣກເປັຍຫລ່ອຍຈະປ້ອງເດັກ ແລະຜູ້ໃຫຍ່ໄດ້ດີສະເມີກັນ ໂດຍປາສະຈາກການສ່ຽງພ້ອມ.

ຢາວັກຊີນກໍ່ເໝືອນກັບຢາປະເພດອື່ນໆ, ສາມາດກໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາໜັກຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ຜູ້ກ່ຽວໄດ້. ເຊັ່ນອາການແພ້ອັນກັນດານ. ໂອກາດທີ່ ຢາປ້ອງກັນໂຣກເປັຍຫລ່ອຍຊະນິດຢອດເຂົ້າທາງປາກ ທີ່ຈະບັງເກີດອັນຕະຣາຍໃຫ້ແກ່ສຸຂະພາບ, ຂັ້ນໜັກຫຼືເສຍຊີວິດ ນັ້ນແມ່ນມີເປົ້ເຊັ່ນນ້ອຍທີ່ສຸດ.

7 ປະຕິກິຣິຍາທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນມີຫຍັງແດ່ ?

ຂ້າພະເຈົ້າຈະຊອມເບິ່ງຫຍັງແດ່ທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ?
ຈຶ່ງຊອມເບິ່ງອາການທີ່ຜິດປົກກະຕິເກີດຂຶ້ນ, ເຊັ່ນອາການແພ້ທີ່ ຮ້າຍແຮງ, ໃຂ້ນສູງ, ການປະພິດຕິນຜິດສັງເກດ.

ຖ້າຫາກມີການແພ້ຕ່າງໆເກີດຂຶ້ນ, ມັນຈະປາກົດຂຶ້ນພາຍໃນສອງສາມນາທີຫາສອງສາມຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກໃຊ້ຢາແລ້ວ. ອາການຕ່າງໆ ຂອງການແພ້ກໍມີຄື ຫາຍໃຈຝືດ, ຮູ້ສຶກອ່ອນເພັຍ, ຄໍແຫບ ຫຼື ຫາຍໃຈຫອບແຫດ, ຫົວໃຈເຕັ້ນໄວ, ເປັນນິມ, ຜັງຄໍໂຄ່, ອອກຕຸ່ມມື້ນ ມ່ານຫຼືຮ່າງກາຍເປັນສີມ້ານເຂົ້າ.

ຖ້າແມ່ນວ່າອາການເປັຍຫລ່ອຍຈະເກີດຂຶ້ນນັ້ນ, ມັນຈະປາກົດຂຶ້ນພາຍ ໃນນຶ່ງອາທິດ ຫາ ນຶ່ງເດືອນຫຼັງຈາກການໃສ່ຢາ ວັກຊີນກັນໂຣກນີ້.

- ອາການຕ່າງໆນັ້ນອາດຈະລວມມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້
- ເຈັບກ້າມເນື້ອແຮງແລະປັນກ້ອນຊື່ນ
 - ອ່ອນເພັຍ
 - ເຄື່ອນຍ້າຍຂາຫຼືແຂນບໍ່ໄດ້

ຂ້າພະເຈົ້າຄວນຈະເຮັດຫຍັງແດ່ ?

- ໂທຣສັບຫາທ່ານໝໍ ຂອງທ່ານ ຫຼື ນຳເອົາຄົນນັ້ນໄປຫາທ່ານໝໍ ທັນທີ.
- ບອກເຮື່ອງທີ່ເກີດຂຶ້ນສູ່ທ່ານໝໍຜັງ. ວັນເວລາ ທີ່ເກີດເຫດ, ວັນເວລາທີ່ສັກຢາເຂົ້າ.
- ຈຶ່ງຖາມທ່ານໝໍຂອງທ່ານ, ນາງພຍາບານ, ກະຊວງ ສາທາຣະນະສຸກໃຫ້ຮູ້ວິທີການບັນທຶກໄວ້ໃນຟອມແລະການ ຮາຍງານເຮື່ອງເຫດເກີດຂຶ້ນຍ້ອນຢາວັກຊີນເຊົ້ານີ້ [Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS)] ຫຼື ໂທຣສັບຟຣີໂປຫາເພິ່ນດ້ວຍທ່ານເອງທີ່ **1-800-822-7967**.

ການຮາຍງານເຮື່ອງປະຕິກິຣິຍາທີ່ເກີດຂຶ້ນຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຊ່ຽວຊານໄດ້ຊອກຮູ້ບັນຫາຕ່າງໆກ່ຽວກັບຢານັ້ນ.


8 ໂຄງການແຕ່ງຊາດເພື່ອທິດແທນຄ່າເສັຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ ໄດ້ ຮັບເຄາະເນື່ອງຈາກການຢາວັກຊີນກັນໂຣກ.

ໃນກໍລະນີທີ່ທ່ານຫຼືລູກຂອງທ່ານໄດ້ຮັບຜົນຕະຣາຍທີ່ເກີດຈາກການ ໃສ່ຢາວັກຊີນ ທາງຮັຖບານໄດ້ຈັດຕັ້ງໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອໄວ້ແລ້ວ ເພື່ອຈ່າຍຄ່າປິ່ນປົວໃຫ້ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍ.

ສຳຮັບຮາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບໂຄງການແຕ່ງຊາດເພື່ອທິດແທນຄ່າເສັຍຫາຍໃຫ້ແກ່ເຄາະເນື່ອງຈາກການໃສ່ຢາວັກຊີນ {National Vaccine Injury Compensation Program} ໂທຣຫາ **1-800-338-2382** ຫຼື ຈະຕິດຕໍ່ເຂົ້າໄປເບິ່ງທາງ ອິນເທີເນັດ <http://www.hrsa.gov/bhpr/vicp>

9 ເຮັດວິທີໃດຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ເພິ່ນກ່ຽວກັບເຮື່ອງໂຣກນີ້?

- ສອບຖາມເຮື່ອງນຳທ່ານໝໍຫຼືນາງພຍາບານ. ເພິ່ນຈະເອົາເອກກະ ສານເຮື່ອງການໃຊ້ຢາວັກຊີນເມື່ອໃຫ້ທ່ານໄປອ່ານຫຼື ຈະເນະນຳ ທ່ານໄປຊອກຄົ້ນຫາເອົາຢູ່ທີ່ສູນເພິ່ນແຜ່ຂ່າວຂໍ້ມູນອື່ນໆ.
- ໂທຣສັບໄປຖາມຜແນກສາທາຣະນະສຸກທ້ອງຖິ່ນຫຼືກະຊວງ ສາທາຣະນະສຸກຂອງຣັຖທ່ານ ກ່ຽວກັບການໃຊ້ຢາວັກຊີນ.
- ຕິດຕໍ່ສູນກາງຄວບຄຸມແລະປ້ອງກັນພຍາດ (CDC).
- ໂທຣ **1-800-232-2522** (ພາສາອັງກິດ)
- ຈະເບິ່ງໃນ ອິນເທີເນັດ <http://www.cdc.gov/nip>



Vaccine Information Statement
Polio - OPV Supplement (1/1/2000) 42 U.S.C. § 300aa-26