

2009 H1N1

इन्फ्लुएन्जाको भ्याक्सिन (खोप)

निष्क्रिय पारिएको
("फ्लुको सुई")

तपाइले के थाहा पाउनु पर्दछ

भ्याक्सिन (खोप) को जानकारी सम्बन्धी धेरै विवरणहरू स्यानिस् एवं अन्य भाषाहरूमा उपलब्ध छन् । हेर्नुहोस् www.immunize.org/vis ।

1 2009 H1N1 इन्फ्लुएन्जा भनेको के हो ?

नयाँ किसिमको इन्फ्लुएन्जा भाइरसको कारणबाट 2009 H1N1 (कहिलेकाही स्वाइन फ्लु भनिन्छ) हुन जान्छ । यो धेरै देशहरूमा फैलिसकेको छ ।

अन्य फ्लुका भाइरसहरू जस्तै, यो 2009 H1N1 भाइरस पनि एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा खोक्दा, हाँछिउ गर्दा, र कहिलेकाही भाइरसबाट प्रदुषित भएको वस्तु छुदा सर्दछ ।

2009 H1N1 को लक्षणहरूमा पर्दछन् :

- थकाई लाग्ने
- ज्वरो आउने
- घाटी दुख्ने
- माशंपेसी दुख्ने
- जाडो लाग्ने
- खोक लाग्ने
- हाँछिउ गर्ने

केही मानिसहरूलाई झाडापखाला र वान्ता पनि हुन्छ ।

धेरै जसो मानिसहरू एक हप्ता भित्रै ठीक हुन्छन् । तर अरु केही मानिसहरूलाई निमोनिया वा अरु गम्भीर खालका रोगहरू लाग्दछ । केही मानिसहरूलाई अस्पताल भर्ना गर्नु पर्ने हुन्छ, र केही मानिसहरूको मृत्यु हुन सक्छ ।

2 सबै लाग्ने (मौसमी) फ्लु भन्दा 2009 H1N1 फ्लुमा के फरक छ ?

मौसमी फ्लुका भाइरसहरू वर्षेपिच्छे परिवर्तन हुन्छन् तर तिनको एक आपसमा नजीकको सम्बन्ध हुन्छ ।

पहिले फ्लुबाट संक्रमित भैसकेको मानिसहरूमा अक्सर गरेर मौसमी फ्लुका भाइरसहरू विरुद्धको प्रतिरक्षात्मक (इम्युनिटी) क्षमता केही मात्रामा हुन्छ (उनीहरूको शरीरले भाइरस संग लड्ने क्षमता बनाएको हुन्छ) ।

2009 H1N1 भाइरस भनेको नयाँ किसिमको भाइरस हो । मौसमी फ्लुका भाइरसहरू भन्दा यो निकै फरक खालको छ ।

अधिकांश मानिसहरूमा 2009 H1N1 फ्लुको विरुद्धको प्रतिरक्षात्मक (इम्युनिटी) क्षमता कम हुन्छ अथवा हुँदैन (उनीहरूका शरीरहरू भाइरस संग लड्का लागि तयार भएका हुँदैनन्) ।

3 2009 H1N1 इन्फ्लुएन्जाको भ्याक्सिन (खोप)

2009 H1N1 इन्फ्लुएन्जा हुनबाट रोक्नका लागि भ्याक्सिनहरू उपलब्ध छन् ।

- यी भ्याक्सिनहरू मौसमी फ्लुका भ्याक्सिनहरू जस्तै बनाइएको हुन्छन् ।
- यिनीहरू मौसमी फ्लुका भ्याक्सिनहरू जस्तै सुरक्षित एवं प्रभावकारी हुन्छन् भन्ने अपेक्षा गरिन्छ ।
- यिनीहरूले अरु भाइरसको कारणबाट लाग्ने "इन्फ्लुएन्जा-जस्तै" खाले रोगलाई लाग्नबाट रोक्ने छैनन् ।
- यिनीहरूले मौसमी फ्लु लाग्नबाट रोक्ने छैनन् । यदि तपाइ मौसमी फ्लु लाग्नबाट बच्न चाहनु हुन्छ भने तपाइले मौसमी इन्फ्लुएन्जाको भ्याक्सिन (खोप) पनि लगाउनु पर्दछ ।

निष्क्रिय पारिएको भ्याक्सिन (भ्याक्सिन जुनमा मारिएको भाइरस हुन्छ) लाई फ्लुका लागि वार्षिक लिइने सुईलाई भै गरी माशपेशीमा सुई (इन्जेक्सन) लगाएर दिइन्छ । यस कागजमा निष्क्रिय पारिएको भ्याक्सिनका वारेमा वर्णन गरिएको छ ।

नाक भित्र हालेर लिने जीवन्त भ्याक्सिन (नाक भित्र स्प्रे गर्ने) पनि उपलब्ध छ । यसका वारे मा छुट्टै कागजमा वर्णन गरिएको छ ।

2009 H1N1 का निष्क्रिय पारिएका केही भ्याक्सिनमा यसलाई किटाणुहरुबाट मुक्त बनाउनका लागि थिमिरोसल नामक प्रिजरभेटिभ (सड्ने गनाउने कुरालाई रोक्ने) तत्व रहे को हुन्छ । थिमिरोसल अटिजम सँग सम्बन्धित छ भनेर पनि कसैकसैले सल्लाह दिएका छन् । 2004 मा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (इन्स्टिच्यूट अफ मेडिसिन) का विज्ञहरूको एक समूहले यस सिद्धान्त प्रति गौर गरेर धेरै किसिमका उपलब्ध अध्ययनहरू माथि समीक्षा गरे र थिमिरोसल र अटिजमका बीच कुनै नाता नरहेको कुरा पत्ता लगाए । त्यस पछि भएका थप अध्ययनहरू पनि सोही निचोडमा पुगे ।

4 2009 H1N1 इन्फ्लुएन्जा कसले र कहिले लगाउनु पर्दछ ?

कसले

H1N1 को भ्याक्सिन पहिले लिनका लागि सिफारिश गरिएका समूहहरूमा पर्दछ :

- गर्भवती महिला
- 6 महिना भन्दा मुनिका उमेरका बच्चाहरू संग बस्ने वा तिनको हेरचाह गर्ने मानिसहरू
- स्वास्थ्योपचार गर्ने र आकस्मिक औषधोपचार गर्ने काममा संलग्न कर्मचारीहरू
- 6 महिना देखि 24 वर्ष उमेरका जो कोही व्यक्ति
- 25 वर्ष देखि 64 वर्ष उमेरका खास किसिमको दीर्घ रोगले ग्रसित स्वास्थ्य स्थिति भएका वा प्रीतरक्षकतमक प्रणाली कमजोर भएका जो कोही व्यक्ति

अरु धेरै भ्याक्सिनहरू उपलब्ध हुँदै गए पछि, निम्न समूहका व्यक्तिहरूलाई भ्याक्सिन (खोप) लगाउनु पर्दछ :

- 25 देखि 64 वर्ष उमेरका स्वस्थ व्यक्ति
- 65 वर्ष र सो भन्दा वढी उमेर पुगेका व्यक्ति

संघीय (फेडरल) सरकारले स्वेच्छिक आधारमा प्राप्त गर्न खोज्नेहरूलाई यो भ्याक्सिन उपलब्ध गराइरहेको छ । तथापि, राज्यको कानूनले गरेको प्रावधान अनुसार वा रोजगार दाताहरूले राखेको प्रावधान अनुसार केही खास व्यक्तिहरूले भ्याक्सिन लगाउनु पर्ने आवश्यक हुन सक्छ ।

कहिले

भ्याक्सिन उपलब्ध हुना साथ लगाइ हाल्नुहोस् ।

9 वर्षको उमेर सम्मका केटाकेटीहरूले एक महिनाको फरक पारेर दुइ मात्रा भ्याक्सिन (खोप) लगाउनु पर्दछ । त्यो भन्दा वढी उमेरका केटाकेटीहरू र वयस्कहरूले एक मात्रा मात्र लगाउनु पर्दछ ।

2009 H1N1 Inactivated influenza vaccine- Nepali 10/2/09

5

केही मानिसहरूले भ्याक्सिन (खोप) लगाउनु हुँदैन वा लगाउनका लागि तिनीहरूले पर्खनु पर्दछ

यदि तपाइलाई षण्डाको थपवा भ्याक्सिनमा भएका अरु तत्वहरूको एलर्जी अति नै (ज्यान लिने सम्म त्रास भएको) छ भने तपाइले 2009 H1N1 फ्लुको भ्याक्सिन लगाउनु हुँदैन । यदि तपाइलाई कुनै कुराको अति धेरै एलर्जी छ भने सो कुराको बारेमा तपाइलाई भ्याक्सिन लगाई दिने व्यक्तिलाई बताउनुहोस ।

यदि तपाइलाई कहिल्यै यस्तो भएको छ भने सो कुरा पनि बताउनुहोस :

- मौसमी फ्लुको भ्याक्सिनको मात्रा लिए पछि ज्यान लिने सम्मको त्रास हुने गरी त्यसबाट भएको प्रतिक्रिया,
 - गुइलियन बार्रेको (Guillain-Barré) लक्षणको स्वरूप (सिन्ड्रोम) (पक्षघातबाट हुने कडा विमारी जस्लाई GBS पनि भन्दछन्) ।
- भ्याक्सिन लिनबाट तर्किनका लागि यी नै कारण नहुन पनि सक्दछन् तर निर्णय लिनका लागि तपाइलाई स्वास्थ्यकर्मीहरूले सहयोग गर्न सक्दछन् ।

यदि तपाइ मध्यम खालले थपवा कडा खालले विरामी पर्नु भएको छ भने, भ्याक्सिन लगाउनु भन्दा पहिले तपाइ निको भै नतडगिए सम्म उक्त भ्याक्सिन लगाउनका लागि पर्खनका लागि तपाइले सल्लाह प्राप्त गर्न पनि सक्नुहुने छ । यदि तपाइलाई मन्द खालको रुघा वा अरु रोगहरू लागेको छ भने साधारणतया तपाइले पर्खी राख्नु पर्दैन ।

गर्भवती र वच्चालाई दुध खुवाउने महिलाले 2009 H1N1 को निस्क्रीय वनाइएको भ्याक्सिन लगाउन सक्दछन् ।

मौसमी इन्फ्लुएन्जाको भ्याक्सिन लगायत अरु भ्याक्सिन लगाएको वेलैमा 2009 H1N1 को निस्क्रीय वनाइएको भ्याक्सिन सगै लगाई दिन सकिन्छ ।

6

2009 H1N1 इन्फ्लुएन्जाको भ्याक्सिनका जोखिमहरू के के हुन् ?

अरु कुनै औषधिले जस्तै गरी भ्याक्सिनले पनि गम्भीर समस्या उत्पन्न गर्न सक्दछ, जस्तो गम्भीर खालले एलर्जी हुने गरी प्रतिक्रिया हुने । तर डरलाग्दो किसिमले नोक्सानी पुऱ्याउने थपवा मृत्युको कारण बन्ने गरी कुनै पनि भ्याक्सिनबाट हुने जोखिम नगन्य मात्रामा हुन्छ ।

2009 H1N1 को निस्क्रीय वनाइएको भ्याक्सिनविरुद्धमा भाइरसलाई मारिएको छ । त्यसै ले यो भ्याक्सिनबाट तपाइलाई इन्फ्लुएन्जा हुन सक्दैन ।

2009 H1N1 को निस्क्रीय वनाइएको भ्याक्सिनबाट हुने जोखिमहरू मौसमी फ्लुको निस्क्रीय वनाइएको भ्याक्सिनका जोखिमहरू जस्तै हुन्छन् :

मन्द खालका समस्याहरू :

- जहाँ सुइ लगाएको छ त्यहाँ दुख्ने, रातो हुने, नरम हुने थपवा सुनिने
- वेहोस हुने (खास गरी किशोर किशोरीहरू)
- टाउको दुख्ने, मांसपेशी (जीउ) दुख्ने • ज्वरो आउने • बाकवाकी लाग्ने

यदि समस्याहरू देखा पर्यो भने, यि सुइ लगाउने बितिककै देखिन्छ तथा 1-2 दिन सम्म रहन्छ ।

कडा खालका समस्याहरू :

- ज्यान नै लिने गरी त्रसित पार्ने खालले एलर्जीबाट प्रतिक्रियाहरू मुस्किलले नै हुन्छन् । यदि प्रतिक्रियाहरू भै हालेमा पनि, अक्सर गरी भ्याक्सिन लगाए पछि केही मिनेट भित्र देखि केही घण्टा सम्म यस्ता प्रतिक्रियाहरू देखिन्छन् ।
- 1976 मा निस्क्रीय पारिएको प्रारंभिक किसिमको स्वाइन फ्लु गुइल्लेन बार्रे सिन्ड्रोम (GBS) का केसहरू संग मिसिएको पाइएको थियो । त्यस वेला देखि, फ्लु भ्याक्सिनहरू GBS संग स्पष्ट रूपमा सम्बन्ध जोडिएका छैनन् ।

7

यदि निकै नै प्रतिक्रिया भएमा ?

मैले के चाई हेर्नु पर्दछ ?

कुनै किसिमको असामान्य अवस्था जस्तो उच्चज्वरो वा व्यवहारमा परिवर्तनहरू । एलर्जीवाटै हुने कडा प्रतिक्रियाका लक्षणहरूमा सास फेर्ने गांरो हुने, स्वर धोदो हुने थपवा घ्यारघ्यार हुने, घिसाउने खालको रातो डावर आउने, पहेलो हुने, कमजोर हुने, मुटुको धडकन छिटोछिटो चल्ने वा रिंगटा लाग्ने कुरा पर्दछन् ।

मैले के गर्नु पर्दछ ?

- चिकित्सकलाई फोन गर्नु होस थपवा उक्त व्यक्तिलाई तुरुन्तै चिकित्सक कहाँ लगनुहोस
- के भयो, कुन दिन र कुन समयमा भयो तथा कहिले भ्याक्सिन लगाउनु भएको हो भन्ने कुरा चिकित्सकलाई बताउनुहोस ।
- भ्याक्सिन एडभर्स इभेन्ट रिपोर्टिङ सिस्टम (Vaccine Adverse Event Reporting System, VAERS) फारम भरेर तपाइलाई भएको प्रतिक्रियाको प्रतिवेदन गरी दिनका लागि आफ्नो प्रदायकलाई तपाइ भन्नुहोस । थपवा VAERS को वेबसाइट www.vaers.hhs.gov मार्फत वा नं. 1-800-822-7967 मा फोन गरेर तपाइले प्रतिवेदन दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ ।

VAERS ले स्वास्थ्योपचार सम्बन्धी सल्लाह दिदैन ।

8

भ्याक्सिनबाट भएको हानी नोक्सानी वापतको क्षतिपूर्ति

यदि तपाइ थपवा तपाइको वच्चालाई भ्याक्सिनबाट प्रतिक्रिया भएको छ भने त्यसका लागि तपाइले मुद्दा लड्ने तपाइको ताकतलाई कानूनले सीमित गरी दिएको छ ।

तर पनि भ्याक्सिनबाट डरलाग्दो प्रतिक्रिया भोग्नु परेका खास किसिमका केही व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको स्वास्थ्य उपचार एवं अन्य खास खर्चहरू व्यहोरेर र सहयोग गरी दिनका लागि एउटा संघीय कार्यक्रमको तर्जुमा गरिएको छ । यस कार्यक्रम वारे अरु वढी जानकारी लिनका लागि नं. 1-888-275-4772 मा फोन गर्नुहोस थपवा कार्यक्रमको वेबसाइट www.hrsa.gov/countermeasurescomp/default.htm हेर्नुहोस ।

9

मैले वढी कुरा कसरी जान्न सक्छु ?

- आफ्नो प्रदायकलाई सोध्नुहोस । उनीहरूले सबै विवरण भित्र पढि हालिएको भ्याक्सिनको प्याकेज दिन सक्दछन् थपवा जानकारीका अरु श्रोतहरूका वारेमा सुभाब दिने छन् ।
- आफ्नो स्थानीय वा राज्यको स्वास्थ्य विभागलाई फोन गर्नुहोस ।
- रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्र (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) मा सम्पर्क गर्नुहोस :
 - नं. 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) मा फोन गर्नुहोस, थपवा
 - सि डि सी को वेबसाइट www.cdc.gov/h1n1flu वा www.cdc.gov/flu हेर्नुहोस
- वेबसाइट www.flu.gov हेर्नुहोस



DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES
CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION



Vaccine Information Statement

2009 H1N1 Inactivated Influenza Vaccine IMM-980NP – Nepali (10/2/09) 42 U.S.C. §300aa-26
Translated by Transcend Translations, Davis, CA www.transcend.net