

# पोलियोको खोप

## तपाईंले के थाहा पाउन आवश्यक छ

धेरै खोपका जानकारीको विवरणहरू स्यानिस् तथा अरु भाषाहरूमा उपलब्ध छन् । [www.immunize.org/vis](http://www.immunize.org/vis) हेर्नुहोस् ।

### 1 पोलियो भनेको के हो ?

पोलियो भाइरसका कारणबाट हुने एउटा रोग हो । वच्चाको (वा वयस्क व्यक्तिको) मुखबाट यो रोग निजको शरीरमा प्रवेश गर्दछ । कहिले कहिले यस्ले सिकिस्त विरामी बनाउँदैन । तर कहिले कहिले भने यस्ले पक्षघात (प्यारालाइसिस) गराउदछ (हात वा खुट्टा चल्न नसक्ने) । यो रोग लागेको व्यक्तिहरूलाई यसले मार्न पनि सक्दछ, अक्सर गरेर सास फेर्न सहयोग पुऱ्याउने मांसपेशीहरूलाई पक्षघात गराएर यसले ज्यान लिने गर्दछ ।

सम्युक्त राज्यमा पोलियो आम रूपमा हुने गर्दथियो । यस्को खोप हामीले लगाउन थाल्नु भन्दा पहिले नै वर्षमा हजारौ मानिसहरूलाई यसले पक्षघात गरायो तथा मान्यो ।

### 2 खोप किन लिने ?

निष्कृय पारिएको पोलियोको खोप (Inactivated Polio Vaccine (IPV)) ले पोलियोलाई रोक्न सक्दछ ।

**इतिहास :** 1916 मा भएको पोलियोको महामारीबाट सम्युक्त राज्यमा 6,000 मानिसको मृत्यु भयो तथा 27,000 भन्दा बढी मानिसहरूलाई पक्षघात भयो । 1950 को दशकको शुरु अवस्थामा प्रत्येक वर्ष 20,000 पोलियोका केसहरू हुने गरेका थिए । **पोलियोको खोप लगाउने काम 1955 मा शुरु भयो ।** 1960 सम्ममा पोलियो हुने को संख्या घटेर 3,000 मा पुग्यो र 1979 मा यस्को संख्या करीव 10 मात्र भेटियो । पोलियोको खोप लगाउदा प्राप्त भएको यस सफलताले गर्दा सम्युक्त राज्य र अरु देशहरूमा समेत पोलियो उन्मुलन गर्नका लागि गरिने विश्वव्यापी प्रयास द्रुत गतिमा फैलियो ।

**हाल :** 20 वर्षयता सम्युक्त राज्यमा पोलियो फैलिएको कुरा थाहा हुन आएको छैन । तर पनि संसारको कुनै भागमा यो रोग अझै आम रूपमा विद्यमान छ । अर्को देशबाट आएको एउटा मात्र पोलियोको केसले पनि, यदि हामीले खोप लगाएर आफूलाई सुरक्षित राखेनौ भने, यस रोगलाई फेरि फीर्ता ल्याउने छ । संसारबाट पोलियो रोग उन्मुलन गर्ने प्रयास सफल भएमा कुनै दिन हामीलाई पोलियो खोप नचाहिने हुन सक्दछ । त्यति बेला सम्मका लागि हामीले आफ्नो केटाकेटीहरूलाई खोप दिइ राख्नु पर्दछ ।

#### मुखबाट लिने पोलियोको खोप : अहिले यसलाई सिफारिश गरिदैन

पोलियोको खोपहरू दुई किसिमका छन् : **IPV**, यो सुइबाट लगाउने हो र यसलाई लगाउनका लागि सम्युक्त राज्यमा हाल सिफारिश गरिएको छ तथा अर्को हो जीवन्त, मुखबाट लिने खोप (**OPV**) । यो थोपामा हुन्छ र मुखमा हालेर निल्ले गरी यसलाई खुवाइन्छ ।

हालसालै सम्म पनि सम्युक्त राज्यमा अधिकांश केटाकेटीहरूलाई **OPV** खुवाउन सिफारिश गरिन्थ्यो । **OPV**ले पोलियो भएका देशहरूलाई यस रोगबाट छुटकारा दिलाउनका निम्ति हामीलाई सहयोग पुऱ्याएको छ र यो अझै पनि संसारको धेरै भागमा प्रयोगमा ल्याइदैंछ ।

दुवै खोपहरूले पोलियोबाट उन्मुक्ति दिन्छन्, तर अरु मानिसहरूमा रोग फैलनबाट रोक्नका लागि **OPV** राम्रो हुन्छ । तथापि केही मानिसहरूलाई (करीव 24 लाखमा एक जनालाई) **OPV** ले पोलियो रोग लगाउदछ । सम्युक्त राज्यमा पोलियो हुने सम्भावना अहिले अति नै कम भएकोले, सीमित परिस्थितिहरूमा बाहेक जुन तपाईंको चिकित्सकले वर्णन गर्ने छन् अरु अवस्थामा सामान्य जोखिमको कारणले गर्दा पनि मुखबाट लिने पोलियोको खोपलाई प्रयोग गर्नु अब उचित छैन भन्ने कुरामा विज्ञहरूले विश्वास गर्दछन् । पोलियोको सुइ (**IPV**) लगाउदा यसबाट पोलियो हुदैन । **यदि तपाईं वा तपाईंको बच्चाको OPV सिदै हुनुहुन्छ भने ओपिभी सप्लीमेन्टल भ्याक्सिन इन्फर्मेसन स्टेटमेन्ट ओपिभीको परिपूर्ति गर्ने खोप सम्बन्धी सूचनाको विवरण (OPV supplemental Vaccine Information Statement) को एक प्रति दिनुहोस भनी सम्बन्धित संग माग्नुहोस ।**

### 3 पोलियोको कस्ले र कहिले लिने ?

**IPV** सुइबाट लिने खोप हो, उमेर हेरी यो खुट्टा वा पाखुरामा लगाइन्छ । अरु खोपहरू दिदा जस्तै पोलियोको खोप पनि साथसाथै दिन सकिन्छ ।

#### केटाकेटीहरू

प्राय सबै मानिसहरूले केटाकेटी अवस्थामा नै पोलियोको खोप लिनु पर्दछ । केटाकेटीहरूलाई **IPV** को 4 मात्रा निम्नानुसार दिइन्छ :

- ✓ 2 महीनामा एक मात्रा
- ✓ 6 देखि 18 महीनाको बीचमा एक मात्रा
- ✓ 4 महीनामा एक मात्रा
- ✓ 4 देखि 6 वर्ष भित्रमा वुस्टर (प्रभाववर्धक) मात्रा

#### वयस्क व्यक्तिहरू

केटाकेटी अवस्थामा नै खोप लगाइ सकिने हुँदा अधिकांश वयस्क व्यक्तिहरूलाई पोलियोको खोपको आवश्यकता पर्दैन । तर पनि वयस्क व्यक्तिहरूको निम्न तीन समूह उच्च जोखिममा रहन्छन् र उनीहरूले पोलियोको खोप लिने कुरामा विचार गर्नु पर्दछ :

- (1) आम रूपमा पोलियो रहेको संसारको कुनै पनि ठाउँमा घुम्न जाने व्यक्तिहरू,
- (2) पोलियोको भाइरस सम्बन्धी काम गर्ने प्रयोगशालाका कर्मचारीहरू, तथा
- (3) पोलियो लागेका विरामीहरूको उपचार गर्ने स्वास्थ्य उपचार सेवाका कार्यकर्ताहरू ।

यी समूहमा पर्ने वयस्क व्यक्तिहरू जस्ले पहिले पोलियो विरुद्धको खोप कहिल्यै लिएका छैनन् तिनीहरूले **IPV** को 3 मात्रा निम्न वमोजिम लिनु पर्दछ :

- ✓ पहिलो मात्रा जुनसुकै बेलामा
- ✓ दोश्रो मात्रा त्यो लिएको 1 देखि 2 महीना पछि
- ✓ तेश्रो मात्रा दोश्रो मात्रा लिएको 6 देखि 12 महीना पछि

यी समूहमा पर्ने वयस्क व्यक्तिहरू जस्ले पहिले **1 वा 2 मात्रा** पोलियोको खोप लिइसकेका छन् उनीहरूले लिन बाँकी **1 वा 2 मात्रा** खोप पनि लिनु पर्दछ । पहिलेको मात्रा (हरु) जति नै अगाडि लिएको भए पनि त्यस्ले केही फरक पाँदैन ।

यी तीन समूहमा पर्ने वयस्क व्यक्तिहरू जस्ले पोलियोको खोपको **3 वा बढी मात्रा (IPV होस वा OPV)** पहिले लिइ सकेका छन् उनीहरूले पनि **IPV**को वुस्टर (प्रभाववर्धक) मात्रा लिन सक्नेछन् ।

बढी जानकारी लिनका लागि आफ्नो स्वास्थ्य उपचार प्रदायकसंग सोध्नुहोस ।

4

## केही मानिसले IPV लगाउन हुँदैन वा यो लगाउनका लागि पर्खनु पर्दछ ।

### यी मानिसहरूले IPV लगाउनु हुँदैन :

- एन्टीवायटिक औषधि नियोभाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन वा पोलिमाइक्सिन बि लिएको कारणले पहिले ज्यान कै खतरा हुने किसिमले एलर्जीको प्रतिक्रिया भएका जोकोही व्यक्तिले पनि पोलियोको सुइ लगाउनु हुँदैन ।
- एक पटक पोलियोको सुइ लगाए पछि त्यसबाट एलर्जीको प्रतिक्रिया हुन गएको जोकोही व्यक्तिले पनि पोलियोको अर्को सुइ लगाउनु हुँदैन ।

### यी मानिसहरूले पर्खनु पर्दछ :

- सुइ लगाउन भनी निश्चित गरी तोकिएको समयमा कुनै पनि व्यक्ति सामान्य प्रकारले वा गम्भीर प्रकारले विरामी भएमा पोलियोको खोप लगाउनु भन्दा अघि आफू निको नभए सम्म निजले यो लगाउन पर्खनु पर्दछ । सानोतिनो विरामी भएका व्यक्तिहरूलाई खोप लगाइ दिन **सकिन्छ** जस्तो रुघा लागेकाहरूलाई ।

बढी जानकारी लिनका लागि आफ्नो स्वास्थ्य उपचार प्रदायकसंग सोध्नुहोस ।

## 5 IPV वाट के जोखिमहरू हुन्छन् ?

केही मानिसहरूलाई IPV को सुइ लगाएको ठाउँमा दुख्ने गर्दछ । हाल लगाइने गरिएको खोपबाट गम्भीर समस्याहरू खडा गरेको कुरा कहिल्यै थाहा हुन आएको छैन र यसबाट प्रायजसो मानिसहरूलाई कुनै पनि किसिमका समस्याहरू हुँदैनन् ।

तथापि, अरु कुनै औषधिले गरे जस्तै गरी खोपले पनि एलर्जीबाट हुने कडा प्रतिक्रिया जस्तो गम्भीर समस्या खडा गर्न सक्दछ । *पोलियो सुइ लगाउदाहुने गम्भीर किसिमको नोक्सानी वा मृत्यु हुने कुराको जोखिम नगन्य मात्रै छ ।*

## 6 गम्भीर खालको प्रतिक्रिया भएमा के गर्ने ?

### मैले कुन कुराहरूको बिचार गर्नु पर्दछ ?

कुनै पनि असामान्य स्थितिलाई हेर्नुहोस जस्तो एलर्जीबाट गम्भीर खालको प्रतिक्रिया भएको, उच्च ज्वरो आएको वा असामान्य व्यवहार देखाएको ।

यदि एलर्जीले गर्दा गम्भीर रूपमा प्रतिक्रिया हुने भए सुइ लगाएको केही मिनेट वा केही घण्टा पछि यो भैसक्नु पर्दछ । एलर्जीले गर्दा हुने गम्भीर खालका प्रतिक्रियाहरूको लक्षणहरूमा यी कुरा पर्दछन् - सास फेर्न अपठेरो हुने, कमजोरी हुने, स्वर धोत्रो हुने वा ध्यानध्यान गर्ने, मुटु छिटो छिटो धड्कने, चिलाउने खालका डावरहरू निस्कने, चक्कर लाग्ने, पहेलो हुने वा घाटी सुन्निने ।

## मैले के गर्नु पर्छ ?

- चिकित्सकलाई फोन गर्ने वा विरामीलाई तुरुन्तै चिकित्सक काहाँ लिएर जाने ।
- चिकित्सकलाई के भएको, भएको समय र मिति तथा खोप लिएको समय पनि बताउने ।
- भ्याक्सिन एडभर्स इभेन्ट रिपोर्टिङ सिस्टम (Vaccine Adverse Event Reporting System, VAERS) फारम भरेर प्रतिक्रियाको जाहेरी दर्ज गरी दिनका लागि आफ्नो चिकित्सक, नर्स वा स्वास्थ्य विभागलाई **भन्नुहोस** ।

अथवा तपाईं आफै VAERSको वेबसाइट [www.vaers.hhs.gov](http://www.vaers.hhs.gov) वाट वा **1-800-822-7967** मा फोन गरेर यो रिपोर्ट गर्न सक्नु हुने छ ।

*VAERS ले स्वास्थ्य सम्बन्धी कुरामा सुझाव दिदैन ।*

उत्पन्न प्रतिक्रियाहरूको बारेमा प्रतिवेदन दिदा खोपबाट उत्पन्न हुने समस्याहरूका बारेमा विशेषज्ञहरूलाई बुझ्न सहयोग पुग्दछ ।

7

## खोपबाट हुने चोटपटकको लागि क्षतिपूर्ति गर्ने सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यक्रम

तपाईं र तपाईंको वच्चाहरू र अरु व्यक्तिलाई खोपबाट हुने प्रतिक्रियाको विरलै घटने घटना वापत यसरी क्षति पुगेको व्यक्तिलाई सहयोग गर्ने हेतुले निजको उपचारमा लागेको रकम तिर्नका लागि एउटा संघीय कार्यक्रमको तर्जुमा भएको छ ।

खोपबाट हुने चोटपटकको लागि क्षतिपूर्ति गर्ने सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यक्रम (National Vaccine Injury Compensation Program) को बारेमा विस्तृत जानकारी लिन नं. 1-800-338-2382 मा फोन गर्नुहोस वा उक्त कार्यक्रमको वेबसाइट [www.hrsa.gov/vaccinecompensation](http://www.hrsa.gov/vaccinecompensation) हेर्नुहोस

8

## मैले अन्य कुराहरू कसरी सिक्ने ?

- आफ्नो चिकित्सक वा नर्सलाई सोध्नुहोस । उनीहरूले तपाईंलाई भित्र खमिएको भ्याक्सिन सम्बन्धी प्याकेज दिन सक्नेछन् वा सूचनाको अन्य श्रोतहरूका बारेमा सुझाव दिन सक्नेछन् ।
- आफ्नो स्थानीय वा राज्यको स्वास्थ्य विभागलाई फोन गर्नुहोस ।
- रोग नियन्त्रण तथा निवारण केन्द्र (CDC) मा सर्म्पर्क गर्ने :
  - नं. **1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO)** मा फोन गर्नुहोस
  - राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम (National Immunization Program) को निम्न वेबसाइट प्रयोग हेर्नुहोस : [www.cdc.gov/vaccines](http://www.cdc.gov/vaccines)



U.S. DEPARTMENT OF HEALTH & HUMAN SERVICES  
Centers for Disease Control and Prevention

Vaccine Information Statement  
Polio Vaccine NP - Nepali (1/1/2000) 42 U.S.C. § 300aa-26  
Translated by Transcend Translations, Davis, CA [www.transcend.net](http://www.transcend.net)