

टिटानस, डिपथेरिया (Td) अथवा टिटानस, डिपथेरिया, पर्तुसिस (Tdap) खोप

तपाईंले के थाहा पाउन आवश्यक छ

धेरै खोपका जानकारीको विवरणहरू स्यानिस् तथा अरु भाषाहरूमा उपलब्ध छन् । www.immunize.org/vis हेर्नुहोस् ।

1 खोप किन लिने ?

6 वर्ष र सो भन्दा कम उमेरका केटाकेटीलाई टिटानस (धनुषटकार) डिपथेरिया (भ्यागुते रोग) तथा पर्तुसिस (लहरेखोकी) को विरुद्धको खोप नियमित रूपमा लगाइन्छ । तर हुर्केका केटाकेटीहरू, किशोरकिशोरीहरू तथा वयस्क व्यक्तिहरूलाई पनि यी रोगबाट सुरक्षित राख्नु पर्दछ । Td (टिटानस, डिपथेरिया) र Tdap (टिटानस, डिपथेरिया, पर्तुसिस) खोपहरूले यस्तो सुरक्षा प्रदान गर्दछन् ।

टिटानस (बंगारा वाधिने) वाट पीडादायक रूपमा मांशपेशी खुम्चने र अक्सर गरेर शरीर भरिने यस्तो पीडा हुने गर्दछ ।

- यसले बंगाराका मांशपेशीहरूलाई अट्याइ दिन्छ जसले गर्दा पीडीतले मुख खोल्न र निम्न सक्रिय । टिटानसले यसबाट संक्रमित भएका 5 जना मध्येमा करीब 1 जनाको ज्यान लिन्छ ।

डिपथेरियाले घाटीको पछाडि पट्टिको भागलाई बाक्लो संग ढाकि दिन्छ ।

- यसबाट सास फेर्न समस्या हुने, पक्षघात हुने, मुटु बन्द हुने र मृत्यु सम्म हुने गर्दछ ।

पर्तुसिस (लहरेखोकी) ले कडा खालको र लामो समय सम्मको खोकी लगाउदछ, वान्ता आउने र निन्द्रा विथोली दिने गर्दछ ।

- यसले तौल घटाउदछ, दिसापिसाव रोक्न नसक्ने बनाउछ, करंग भाच्चिन्छ र डरलाग्दो खालको खोकी लागेर त्यसबाट मुर्छा पनि पर्न सक्दछ । लहरेखोकी लागेका 100 जना किशोरकिशोरीहरू मध्ये 2 जना सम्म र 100 जना वयस्क व्यक्तिहरू मध्ये 5 जना सम्मलाई अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ वा उनीहरूलाई निमोनिया लगायतका जटिल समस्याहरू भएका छन् ।

यी तिनवटै रोगहरू व्याक्टेरियाले गर्दा लाग्दछन् । डिपथेरिया र पर्तुसिस एउटा व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिलाई सर्दछ । टिटानस काटेको ठाउ, खोपिएको ठाउ वा घाउहरूबाट शरीर भित्र प्रवेश गर्दछ ।

खोपहरू लगाउन शुरु गर्नु भन्दा पहिले संयुक्त राज्यमा प्रत्येक वर्ष टिटानसका केसहरू सरदर 1,300 तथा डिपथेरियाका केसहरू सरदर 175,000 हुने गर्दथे । खोपहरू उपलब्ध भए पछि टिटानस हुने केसहरू 96 प्रतिशतले र डिपथेरिया हुने केसहरू 99.9 प्रतिशतले कम भएका छन् ।

2005 भन्दा अगाडि, 7 वर्ष भन्दा कम उमेरका केटाकेटीहरूले पर्तुसिसको खोप लिन सक्दथे । 2004 मा सम्पुक्त राज्यमा 8,000 किशोरकिशोरीहरूलाई र 7,000 वयस्क व्यक्तिहरूलाई पर्तुसिस भएको थियो ।

2 Td र Tdap खोप

- Td खोपको प्रयोग धेरै वर्ष देखि हुदै आएको छ । यसले टिटानस र डिपथेरिया हुनबाट जोगाउदछ ।
- 2005 मा Tdap लाई प्रयोग गर्ने अनुमति (लाइसेन्स) दिइएको थियो । यी सबै तीनवटै रोगहरू लाग्नबाट किशोरकिशोरीहरू र वयस्क व्यक्तिहरूलाई बचाउनका लागि लगाइने खोपमा यो पहिलो हो ।

नोट : अहिले Tdap लाई जीवनभरमा एक पटक मात्र लगाउन अनुमति छ भने Td लाई हरेक 10 वर्षमा लगाइन्छ र आवश्यक परेमा यसलाई चाडो पनि लगाइन्छ ।

यी खोपहरूलाई तीन प्रकारले प्रयोग गर्न सकिन्छ : 1) केटाकेटी अवस्थामा DTaP वा DTP को खोपको लिनुपर्ने सबै मात्रा नलिएका व्यक्तिहरूलाई सोधभर्नाको रूपमा दिइने, 2) हरेक 10 वर्षमा बुस्टर डोजको रूपमा दिइने, र 3) घाउ लागे पछि त्यसबाट टिटानसको संक्रमण हुने खतराबाट जोगाउनका लागि दिइने ।

3 कुन खोप कहिले लिने ?

नियमित : 11 देखि 18 वर्षका किशोरकिशोरीहरू

- केटाकेटी अवस्थामा DTaP वा DTP लिएका र अहिले सम्म Td को बुस्टर डोज नलिएका किशोरकिशोरीहरूलाई Tdap को एक मात्रा लगाइ दिनका लागि सिफरिष गरिन्छ । यो दिनका लागि उपयुक्त हुने उमेर 11 देखि 12 वर्ष हो ।
- Td को बुस्टर डोज लिइ सकेका किशोरकिशोरीहरूले पनि पेरटुसिस लाग्नबाट जोगिनका लागि Tdap को एक मात्रा लगाउन प्रोत्साहित गरिन्छ । Td र Tdap लगाउन यी दुई बीच कम्तीमा 5 वर्षको फरक हुनुपर्ने तर्फ प्रोत्साहित गरिन्छ, तापनि त्यसो नै हुनुपर्छ भन्ने चाही छैन ।
- केटाकेटी अवस्थामा DTaP वा DTP को निर्धारित सबै मात्राहरू नलिएका किशोरकिशोरीहरूले Td र Tdap मिलाएर उक्त क्रमलाई पूरा गर्नुपर्दछ ।

नियमित : 19 वर्ष र सो भन्दा माथिको उमेरका वयस्क व्यक्तिहरू

- सबै वयस्क व्यक्तिहरूले प्रत्येक 10 वर्षमा Td को बुस्टर डोज लिनु पर्दछ । Tdap कहिल्यै नलगाएका 65 वर्ष मुनिका वयस्कहरूले अर्को बुस्टर डोजको लागि Tdap ले सट्टा गर्नु पर्दछ ।
- 12 महीना भन्दा कम उमेरको शिशु (गर्भवती हुन सक्ने महिला समेत) को निकट सम्पर्कमा आउनु पर्ने 65 वर्ष मुनिको वयस्क व्यक्तिले पनि Tdap को एक डोज लिनु पर्दछ । Td को अन्तिम मात्रा लिए पछि, कम्तीमा 2 वर्ष पर्खनका लागि सुभाव दिइन्छ, तर यसै गर्नुपर्ने आवश्यकता भने छैन ।
- अस्पतालहरूमा विरामीसंग सीधा सम्पर्क हुने 65 वर्ष मुनिका स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूले Tdap को एक मात्रा लिनु पर्दछ । अन्तिम पटक Td लिएपछि कम से कम 2 वर्ष पर्खनका लागि सुभाव दिइन्छ, तर त्यसै गर्नु पर्ने आवश्यकता भने छैन ।

पहिले कहिल्यै Tdap नलगाएका नव आमाहरूले सुत्केरी भए पछि, जति सक्दो छिटो यस्को एक मात्रा लगाउनु पर्दछ । *गर्भावस्थामा* खोप लगाउनु आवश्यक भएमा अक्सर गरेर Tdap भन्दा Td लाई प्राथमिकता दिइन्छ ।

घाउ लागे पछिको बचाउ

धेरै काटेको वा जलेको व्यक्तिलाई टिटानसको संक्रमणहुनबाट जोगाउन Td वा Tdap को एक मात्रा लगाउन आवश्यक पर्न सक्दछ । कहिल्यै एक मात्रा पनि नलगाएका मानिसहरूलाई Tdap लगाउन सकिने छ । तर Tdap उपलब्ध नभएमा Td को प्रयोग गर्नु पर्दछ वा निम्न व्यक्तिहरूलाई Td लगाउनु पर्दछ :

- Tdap को एक मात्रा लिइ सकेका कुनै पनि व्यक्तिलाई,
- 7 वर्ष देखि 9 वर्षको उमेर सम्मका केटाकेटीहरूलाई,
- 65 वर्ष वा सो भन्दा बढी उमेरका प्रौढ व्यक्तिहरूलाई ।

अरु खोपहरू जस्तै गरी Tdap र Td लाई पनि उही बेलामा लगाई दिन सकिन्छ ।

4 केही मानिसहरूलाई खोप लगाई दिनु हुँदैन वा लगाउनका लागि पर्खनु पर्दछ

- DTP, DTaP, DT, वा Td को एक मात्रा लगाए पछि त्यसबाट एलर्जी भै ज्यानै जाने किसिमले प्रतिक्रिया भैसकेका जुनसुकै व्यक्तिले पनि Td वा Tdap लगाउनु हुँदैन ।
- खोपमा राखिने कुनै पनि चीजबाट धेरै एलर्जी हुने व्यक्तिले खोप लगाउनु हुँदैन । खोप लगाइ दिन लागिएको व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कडा एलर्जी छ भने सो कुरा आफ्नो प्रदायकलाई बताउनुहोस् ।
- DTP वा DTaP को खोप लगाए पछि 7 दिन भित्र यदि कुनै व्यक्ति लाई कोमा (मुर्छा) भएको लामो आघात वा बहुआघात भएको भए र सो कुरा खोपबाट भएको नभै अन्य कुनै कारणबाट नै भएको भन्ने कुरा पत्ता नलागे सम्म त्यस्ता व्यक्तिले Tdap लगाउनु हुँदैन (यस्ता व्यक्तिहरूले Td लगाउन सक्दछन्) ।

- यी कुनै पनि खोपहरू लिन लागेका व्यक्तिमा निम्न कुरा भए त्यो कुरा आफ्नो प्रदायकलाई भन्नुहोस :
 - छर्रे रोग (एपिलिप्सी) वा स्नायुप्रणाली सम्बन्धी अन्य समस्या छ भने,
 - DTP, DTaP, DT, Td, वा Tdap पहिलो पटक लगाए पछि उसलाई धेरै सुन्निएको वा धेरै दुखेको थियो भने, वा
 - उसलाई गुलियन ब्यारिसिन्ड्रोम (GBS) भएको छ भने ।

कुनै व्यक्तिलाई खोप लगाउने भनी निर्धारित गरिएको दिनमा उ मध्यम खालले वा कडा खालले विमारी परेको छ भने त्यस्तो विमारीबाट निको नभए सम्म उसलाई Tdap वा Td खोप लगाउन पर्खनु पर्दछ । मन्द विमार भएको वा कम ज्वरो आएको व्यक्तिलाई अक्सर गरेर खोप लगाई दिन सकिन्छ ।

5 Tdap र Td खोपबाट हुने जोखिमहरू के के हुन ?

खोपबाट पनि (अरु कुनै औषधिले जस्तै) ज्यानै लिन खालको एलर्जीको प्रतिक्रिया हुने वा अर्कै गम्भीर समस्या उत्पन्न हुने अलिकति खतरा सधै रहेको हुन्छ ।

यी खोपहरू लिएवाट भन्दा टिटानस, डिपथेरिया वा पेटुसिस लागेवाट धेरै कडा खालका समस्याहरू पैदा हुने संभावना रहन्छ ।

Td वा Tdap को खोप लगाए पछि निस्केका भनि बताइएका समस्याहरू तल दिइएका छन् ।

हल्का खालका समस्याहरू (ध्यान दिन योग्य, तर क्रियाकलापहरू गर्नमा हस्तक्षेप नभएको)

Tdap

- बाट दुख्ने (4 जना किशोरकिशोरीहरूमा करीव 3 जनालाई र 3 जना वयस्क व्यक्तिहरू मा 2 जनालाई)
- बाट रातोहुने वा सुन्निने (5 जनामा करीव 1 जनालाई)
- बाट कम्तीमा 100.4 डिग्री फरेनहाइटको मन्द ज्वरो आउने (25 जना किशोरकिशोरीहरूमा करीव 1 जनालाई र 100 जना वयस्क व्यक्ति मा करीव 1 जनालाई)
- बाट टाउको दुख्ने (10 जना किशोरकिशोरीहरूमा करीव 4 जनालाई र 10 जना वयस्क व्यक्तिहरूमा करीव 3 जनालाई)
- बाट थकित देखिने (3 जना किशोरकिशोरीहरूमा करीव 1 जनालाई र 4 जना वयस्क व्यक्तिहरूमा करीव 1 जनालाई)
- बाट वाकवाकी लाग्ने, वान्ता आउने, पखाला लाग्ने, पेट दुख्ने (4 जना किशोरकिशोरीहरूमा करीव 1 जनालाई र 10 जना वयस्क व्यक्तिहरूमा करीव 1 जनालाई)
- बाट जाडो लाग्ने, शरीर दुख्ने, जोर्नीहरू दुख्ने, ग्रन्थीहरू सुन्निने (असामान्य)

Td

- बाट दुख्ने (10 जनामा करीव 8 जनालाई)
- बाट रातो हुने वा सुन्निने (3 जनामा करीव 1 जनालाई)
- बाट मन्द ज्वरो आउने (15 जनामा करीव 1 जनालाई)
- टाउको दुख्ने वा थकाई लाग्ने (असामान्य)

मध्यम खालका समस्याहरू

(क्रियाकलापहरू माथि हस्तक्षेप भएको तर उपचार गर्ने तर्फ ध्यान दिनु नपर्ने)

Tdap

- बाट सुइ लगाएको ठाउमा दुख्ने (20 जना किशोरकिशोरीहरूमा करीव 1 जनालाई र 100 जना वयस्क व्यक्तिहरूमा करीव 1 जनालाई)
- बाट रातो हुने वा सुन्निने (16 जना किशोरकिशोरीहरूमा करीव 1 जनालाई र 25 जना वयस्क व्यक्तिहरूमा करीव 1 जनालाई)
- बाट 102 डिग्री फरेनहाइट भन्दा बढी ज्वरो आउने (100 जना किशोरकिशोरीहरूमा करीव 1 जनालाई र 250 जना वयस्क व्यक्तिहरूमा करीव 1 जनालाई)
- बाट टाउको दुख्ने (300 जनामा 1 जनालाई)
- बाट वाकवाकी लाग्ने, वान्ता आउने, पखाला लाग्ने, पेट दुख्ने (100 जना किशोरकिशोरीहरूमा 3 जनालाई र 100 जना वयस्क व्यक्तिहरूमा 1 जनालाई)

Td

- बाट 102 डिग्री फरेनहाइट भन्दा बढी ज्वरो आउने (विरलै)

Tdap बाट वा Td बाट

- सुइ दिएको पाखुरामा धेरै नै सुन्निने (100 जनामा 3 जनालाई)

कडा खालका समस्याहरू (धेरै जसो क्रियाकलापहरू गर्न नसक्ने, औषधि गर्ने तर्फ ध्यानदिनु पर्ने)

Tdap

- को खोप लिए पछि स्वास्थ्य परिक्षण (क्लिनिकल ट्राएल) गर्दा दुइ जना वयस्क व्यक्तिहरूमा स्नायु प्रणाली सम्बन्धी समस्याहरू देखिए । खोपको कारणले यी समस्याहरू भएका हुन सक्छन् वा नभएका पनि हुन सक्दछ । यी समस्याहरू पछि आफै विलाउदै गए र तिनले कुनै स्थायी किस्मको नोक्सान पुर्याएनन् ।

Tdap वा Td

- बाट सुइ लगाएको पाखुरामा सुन्निने, धेरै दुख्ने र रातो हुने (विरलै)

कुनै पनि खोप लिए पछि त्यसको एलर्जीवाट धेरै प्रतिक्रिया पनि हुन सक्दछ । दश लाख खोप दिदा यस्तो कुरा एउटामा हुन सक्ने ।

6 मध्यम वा गम्भीर समस्या भएमा के गर्ने ?

मैले कुन कुराहरूको बिचार गर्नु पर्दछ ?

कुनै पनि किसिमको असामान्य अवस्थालाई जस्तो उच्च ज्वरो वा व्यवहारमा परिवर्तन । एलर्जीको निकै नै प्रतिक्रिया हुने लक्षणहरूमा पर्दछन् : सास फेर्न अपठेरो हुने, आवाज धोको हुने वा ध्यानध्यान गर्ने, चिलाउने खालका डावरहरू निस्कने, पहेलो हुने, कमजोर हुने, मुटु छिटोछिटो धडक्ने वा चक्कर लाग्ने ।

मैले के गर्नु पर्छ ?

- चिकित्सकलाई फोन गर्ने वा विरामीलाई तुरुन्तै चिकित्सक काहाँ लिएर जाने ।
- चिकित्सकलाई के भएको, भएको समय र मिति तथा खोप लिएको समय पनि बताउने ।
- आफ्नो प्रबन्धक (प्रोभाइडर) लाई खोप प्रतिकूल घटना सुचना व्यवस्था ब्याक्सिन एडभर्स ईभेन्ट रिपोर्टिंग सिस्टम (Vaccine Adverse Event Reporting System, VAERS) को फारम भरेर एलर्जीको रिपोर्ट गर्न **आग्रह गर्ने** । अथवा तपाई आफैले पनि VAERS को वेबसाइट www.vaers.hhs.gov मार्फत वा नं. **1-800-822-7967** मा फोन गरेर यो जाहेरी दिन सक्नुहुन्छ ।

VAERS ले स्वास्थ्य सम्बन्धी कुरामा सुझाव दिदैन ।

7 खोपबाट हुने चोटपटकको लागि क्षतिपूर्ति गर्ने सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यक्रम

खोप लिदा गम्भीर प्रतिक्रिया भएको कुनै पनि व्यक्तिको उपचारमा लाग्ने खर्च तिन सहयोग गर्नका लागि एउटा संघीय कार्यक्रम विद्यमान रहेको छ ।

खोपबाट हुने चोटपटकको लागि क्षतिपूर्ति गर्ने सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यक्रम (National Vaccine Injury Compensation Program) को बारेमा विस्तृत जानकारी लिन नं. **1-800-338-2382** मा फोन गर्नुहोस वा उक्त कार्यक्रमको वेबसाइट www.hrsa.gov/vaccinecompensation हेर्नुहोस ।

8 मैले अन्य कुराहरू कसरी सिक्ने ?

- आफ्नो व्यवस्थापकलाई सोध्ने । उनीहरूले तपाईलाई खोपको जानकारी पुस्तिका वा अन्य जानकारीका श्रोतहरू उपलब्ध गराउन सक्छन् ।
- आफ्नो स्थानिय वा राज्य स्वास्थ्य विभागमा फोन गर्ने ।
- रोग नियन्त्रण तथा निवारण केन्द्र (CDC) मा सम्पर्क गर्ने :
 - नं. **1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO)** मा फोन गर्नुहोस
 - CDC को निम्न वेबसाइटहरू हेर्नुहोस : www.cdc.gov/vaccines.



DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES
CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION

Vaccine Information Statement (Interim)
Td & Tdap Vaccines NP - Nepali (11/18/08) 42 U.S.C. § 300aa-26
Translated by Transcend Translations, Davis, CA www.transcend.net