

SZCZEPIONKA PRZECIWKO WIRUSOWEMU ZAPALENIU WĄTROBY TYPU A

CO POWINNIŚMY WIEDZIEĆ NA TEN TEMAT ?

1. Jaką chorobą jest wirusowe zapalenie wątroby typu A ?

Wirusowe zapalenie wątroby typu A (WZW-A) jest bardzo poważną chorobą wątroby wywołaną wirusem. WZW-A znajduje się w stolcu osoby chorej na wirusowe zapalenie wątroby typu A. Choroba ta roznoszona jest poprzez bliski kontakt z osobą chorą, albo przez spożywanie zakażonych wirusem WZW-A produktów żywnościowych lub wody.

Wirusowe zapalenie wątroby typu A może spowodować:

- lekkie objawy chorobowe podobne do grypy
- żółtaczkę (żółte zabarwienie skóry lub oczu)
- silny ból brzucha i rozwolnienie

Osoby chorujące na wirusowe zapalenie wątroby typu A często muszą być leczone szpitalnie. W rzadkich przypadkach choroba ta może być przyczyną zgonu .



Osoba chorująca na wirusowe zapalenie wątroby bardzo łatwo może zarazić współmieszkańców.

Szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby może być skutecznym środkiem zapobiegawczym.

2. Kto i kiedy powinien być zaszczepiony przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby ?

- osoby powyżej 2 roku życia podróżujące lub pracujące w krajach o dużej frekwencji zachorowań na WZW-A; do krajów tych należą kraje Europy Południowej i Wschodniej, Ameryki Centralnej i Południowej, Azji (z wyjątkiem Japonii), Afryki, Wysp Karaibskich oraz Meksyk. *Seria szczepień powinna być rozpoczęta przynajmniej jeden miesiąc przed podróżą.*

Hepatitis A-Polish 8/25/98

- osoby zamieszkujące obszary w których często występują epidemie zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A.
- osoby należące do grup etnicznych w których zachorowania na WZW-A są bardzo częste; do tych grup należą Indianie Ameryki Północnej, etniczni mieszkańcy Alaski oraz Wysp Pacyfiku, a także osoby żyjące w zamkniętych grupach religijnych
- mężczyźni, którzy współżyją seksualnie z mężczyznami
- osoby zażywające narkotyki
- osoby cierpiące na chroniczną chorobę wątroby
- osoby zażywające leki przeciwskrzepowe

Do całkowitego zabezpieczenia się przed tą chorobą wymagane są dwie dawki szczepionki podane z przerwą 6 miesięczną.

Szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A może być podawana równocześnie z innymi szczepionkami.



3. Kto powinien zaniechać lub odłożyć szczepienie przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A ?

Osoby, wykazujące silną reakcję alergiczną na szczepionkę przeciw WZW-A nie powinny otrzymać następnej dawki tej szczepionki. W czasie choroby o lekkim przebiegu można podawać szczepionkę przeciw WZW-A, jakkolwiek przy silniejszej lub bardzo poważnej chorobie należy szczepienie odłożyć do czasu pełnego wyzdrowienia. Lekarz może zalecić odpowiednią drogę postępowania.

Granice bezpieczeństwa szczepienia kobiet ciężarnych nie są jeszcze w pełni określone. Przewiduje się natomiast, że ryzyko dla płodu oraz matki jest bardzo niskie.

O bardziej szczegółowe informacje na ten temat zwróć się do swojego lekarza lub pielęgniarki.

4. Ryzyko związane ze szczepionką przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A.

Szczepionka ta tak jak każde lekarstwo może spowodować problemy jak n.p. bardzo ostre reakcje alergiczne. Prawdopodobieństwo zgonu lub silnych obrażeń z powodu zaszczepienia szczepionką przeciw WZW-A jest znikome.

Zaszczepienie szczepionką przeciw WZW-A jest znacznie bezpieczniejsze niż przechodzenie tej choroby.

LEKKIE REAKCJE

- ból w miejscu otrzymania zastrzyku (~ 1 na 2 dorosłych, i do 1 na 10 dzieci)
- ból głowy (~1 na 6 dorosłych i 1 na 20 dzieci)
- brak apetytu (~ 1 na 12 dzieci)
- osłabienie (~ 1 na 14 dorosłych)

Powyższe objawy, jeżeli wystąpią, zazwyczaj pojawiają się w 3-4 dni po szczepieniu i będą trwały przez 1-2 dni.

POWAŻNE REAKCJE

- bardzo silna alergiczna reakcja na szczepionkę w pierwszych minutach lub godzinach po jej otrzymaniu (bardzo sporadyczne przypadki)

5. Co robić w wypadku silniejszej i bardzo poważnej reakcji?

Na co powinniśmy zwracać uwagę ?

Zwracamy uwagę na niecodzienne symptomy takie jak wysoka gorączka lub zmiana zachowania. Objawami silnej reakcji alergicznej mogą być: problem z oddychaniem, chrypliwy głos, świszczący oddech, wysypka, błądź, osłabienie, szybkie bicie serca i zawroty głowy.

Co powinniśmy zrobić?

- natychmiast telefonicznie, lub osobiście skontaktować się z lekarzem
- podać lekarzowi wszystkie dane łącznie z datą wystąpienia objawów i szczepienia
- poprosić lekarza, pielęgniarkę lub urząd zdrowia o wypełnienie formularza: „Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS)”; można również zawiadomić VAERS osobiście dzwoniąc na numer 1-800-822-7967

Hepatitis A-Polish 8/25/98

6. Jak uzyskać więcej informacji ?

- Twój lekarz lub pielęgniarka może zaoferować publikacje na ten temat albo zasugerować inne źródła uzyskania informacji
- zatelefonuj do lokalnego lub stanowego urzędu szczepień
- skontaktuj się z centrum chorób zakaźnych i ich zapobiegania - „Center for Disease Control and Prevention (CDC)”
 - w jęz. Angielskim 1-800-232-2522
 - w jęz. Hiszpańskim 1-800-232-0233
 - na internecie odwiedź stronę rządowego programu szczepień - „National Immunization Programs”
<http://www.cdc.gov/nip/> lub strone - „CDC, hepatitis”
<http://www.cdc.gov/ncidod/diseases/hepatitis/hepatitis.htm>

IMMUNOGLOBULINY (IG)

Immunoglobuliny mogą wytworzyć tymczasową odporność przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A

KTO POWINIEN OTRZYMAĆ DAWKĘ IMMUNOGLOBULINY ?

- osoby, które zostały narażone na kontakt z wirusem WZW-A mogą w okresie do 2 tygodni od czasu zetknięcia się z tym wirusem dostać dawkę immunoglobuliny.
- osoby podróżujące do krajów o dużym procencie zachorowań na WZW-A, którzy jeszcze nie zostali zaszczepieni szczepionką przeciw tej chorobie.

KIEDY POWINA BYĆ PODANA DAWKA IG ?

Dawka IG może być podana przed kontaktem z wirusem zapalenia wątroby typu A, lub w okresie do 2 tygodni po zetknięciu się z tym wirusem.

KORZYŚCI

IG zależnie od dawki ochrania przeciw wirusowemu WZW-A przez okres 3-5 miesięcy.

RYZYKO

Sporadycznie: opuchlizna, wysypka lub reakcja alergiczna.



U.S. DEPARTMENT OF HEALTH & HUMAN SERVICES
Centers for Disease Control and Prevention
National Immunization Program