

รายงานข้อมูลวัคซีน

วัคซีนซอสเตอร์ (โรคงูสวัด) ชนิดเชื้อตาย, RZV: สิ่งที่คุณต้องทราบ


Many Vaccine Information Statements are available in Thai and other languages. See www.immunize.org/vis
 มีรายงานวัคซีนจำนวนมากที่มีให้ในภาษาไทย และภาษาอื่น ๆ ดู www.immunize.org/vis

1 เหตุใดจึงต้องรับวัคซีน

โรคงูสวัด (หรือที่เรียกว่าเฮอริปซซอสเตอร์ หรือเรียกสั้น ๆ ว่าซอสเตอร์) เป็นผื่นผิวหนังเจ็บแสบ มักมาพร้อมกับแผลพุพอง โรคงูสวัดมีสาเหตุมาจากไวรัสวาริเซลลาซอสเตอร์ ซึ่งเป็นไวรัสชนิดเดียวกับที่ทำให้เกิดโรคอีสุกอีใส หลังจากที่คุณเป็นโรคอีสุกอีใส ไวรัสจะอยู่ในร่างกายของคุณและสามารถทำให้เป็นโรคงูสวัดในชีวิตหลังจากนั้น

คุณไม่สามารถติดโรคงูสวัดได้จากผู้อื่น อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ไม่เคยเป็นโรคอีสุกอีใส (หรือไม่เคยได้รับวัคซีนอีสุกอีใส) อาจได้รับเชื้อโรคอีสุกอีใสจากผู้ที่เป็นงูสวัด

ผื่นงูสวัดโดยทั่วไปจะปรากฏที่ข้างหนึ่งของหน้าหรือร่างกาย และรักษาหายภายใน 2 ถึง 4 สัปดาห์ อาการหลักของโรคคือเจ็บปวด ซึ่งอาจรุนแรง อาการอื่น ๆ อาจรวมถึงอาการไข้ ปวดหัว หนาวเย็น และท้องบวม ในกรณีนี้บ่อยมาก การติดเชื้องูสวัดอาจทำให้ปวดบวม มีปัญหาในการได้ยิน ตาบอด สมอติติเชื้อ (สมองอักเสบ) หรือเสียชีวิต



สำหรับผู้ป่วยประมาณ 1 ใน 5 อาการเจ็บรุนแรงอาจยังคงอยู่นานกว่านั้นหลังจากที่ผื่นหายไปแล้ว อาการเจ็บที่ยาวนานนี้เรียกว่าอาการปวดเส้นประสาทหลังจากเป็นโรคงูสวัด (post-herpetic neuralgia หรือ PHN)

โรคงูสวัดจะพบในผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปบ่อยกว่าเด็ก และจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นตามอายุ นอกจากนี้ ยังพบบ่อยในผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอเนื่องจากโรค เช่น มะเร็ง หรือเนื่องจากยา เช่น สเตียรอยด์ หรือเคมีบำบัด

ประชากรในสหรัฐอเมริกาเป็นโรคงูสวัดอย่างน้อย 1 ล้านคนต่อปี

2 วัคซีนโรคงูสวัด (ชนิดเชื้อตาย)

วัคซีนโรคงูสวัดชนิดเชื้อตายได้รับอนุมัติจาก FDA ในปี 2017 สำหรับการป้องกันโรคงูสวัด ในการทดลองทางคลินิก พบว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคงูสวัดมากกว่า 90% และยังมีแนวโน้มของ PHN ลดลง

แนะนำให้รับวัคซีนสองครั้ง ห่างกัน 2 ถึง 6 เดือน สำหรับผู้ใหญ่ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป วัคซีนนี้ยังแนะนำให้สำหรับผู้ที่เคยได้รับวัคซีนโรคงูสวัดชนิดเชื้อเป็น (Zostavax) แล้วด้วย ไม่มีไวรัสเชื้อเป็นในวัคซีนนี้

3 บุคคลที่ไม่ควรรับวัคซีน

แจ้งผู้ให้วัคซีนแก่คุณ หากคุณ:

- **มีอาการแพ้ร้ายแรงที่เป็นอันตรายถึงชีวิต** บุคคลที่มีอาการแพ้ที่เป็นอันตรายถึงชีวิตหลังจากได้รับวัคซีนโรคงูสวัดชนิดเชื้อตายหนึ่งครั้ง หรือมีอาการแพ้ร้ายแรงต่อส่วนใดส่วนหนึ่งของวัคซีนนี้ อาจได้รับคำแนะนำให้ไม่รับวัคซีน สอบถามผู้ให้บริการดูแลสุขภาพของคุณ หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนประกอบของวัคซีน
- **ตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร** ไม่มีข้อมูลมากนักเกี่ยวกับการใช้วัคซีนโรคงูสวัดชนิดเชื้อตายในสตรีมีครรภ์ หรือสตรีที่ให้นมบุตร ผู้ให้บริการดูแลสุขภาพของคุณอาจแนะนำให้เลื่อนการรับวัคซีนออกไปก่อน
- **รู้สึกไม่สบาย** หากคุณมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย เช่น หวัด คุณอาจสามารถรับวัคซีนได้ในวันนั้น หากคุณมีอาการเจ็บป่วยปานกลางหรือรุนแรง คุณควรรอจนกว่าคุณจะหายดี แพทย์ของคุณสามารถแนะนำคุณได้



4 ความเสี่ยงของอาการแพ้วัคซีน

ได้รับยาใด ๆ รวมถึงวัคซีน จะมีโอกาสเกิดอาการแพ้

หลังจากฉีดวัคซีนโรคสเตรปโตค็อกคัสเชื้อตาย บุคคลอาจมีอาการดังนี้

- ปวด แดง เจ็บ หรือบวมบริเวณที่ฉีดวัคซีน
- ปวดหัว ปวดกล้ามเนื้อ ไข้ หนาวสั่น อ่อนล้า

ในการทดลองทางคลินิก คนส่วนใหญ่จะเจ็บแขนเล็กน้อยถึงปานกลางหลังจากได้รับวัคซีน และยังมีอาการแดงและบวมบริเวณที่ฉีดวัคซีน บางคนรู้สึกเหนื่อย ปวดกล้ามเนื้อ ปวดหัว หนาวสั่น ไข้ ปวดท้อง หรือคลื่นไส้ ประมาณ 1 ใน 6 คนที่ได้รับวัคซีนซอสเตอร์ชนิดเชื้อตายมีผลข้างเคียงที่ทำให้พวกเขาไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ อาการจะหายไปเองในประมาณ 2 ถึง 3 วัน ผลข้างเคียงพบมากในผู้ที่มีอายุน้อย

คุณยังคงได้รับวัคซีนซอสเตอร์ชนิดเชื้อตายครั้งที่สอง แม้ว่าคุณจะมีอาการแพ้หนึ่งในอาการเหล่านี้หลังจากได้รับวัคซีนครั้งแรก

อาการอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นหลังจากได้รับวัคซีนนี้ ได้แก่

- บางคนอาจเป็นลมหลังจากให้การรักษา รวมถึงการฉีดวัคซีน การนั่งหรือเอนหลังเป็นเวลาประมาณ 15 นาที อาจช่วยป้องกันการเป็นลมและการบาดเจ็บที่เกิดจากการหกล้ม แจ้งผู้ให้บริการของคุณทราบ หากคุณรู้สึกเวียนหัว หรือการมองเห็นเปลี่ยนแปลงไป หรือมีเสียงในหู
- บางคนอาจเจ็บไหล่ ซึ่งอาจร้ายแรงกว่าและยาวนานกว่าการเจ็บทั่วไปที่อาจเกิดขึ้นหลังจากการฉีดยา อาการนี้แทบจะไม่เกิดขึ้นเลย
- การรักษาด้วยยาใด ๆ สามารถก่อให้เกิดอาการแพ้รุนแรงได้ มีการประมาณการว่าอาการแพ้วัคซีนดังกล่าวเกิดขึ้น 1 ในล้านครั้ง และอาจเกิดขึ้นไม่กี่ปีก่อนหรือไม่กี่ชั่วโมงหลังจากฉีดวัคซีน

เมื่อให้ร่วมกับยาใด ๆ มีโอกาสเล็กน้อยมาก ที่วัคซีนจะก่อให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรง หรือเสียชีวิต

จะมีการติดตามควบคุมความปลอดภัยของวัคซีนเสมอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.cdc.gov/vaccinesafety/

5 ควรทำอย่างไร หากเกิดปัญหา ร้ายแรง

ฉันควรจะพิจารณาอะไร

- พิจารณาทุกเรื่องที่ทำให้คุณกังวล เช่น สัญญาณของอาการแพ้รุนแรง มีไข้สูงมาก หรือพฤติกรรมที่ผิดปกติ

สัญญาณของอาการแพ้รุนแรงอาจได้แก่ ลมพิษ หน้าและคอบวม หายใจลำบาก หัวใจเต้นเร็ว เวียนหัว และอ่อนเพลีย อาการเหล่านี้มักเริ่มมีตั้งแต่ได้รับวัคซีนไม่กี่นาทีจนถึงไม่กี่ชั่วโมง

ฉันควรทำอย่างไร

- หากคุณคิดว่าเป็นอาการแพ้ร้ายแรงหรืออาการฉุกเฉินอื่น ๆ ที่รอไม่ได้ โปรดโทร 9-1-1 และไปยังโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด หรือโทรติดต่อผู้ให้บริการดูแลสุขภาพของคุณ

หลังจากนั้น ควรรายงานอาการแพ้ไปยัง Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) (ระบบการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากวัคซีน) แพทย์ของคุณควรส่งรายงานนี้ หรือคุณอาจส่งด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ VAERS ที่ www.vaers.hhs.gov หรือโทร 1-800-822-7967

VAERS ไม่ได้ให้คำปรึกษาทางการแพทย์

6 ฉันจะเรียนรู้เพิ่มเติมได้อย่างไร

- สอบถามผู้ให้บริการดูแลสุขภาพของคุณ บุคคลนั้นสามารถให้เอกสารประกอบแพ็คเกจวัคซีน หรือแนะนำแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ได้
- โทรติดต่อกรมสุขภาพของรัฐหรือท้องถิ่นของคุณ
- ติดต่อ Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค):
 - โทร 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) หรือ
 - ไปที่เว็บไซต์ของ CDC ที่ www.cdc.gov/vaccines

Vaccine Information Statement Recombinant Zoster Vaccine

2/12/2018

Thai

Office use only

