

儿童和青少年何时需要接种疫苗？

年龄	HepB 乙型肝炎	RSV- mAb	DTaP/Tdap 白喉、 破伤风、百日咳 (哮喘)	Hib 乙型流感嗜 血杆菌	IPV 小儿麻 痹症	PCV 肺炎球菌结 合疫苗	RV 轮状病毒	MMR 麻疹、腮腺 炎、风疹	水痘	HepA 甲型肝炎	新冠肺炎 COVID-19	登革热	HPV 人乳头瘤病毒	Men- ACWY	MenB	流感		
														脑膜炎球菌				
出生时	✓	✓ ² (0-7 个月)																
2个月	✓		✓	✓	✓	✓	✓											
4个月	✓ ¹		✓	✓	✓	✓	✓											
6个月	✓ (6-18 个月)	✓ ² (8-19 个月)	✓	✓ ¹	✓ (6-18 个月)	✓	✓ ¹									✓		
8个月																	(6个月及 以上)	
12个月			✓ ³ (15-18 个月)	✓ (12-15 个月)			✓ (12-15 个月)	✓ (12-15 个月)	✓ (12-15 个月)	✓ (12-15 个月)	✓ (12-15 个月)	✓✓ (在12-23个 月时常规注射 2剂,间隔 6个月)	✓ ⁴ 建议为 所有年龄 6个月及以上 的人接种新冠 肺炎疫苗					
15个月																		
18个月																		
19-23个月									HepA疫苗 (2剂)也被建议 用于既往未接 种的儿童和青 少年									
4-6岁			✓		✓													
7-10岁																		
11-12岁			✓(Tdap)										✓✓✓ ⁵ 建议为某些儿 童接种登革热 疫苗	✓✓ ^{6,7}	✓	建议为每个 年龄在6个月 及以上的人每 年接种流感 疫苗		
13-15岁																		
16-18岁														✓	✓✓ 8,9,10			

每个秋季或冬季一剂。有些年龄不满9岁的儿童需要接种2剂；请咨询您孩子的医务人员您的孩子是否需要接种超过1剂疫苗。

- 备注**
- 您的孩子是否需要注射该剂疫苗，取决于您的医务人员使用的疫苗品牌。
 - 母亲在妊娠期间未接种 RSV 疫苗且年龄小于 8 个月 0 天的婴儿应在 RSV 流行季节（通常为 10 月至次年 3 月）之前或期间接种 RSV 预防性抗体（RSV-mAb）疫苗。某些高风险儿童（8 至 19 个月）在第二个 RSV 流行季之前需要接种 RSV-mAb。
 - 如果自前一剂疫苗接种时间算起已经有 6 个月，最早可在 12 个月大时接种该剂 DTaP。
 - 5 岁或以上儿童通常只需要接种一剂。6 月龄至 4 岁儿童的接种次数由疫苗品牌决定。
 - 年龄为 9 至 16 岁，居住在波多黎各、美属萨摩亚、美属维尔京群岛、密克罗尼西亚联邦、马绍尔群岛共和国和帕劳共和国，且经实验室确认曾感染登革热的儿童建议接种 3 剂登革热疫苗。
 - HPV 疫苗通常在 11 岁或 12 岁时接种，但也可在 9 岁时开始接种。
 - 患有特定医学病症的儿童需要接种第 3 剂。
 - 健康的青少年可接种该疫苗。对于患有特定健康病症的青少年，也建议接种该剂疫苗。
 - 根据您的医务人员的建议，青少年可能需要接种额外剂次。
 - 当需要同时接种 MenACWY 和 MenB 疫苗时，可以使用 MenABCWY 联合疫苗。

