

# Bebeğinizin Aşılıarı

## Ebeveynlere Rehber

### Bebeğinize yapılması gereken aşilar bunlardır!

<b>Doğum →</b>	<b>Hep-B</b>
<b>2 ay →</b>	<b>Hep-B + DTaP + PCV13 + Hib + Polio + RV</b> 1-2 ay <sup>1</sup>
<b>4 ay →</b>	<b>Hep-B<sup>2</sup> + DTaP + PCV13 + Hib + Polio + RV</b>
<b>6 ay →</b>	<b>Hep-B + DTaP + PCV13 + Hib<sup>3</sup> + Polio + RV<sup>4</sup> + Grip<sup>5</sup></b> 6-18 ay <sup>1</sup> 6-18 ay <sup>1</sup>
<b>12 ay → ve daha büyüklere</b>	<b>MMR + DTaP + PCV13 + Hib + Su çiçeği + HepA<sup>6</sup> + Grip<sup>5</sup></b> 12-15 ay <sup>1</sup> 15-18 ay <sup>1</sup> 12-15 ay <sup>1</sup> 12-15 ay <sup>1</sup> 12-15 ay <sup>1</sup> 12-23 ay <sup>1</sup>

Doktorunuz veya hemşirenizle bebeğinizin şemadaki aşilarının tümünün zamanında yapılıp yapılmadığını kontrol edin. Çoğu zaman enjeksiyon sayısını azaltmak için karma aşilar kullanılır. Ayrıca bebeğinize yapılan bütün aşiların işlendiği bir aşı kartını vermelerini isteyiniz ve bu kartı her gelişinizde yanınızda getiriniz.

Bebeğinizin aşilarla korunabileceği hastalıklar aşağıdadır:

**Hep-B:** ciddi bir karaciğer hastalığı olan hepatit B

**DTaP:** difteri, tetanoz ve boğmaca

**PCV13:** ciddi kan, akciğer ve beyin enfeksiyonlarına neden olan pnömokoka karşı korur

**Hib:** ciddi beyin, boğaz ve kan enfeksiyonlarına neden olan *Haemophilus influenza* tip b

**Polio:** çocuk felci

**RV:** ciddi ishallerine neden olan rotavirüs enfeksiyonu

**Grip:** ciddi akciğer enfeksiyonu

**MMR:** kızamık, kızamıkçık ve kabakulak

**HepA:** ciddi bir karaciğer hastalığı olan Hepatit A

**Suçiçeği:** suçiçeği hastalığı

Yukardaki şema için dipnotlar.

1. Bu aşinin yapılması gereken yaş aralığıdır.
2. Kullanılan aşı tipine bağlı olarak bebeğinize 4 aylıkken HepB aşısı gerekli olmayabilir.
3. Kullanılan aşı tipine bağlı olarak bebeğinize 6. aylıkken Hib aşısı gerekli olmayabilir.
4. Kullanılan aşı tipine bağlı olarak bebeğinize 6. aylıkken RV aşısı gerekli olmayabilir.
5. Her yılın sonbahar veya kışında 6 aylık ve daha büyük bütün çocuklara grip aşısı yapılmalıdır.
6. Çocuğunuza en az 6 ay arayla 2 doz HepA aşısı gerekmektedir.