

# 婴儿和儿童（年龄 0–10 岁）疫苗接种

给您的孩子及时接种疫苗将有助于保护他或她免患 15 种疫苗可预防的疾病。询问您孩子的医疗护理提供者，您的孩子是否已经注射了所有截至目前为止应该注射的疫苗。

疫苗	您的孩子是否已经注射了所有截至目前为止应该注射的疫苗？
水痘 (Var)	您的孩子需要注射 2 剂水痘疫苗。第一剂在 12–15 个月时注射，第 2 剂在 4–6 岁时注射。
白喉、破伤风和百日咳 (DTaP)	您的孩子需要注射 5 剂 DTaP 疫苗。第一剂在 2 个月时注射，第二剂在 4 个月时注射，第三剂在 6 个月时注射，第四剂在 15–18 个月时注射，第五剂在 4–6 岁时注射。
乙型流感嗜血杆菌 (Hib)	您的孩子需要注射 3–4 剂 Hib 疫苗，注射次数依据疫苗品牌而定。第一剂在 2 个月时注射，第二剂在 4 个月时注射，第三剂在 6 个月时注射 (如果需要)，最后一剂在 12–15 个月时注射。
甲肝 (HepA)	您的孩子需要注射 2 剂甲型肝炎疫苗。第一剂在 1 岁时注射，第二剂在之后的 6–18 个月时注射。
乙肝 (HepB)	您的孩子需要注射 3–4 剂乙肝疫苗，注射次数依据疫苗品牌而定。第一剂在出生时注射，第二剂在 1–2 个月时注射，第三剂在 4 个月时注射 (如果需要)，最后一剂在 6–18 个月时注射。
流感 (Flu)	每个年龄在 6 个月及以上的人，都需要在有生之年，在每个秋天或冬天，接种流感疫苗。一些年龄小于 9 岁的孩子需要注射 2 剂。询问您孩子的医疗护理提供者，您孩子是否需要注射 1 剂以上疫苗。
麻疹、腮腺炎、风疹 (MMR)	您的孩子需要注射 2 剂 MMR 疫苗。第一剂在 12–15 个月时注射，第二剂在 4–6 岁时注射。
脑膜炎球菌 (MenACWY [MCV4]、MenB)	年龄为 0–10 岁且患有特定健康病症 (比如无功能性脾脏) 的婴儿和儿童需要注射一剂或两剂脑膜炎球菌疫苗。与您的医疗护理提供者交谈，弄清楚您的孩子是否需要接种脑膜炎球菌疫苗。
肺炎球菌 (Pneumovax [多糖疫苗, PPSV]、Pneumovax [结合疫苗, PCV])	您的孩子需要注射 4 剂 Pnevnar (PCV)。第一剂在 2 个月时注射，第二剂在 4 个月时注射，第三剂在 6 个月时注射，第四剂在 12–15 个月时注射。一些孩子也需要注射一剂 Pneumovax (PPSV)。询问您孩子的医疗护理提供者，您的孩子是否需要这种额外的疫苗，以预防肺炎球菌疾病。
小儿麻痹症 (IPV)	您的孩子需要注射 4 剂脊髓灰质炎疫苗 (IPV)。第一剂在 2 个月时注射，第二剂在 4 个月时注射，第三剂在 6–18 个月时注射，第四剂在 4–6 岁时注射。
轮状病毒 (RV)	您的孩子需要注射 2–3 剂轮状病毒疫苗 (RV)，注射次数依据疫苗品牌而定。第一剂在 2 个月时注射，第二剂在 4 个月时注射，第三剂 (如果需要) 在 6 个月时注射。

您的孩子将去美国以外的地方旅游吗？访问美国疾病控制和预防中心 (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) 网站 [wwwnc.cdc.gov/travel/destinations/list](http://wwwnc.cdc.gov/travel/destinations/list)，获取旅行信息，或咨询旅行诊所。