

اللقاحات للرضع والأطفال، عمر 0-10 أعوام

سيساعد حصول طفلك على اللقاحات في موعدها على حمايته من 15 مرض يمكن الوقاية منه باللقاحات.
أسأل مقدم الرعاية الصحية لطفلك عما إذا كان طفلك قد حصل على كل اللقاحات الموصى بها أم لا.

هل حصل طفلك على آخر لقاح؟	اللقاح
يحتاج طفلك جرعتين من لقاح الجدري المائي. يتم أخذ الجرعة الأولى عند عمر 12-15 شهر والثانية عند عمر 4-6 سنوات.	الجدري المائي (الحماق: Var)
يحتاج طفلك 5 جرعات من لقاح الدفتريا والتيتانوس والسعال الديكي. يتم أخذ الجرعة الأولى عند عمر شهرين. والثانية عند عمر 4 شهور. والثالثة عند عمر 6 شهور. والرابعة عند عمر 15-18 شهر. والخامسة عند عمر 4-6 سنوات.	الدفتريا والتيتانوس والسعال الديكي (الشاهوق: DTaP)
يحتاج طفلك 3-4 جرعات من لقاح المستدمية النزلية من النوع ب. بناءً على نوع الماركة التجارية للقاح. يتم أخذ الجرعة الأولى عند عمر شهرين. والثانية عند عمر 4 شهور. والثالثة عند عمر 6 شهور (إذا لزم الأمر). والأخيرة عند عمر 12-15 شهر.	المستدمية النزلية من النوع ب (Hib)
يحتاج طفلك جرعتين من لقاح التهاب الكبد الوبائي أ. يتم أخذ الجرعة الأولى عند عمر عام واحد والثانية بعدها بـ 6-18 شهر.	التهاب الكبد الوبائي أ (HepA)
يحتاج طفلك 3-4 جرعات من لقاح التهاب الكبد الوبائي ب. بناءً على نوع الماركة التجارية للقاح. يتم أخذ الجرعة الأولى عند الولادة. والثانية عند عمر شهر - شهرين. والثالثة عند عمر 4 شهور (إذا لزم الأمر). والأخيرة عند عمر 6-18 شهر.	التهاب الكبد الوبائي ب (HepB)
يحتاج كل من يبلغ عمره 6 شهور فما فوق إلى لقاح للإنفلونزا كل خريف أو شتاء وإلى باقي عمره. يحتاج بعض الأطفال الأقل من عمر 9 سنوات جرعتين. أسأل مقدم الرعاية الصحية لطفلك عما إذا كان طفلك يحتاج أكثر من جرعة واحدة.	الإنفلونزا (Flu)
يحتاج طفلك جرعتين من لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية. يتم أخذ الجرعة الأولى عند عمر 12-15 شهر والثانية عند عمر 4-6 سنوات.	الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR)
يحتاج الرضع والأطفال في عمر 0-10 سنوات من عندهم حالات صحية مُعَيَّنة (مثل طحال لا يعمل) إلى أحد أو كلا لقاحي المكورات السحائية. حدث مع مقدم الرعاية الصحية لمعرفة ما إذا كان يحتاج طفلك للقاح المكورات السحائية.	المكورات السحائية MenACWY ([MCV4], MenB)
يحتاج طفلك 4 جرعات من بريفنار (PCV). يتم أخذ الجرعة الأولى عند عمر شهرين. والثانية عند عمر 4 شهور. والثالثة عند عمر 6 شهور. والرابعة عند عمر 12-15 شهر. يحتاج بعض الأطفال أيضًا جرعة نيموفاكس (PPSV). أسأل مقدم الرعاية الصحية لطفلك عما إذا كان طفلك يحتاج هذه الحماية الإضافية من مرض المكورات الرئوية. عديد السكاريد. (PPSV)	المكورات الرئوية (بريفنار [لقاح متقارن. نيموفاكس] لقاح [PCV]. عديد السكاريد. [PPSV])
يحتاج طفلك 4 جرعات من لقاح شلل الأطفال (IPV). يتم أخذ الجرعة الأولى عند عمر شهرين. والثانية عند عمر 4 شهور. والثالثة عند عمر 6-18 شهر. والرابعة عند عمر 4-6 سنوات.	شلل الأطفال (IPV)
يحتاج طفلك 2-3 جرعات من لقاح الفيروس العجلى (RV). بناءً على نوع الماركة التجارية للقاح. يتم أخذ الجرعة الأولى عند عمر شهرين. والثانية عند عمر 4 شهور. والثالثة (إذا لزم الأمر) عند عمر 6 شهور.	الفيروس العجلى (RV)

هل سيسافر طفلك خارج الولايات المتحدة؟ قم بزيارة الموقع الإلكتروني لمراكز مكافحة الأمراض واتقائها
على (Centers for Disease Control and Prevention, CDC)
wwwnc.cdc.gov/travel/destinations/list للحصول على معلومات السفر. أو استشر عيادة سفر.

"Vaccinations for Infants and Children, Age 0-10 Years"

Saint Paul, Minnesota • 651-647-9009 • www.immunize.org • www.vaccineinformation.org

www.immunize.org/catg.d/p4019-20.pdf • Item #P4019-20 Arabic (5/20)

immunization
action coalition
IAC
immunize.org