

# 青春期前儿童和青少年（年龄 11-19 岁）疫苗接种

进行免疫接种是一项终身持续、保护生命的工作。确保您的医务人员为您注射了所有截至目前为止应该注射的疫苗。检查以确保您已经接种了您所需的所有疫苗。

疫苗	您需要吗?
水痘 (Var)	<b>是的!</b> 如果您还没有接种该疫苗, 还没有患过水痘, 那么您需要注射 2 剂疫苗。任何只接种了一剂疫苗的人应该注射第二剂。
甲肝 (HepA)	<b>是的!</b> 如果您已经完成接种, 您需要接种 2 剂该疫苗。任何仅接种 1 剂疫苗的人应在至少 6-18 个月后接种第 2 剂。
乙肝 (HepB)	<b>是的!</b> 建议对所有 0-18 岁的人使用这种疫苗。如果您还没有接受过乙肝疫苗系列, 那么您需要注射该系列疫苗。
乙型流感嗜血杆菌 (Hib)	<b>也许。</b> 如果您还没有接种过 Hib 疫苗, 而且您患有某种高风险的病症 (比如, 无功能性脾脏), 您需要该疫苗。
人乳头瘤病毒 (HPV)	<b>是的!</b> 所有的青少年在 11 岁或 12 岁时需要接种 2 剂 HPV 疫苗。未接种疫苗的大龄青少年将需要接种 2 剂或 3 剂。这种疫苗可预防 HPV, HPV 是生殖器疣和几种类型癌症的常见原因, 包括宫颈癌以及肛门、阴茎和咽喉癌症。
流感 (Flu)	<b>是的!</b> 每个年龄在 6 个月及以上的人, 都需要在有生之年, 在每年秋天或冬天, 接种流感疫苗。
麻疹、腮腺炎、 风疹(MMR)	<b>是的!</b> 如果您还没有注射过 MMR 疫苗, 那么您需要注射 2 剂 MMR 疫苗。通常在儿童期注射 MMR 疫苗。
脑膜炎球菌 ACWY (MenACWY, MCV4)	<b>是的!</b> 所有青春期前的儿童和青少年都需要注射 2 剂 MenACWY 疫苗, 第一剂在 11-12 岁时注射, 第二剂在 16 岁时注射。如果您是一名生活在学生宿舍的大学一年级学生, 如果您从未注射过 MenACWY 疫苗或只在 16 岁前注射过该疫苗, 那么您需要注射一剂 MenACWY。如果您患有高危健康病症而且您的风险持续存在, 您也需要加强免疫。询问您的医务人员您是否有某种危险因素。
乙型脑膜炎球菌 (MenB)	<b>是的!</b> 建议想要预防乙型脑膜炎的青少年从 16 岁开始接受 2 剂 MenB 疫苗。具有某些风险状况 (如无功能脾脏) 的青少年也应接种疫苗, 如果其风险持续存在, 则接受加强免疫。询问您的医务人员您是否有某种危险因素。
肺炎球菌 (Pneumovax, PPSV23; Prevnar, PCV13)	<b>也许。</b> 您有持续存在的健康问题吗? 如果是, 请向您的医务人员进行核实, 以查明您需要注射一种肺炎球菌疫苗, 还是两种肺炎球菌疫苗。
小儿麻痹症 (IPV)	<b>是的!</b> 如果您尚没有注射过脊髓灰质炎疫苗, 您需要注射至少 3 剂脊髓灰质炎系列疫苗。通常在儿童期注射脊髓灰质炎疫苗。
破伤风、 白喉和百日咳 (Tdap; Td)	<b>是的!</b> 所有青春期以前的儿童和青少年 (和成年人!) 都需要注射一剂 Tdap 疫苗 (一种预防破伤风、白喉和百日咳的疫苗)。在注射一剂 Tdap 后, 您需要每 10 年注射一剂 Tdap 或破伤风-白喉 (Td) 疫苗。如果您怀孕, 您将需要在每次妊娠期间, 最好是在妊娠晚期再次使用 Tdap。