

# 成人疫苗接种

## 您永远不会因为年龄太大而不能接种疫苗！

进行免疫接种是一项终身持续、保护生命的工作。在没有确认您已经接种了您所需的所有疫苗之前，不要离开您的医务人员的诊室。

疫苗	您需要吗？
甲肝 (HepA)	<b>也许。</b> 如果您具有甲型肝炎病毒感染*的特定危险因素，或只是想预防这种疾病，那么您需要接种这种疫苗。该疫苗通常要注射 2 剂，两剂相隔 6-18 个月。
乙肝 (HepB)	<b>也许。</b> 如果您具有乙型肝炎病毒感染*的特定危险因素，或只是想预防这种疾病，那么您需要接种这种疫苗。该疫苗通常要注射 2 剂或 3 剂，具体取决于品牌。
Hib(乙型流感嗜血杆菌)	<b>也许。</b> 比如，一些患有特定高风险病症（例如，脾脏功能不全）的成年人需要接种 Hib。与您的医务人员交谈，弄清楚您是否需要接种这种疫苗。
人乳头瘤病毒 (HPV)	<b>是的！</b> 如果您年龄在 26 岁或以下，则应接种该疫苗。27 至 45 岁的成人在与医务人员讨论后也可接种疫苗。该疫苗通常通过在 6 个月期间注射 3 剂。
流感	<b>是的！</b> 您需要每个秋天（或冬天）注射一剂以保护您自己和您周围的人。
麻疹、腮腺炎、风疹(MMR)	<b>也许。</b> 如果您生于 1957 年或之后，您需要注射至少 1 剂 MMR。如果您是医护人员或在国际旅行，您可能需要第二剂药物。然而，免疫系统低下的人不应该接种 MMR。*
脑膜炎球菌 ACWY (MenACWY)	<b>也许。</b> 如果您患有某几种健康病症之一，您可能需要接种 MenACWY 疫苗，*例如，如果您有脾功能不全，并且如果您的风险正在持续，您还需要加强免疫。如果您年龄没有超过 21 岁，而且是住在学生宿舍的一名大学一年级学生，并且您从没有接种过该疫苗，或只在 16 岁之前接种过该疫苗，那么您需要接种 MenACWY。
脑膜炎球菌 B (MenB)	<b>也许。</b> 如果您患有某几种健康病症之一，您需要 MenB，例如，*如果您有脾功能不全，并且如果您的风险正在持续，您还需要加强免疫。如果您年龄在 23 岁或以下（即使您没有患高风险疾病），在与您的医务人员讨论后，您也可以考虑接种 MenB 疫苗。
肺炎球菌 (Pneumovax 23, PPSV23; Prevnar 13, PCV13)	<b>是的！</b> 如果您年龄小于 65 岁且患有某种特定的高风险病症（比如，哮喘、心脏、肺部、肾脏疾病、免疫抑制、脾脏功能不全、吸烟），*您需要接种这两种疫苗中的 1 种或 2 种。65 岁（或以上）的老人将需要接种 PPSV23，与您的医务人员讨论后，您也可能会接种 PCV13（如果您之前未接种过 PCV13）。*
破伤风、白喉、百日咳 (Tdap, Td)	<b>是的！</b> 以前没有接受过 Tdap 疫苗的成人现在需要注射 Tdap 疫苗（成人百日咳疫苗）。而且，所有女性在每次怀孕期间都需要注射一剂疫苗。在那之后，您需要每 10 年注射一剂 Td 或 Tdap 加强疫苗。如果您以前尚没有注射过至少 3 剂含破伤风和白喉类毒素疫苗的药物，或您曾经有深度或受污染的伤口，请咨询您的医务人员。
水痘 (水痘)	<b>也许。</b> 如果您从未得过水痘，也从未接种过该疫苗，或接种过该疫苗但只接种过 1 剂疫苗，与您的医务人员谈谈，以查明您是否需要接种该疫苗。*
带状疱疹 (带状疱疹)	<b>是的！</b> 如果您年龄在 50 岁或以上，即使您已接种 Zostavax 疫苗，您还应该接种 Shingrix 品牌的带状疱疹疫苗的 2 剂系列。

\*咨询您的医务人员，以确定您的感染风险水平以及您是否需要该疫苗。

您打算到美国以外的地方旅行吗？请访问美国疾病控制和预防中心 (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) 网站 [wwwnc.cdc.gov/travel/destinations/list](http://wwwnc.cdc.gov/travel/destinations/list)，获取旅行信息，或咨询旅行诊所。