

# ¿Cuándo deben vacunarse los niños y adolescentes?

Edad	HepB Hepatitis B	DTaP/Tdap Difteria, tétanos, pertussis (tos ferina)	Hib <i>Haemophilus influenzae</i> de tipo b	IPV Poliomielitis	PCV13 Neumocóica conjugada	RV Rotavirus	SPR Sarampión, pa- peras, rubéola	Varicela Varicela	HepA Hepatitis A	VPH Virus del pap- iloma humano	Men- ACWY	MenB	Influenza Gripe
											Meningocóica		
Al nacer (a las 24 horas del nacimiento)	✓												
2 meses	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
4 meses	✓ <sup>1</sup>	✓	✓	✓	✓	✓							
6 meses	✓ (6 a 18 meses)	✓	✓ <sup>1</sup>	✓ (6 a 18 meses)	✓	✓ <sup>1</sup>							✓ (6 meses y mayores)
12 meses			✓ (12 a 15 meses)		✓ (12 a 15 meses)		✓ (12 a 15 meses)	✓ (12 a 15 meses)	✓✓ (2 dosis administradas con 6 meses de separación, generalmente a la edad de 12-23 meses)				Una dosis cada otoño o invierno para todas las personas mayores de 6 meses de edad. Algunos niños menores de 9 años necesitan 2 dosis; pregúntele a su proveedor de atención médica si su hijo necesita más de 1 dosis.
15 meses		✓ <sup>2</sup> (15 a 18 meses)											
18 meses													
19 a 23 meses									También se recomienda la vacuna HepA (2 dosis) para niños y adolescentes que no se hayan vacunado anteriormente.				
4 a 6 años		✓		✓			✓	✓					Se recomienda administrar la vacuna de la influenza cada año a todas las personas mayores de 6 meses de edad.
7 a 10 años													
11 a 12 años		✓ (Tdap)								✓✓ <sup>3</sup>	✓		
13 a 15 años													
16 a 18 años											✓	✓✓ <sup>4,5</sup>	

## NOTAS AL PIE

- Es posible que su bebé no necesite esta dosis, según la marca de la vacuna que use su proveedor de atención médica.
- Esta dosis de la vacuna DTaP se puede administrar a partir de los 12 meses, si han pasado 6 meses desde la dosis anterior.
- Los niños con ciertas afecciones médicas necesitarán una tercera dosis.
- Esta vacuna se le puede administrar a adolescentes sanos. También se recomienda a adolescentes con ciertas afecciones médicas.
- El adolescente puede necesitar una dosis adicional, según la recomendación de su proveedor de atención médica.