

Khi Nào Trẻ Nhỏ và Thiếu Niên Cần Chủng Ngừa?

Tuổi	HepB Viêm gan B	DTaP/Tdap Bạch hầu, uốn ván, ho gà	Hib Viêm màng não mô do Haemophilus influenza tuýp b	IPV Bại liệt	PCV13 Phế cầu khuẩn liên hợp	RV Tiêu chảy cấp	MMR Sởi, quai bị, rubella	Varicella Thủy đậu	HepA Viêm gan A	HPV Vi rút papilom ở người	Men- ACWY	MenB	Influenza Cúm	
											Viêm màng não cầu khuẩn			
Mới sinh (trong vòng 24 giờ sau khi sinh)	✓													
2 tháng	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
4 tháng	✓ ¹	✓	✓	✓	✓	✓								
6 tháng	✓ (6-18 tháng)	✓	✓ ¹	✓ (6-18 tháng)	✓	✓ ¹							✓ (6 tháng trở lên)	
12 tháng			✓ (12-15 tháng)		✓ (12-15 tháng)	✓ (12-15 tháng)	✓ (12-15 tháng)	✓ (12-15 tháng)						
15 tháng		✓ ² (15-18 tháng)												
18 tháng														
19-23 tháng									✓✓ (2 liều được tiêm cách nhau 6 tháng thường ở 12-23 tháng)					
4-6 tuổi		✓		✓					✓ (2 liều) cũng được khuyến cáo cho trẻ em và thanh thiếu niên chưa được tiêm phòng trước đó.					
7-10 tuổi														
11-12 tuổi		✓ (Tdap)								✓✓ ³	✓			
13-15 tuổi														
16-18 tuổi											✓	✓✓ ^{4,5}		

Chủng một liều vào mùa thu hoặc mùa đông cho tất cả những người từ 6 tuổi trở lên. Một số trẻ dưới 9 tuổi cần chủng 2 liều; hãy hỏi bác sĩ của con quý vị xem bé có cần chủng hơn 1 liều hay không.

Khuyến khích tất cả mọi người từ 6 tháng tuổi trở lên chích vắc-xin trị bệnh cúm hàng năm.

GHI CHÚ CUỐI TRANG

- Tùy theo loại vắc-xin mà bác sĩ sử dụng, con của quý vị có thể không cần đến liều này.
- Liều DTaP này có thể được chích sớm khi trẻ được 12 tháng tuổi nếu liều vắc-xin trước được chích cách đây 6 tháng.
- Trẻ đang trong một số tình trạng sức khỏe nhất định sẽ phải chích liều thứ ba.
- Loại vắc-xin này có thể được chích cho thiếu niên khỏe mạnh. Thiếu niên đang mắc một số bệnh nhất định cũng nên dùng loại vắc-xin này.
- Tùy theo ý kiến bác sĩ, con quý vị ở tuổi thiếu niên có thể cần chích liều bổ sung.