

График проведения прививок для детей и подростков

Возраст	Вакцина НерВ Гепатит В	DTaP/Tdap Дифтерия, столбняк, коклюш (судорожный кашель)	Hib Гемофильная инфекция типа b	IPV Полиомиелит	PCV13 Пневмококковая конъюгированная вакцина	RV Ротавирус	MMR Корь, свинка, краснуха	Ветряная оспа Ветрянка	Вакцина НерА Гепатит А	Вакцина против ВПЧ Вирус папилломы человека	Вакцина Men-ACWY	Вакцина MenB	Грипп
											Менингококковая инфекция		
При рождении (в теч. 24 часов после рождения)	✓												
2 месяца	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
4 месяца	✓ ¹	✓	✓	✓	✓	✓							
6 месяцев (6–18 мес.)	✓	✓	✓ ¹	✓	✓	✓ ¹							✓ (6 мес. и старше)
12 месяцев			✓		✓		✓	✓	✓✓				<p>Одна доза каждую осень или зиму для всех людей в возрасте 6 мес. и старше. Некоторым детям младше 9 лет может потребоваться 2 дозы; уточните у врача вашего ребенка, требуется ли ему больше 1 дозы.</p>
15 месяцев		✓ ² (15–18 мес.)	(12–15 мес.)		✓		(12–15 мес.)	(12–15 мес.)	(2 дозы с интервалом 6 месяцев обычно в возрасте 12–23 мес.)				
18 месяцев													
19–23 месяца									Вакцина НерА (2 дозы) также рекомендуется для детей и подростков, которые ранее не прививались.				
4–6 лет		✓		✓			✓	✓					<p>Прививку против гриппа рекомендуется делать каждый год, начиная с возраста 6 месяцев и старше.</p>
7–10 лет													
11–12 лет		✓ (Tdap)							✓✓ ³	✓			
13–15 лет													
16–18 лет										✓	✓✓ ^{4,5}		

Сноски

- 1 Возможно, вашему ребенку не потребуется данная доза, в зависимости от того, какую вакцину использует ваш врач или медсестра.
- 2 Данная доза DTaP может быть введена уже в возрасте 12 месяцев, если после введения предыдущей дозы прошло 6 месяцев.
- 3 Ребенку с определенными заболеваниями может потребоваться введение третьей дозы вакцины.
- 4 Эту прививку можно делать здоровым детям подросткового возраста. Ее также рекомендуют для подростков с определенными заболеваниями.
- 5 Вашему ребенку может потребоваться введение дополнительной дозы вакцины, в зависимости от рекомендаций вашего лечащего врача или медсестры.