

儿童和青少年什么时候需要接种疫苗？

年龄	HepB 乙肝	DTaP/Tdap 白喉、破伤风、百日咳	Hib 乙型流感嗜血杆菌	IPV 小儿麻痹症	PCV13 肺炎球菌结合疫苗	RV 轮状病毒	MMR 麻疹、腮腺炎、风疹	水痘	HepA 甲肝	HPV 人乳头瘤病毒	Men-ACWY	MenB	流感
											脑膜炎球菌		
出生时 (出生 24 小时内)	✓												
2 个月	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
4 个月	✓ ¹	✓	✓	✓	✓	✓							
6 个月	✓ (6-18 个月)	✓	✓ ¹	✓ (6-18 个月)	✓	✓ ¹							✓ (6 个月和更大年龄)
12 个月			✓ (12-15 个月)		✓ (12-15 个月)		✓ (12-15 个月)	✓ (12-15 个月)	✓✓ (在 12-23 个月时常规给予 2 剂, 间隔 6 个月)				对于所有年龄为 6 个月及以上的人, 每个秋天或冬天接种 1 剂。有些年龄小于 9 岁的孩子需要接种 2 剂; 请问您孩子的医务人员您的孩子是否需要接种超过 1 剂疫苗。
15 个月		✓ ² (15-18 个月)											
18 个月													
19-23 个月									HepA 疫苗 (2 剂) 也推荐用于既往未接种的儿童和青少年。				
4-6 岁		✓		✓				✓	✓				
7-10 岁													
11-12 岁		✓ (Tdap)								✓✓ ³	✓		
13-15 岁													
16-18 岁											✓	✓✓ ^{4,5}	

脚注

- 1您孩子是否需要注射取决于您的医务人员使用的疫苗品牌。
- 2如果自前一剂疫苗接种时间算起已经有 6 个月, 可以早至年龄为 12 个月时接种该剂 DTaP。
- 3患有特定医学病症的儿童需要接种第三剂。
- 4健康的青少年可接种该疫苗。对于患有特定健康病症的青少年, 也建议接种该剂疫苗。
- 5根据您医务人员的建议, 青少年可能还需要再接种一剂。