

À quel âge les enfants et les adolescents ont-ils besoin d'être vaccinés ?

| Âge | HepB Hépatite B | DTaP/Tdap Diphtérie, tétanos, coqueluche | Hib <i>Haemophilus influenzae</i> de type b | VPI Polio | VCP13 Vaccin conjugué antipneumococ- cique | RV Rotavirus | ROR Rougeole, oreillons et rubéole | Varicelle | HepA Hépatite A | VPH Virus du papillome humain | Men | | Grippe |
|--|--------------------|---|---|--------------------|---|-----------------|---|-----------|------------------------|---|-----------------|------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | ACWY | MenB | |
| à la naissance (dans les 24 heures suivant la naissance) | ✓ | | | | | | | | | | | | |
| 2 mois | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| 4 mois | ✓ ¹ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| 6 mois | ✓ (6 à 18 mois) | ✓ | ✓ ¹ | ✓ (6 à 18 mois) | ✓ | ✓ ¹ | | | | | | | ✓ (6 mois et plus) |
| 12 mois | | | ✓ (12 à 15 mois) | | ✓ (12 à 15 mois) | | ✓ (12 à 15 mois) | ✓ | ✓ (12 à 15 mois) | ✓✓ (2 doses administrées systématique- ment à 6 mois d'intervalle entre 12 et 23 mois) | | | |
| 15 mois | | ✓ ² (15 à 18 mois) | | | | | | | | | | | |
| 18 mois | | | | | | | | | | | | | |
| 19 à 23 mois | | | | | | | | | | | | | |
| 4 à 6 ans | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | | | |
| 7 à 10 ans | | | | | | | | | | | | | |
| 11 à 12 ans | | ✓ (Tdap) | | | | | | | | | ✓✓ ³ | ✓ | |
| 13 à 15 ans | | | | | | | | | | | | | |
| 16 à 18 ans | | | | | | | | | | | | ✓ | ✓✓ ^{4,5} |

Une dose chaque automne ou hiver pour toutes les personnes âgées de 6 mois et plus. Certains enfants de moins de 9 ans ont besoin de 2 doses ; demandez au professionnel de santé de votre enfant si votre enfant a besoin de recevoir plus de 1 dose.

Le vaccin antigrippal est recommandé chaque année pour les personnes âgées de 6 mois et plus.

Le vaccin HepA (2 doses) est également recommandé pour les enfants et adolescents qui n'ont pas déjà été vaccinés.



"When Do Children and Teens Need Vaccinations?"

Saint Paul, Minnesota • 651-647-9009 • www.immunize.org • www.vaccineinformation.org
www.immunize.org/catg.d/p4050-10.pdf • Item #P4050-10 French (5/20)

NOTES EXPLICATIVES

- 1 Votre enfant pourrait ne pas avoir besoin de recevoir cette dose, selon le type de vaccin que votre professionnel de santé utilise.
- 2 Cette dose de DTaP peut être administrée dès l'âge de 12 mois si 6 mois se sont écoulés depuis la dose précédente.
- 3 Les enfants souffrant de certains problèmes de santé auront besoin de recevoir une troisième dose.
- 4 Ce vaccin peut être administré à des adolescents en bonne santé. Il est également recommandé aux adolescents souffrant de certains problèmes de santé.
- 5 Votre adolescent peut avoir besoin de recevoir une dose supplémentaire selon la recommandation de votre professionnel de santé.