



## टीका जानकारी विवरण

- टीका लगाते समय किसी व्यक्ति के मध्यम अथवा गंभीर अस्वस्थ होने की स्थिति में, टीका लगाने से पूर्व उसके स्वास्थ्य लाभ प्राप्ति की प्रतीक्षा करनी चाहिए। डायरिया अथवा उल्टी होने की अवस्था में डॉक्टर को बताना चाहिए।
  - किसी भी व्यक्ति का प्रतिरोधक तंत्र कमजोर होने पर उसे मुख्य टीका नहीं देना चाहिए, इसकी जगह उन्हें टाइफॉइड (शॉट) वाला टीका दे सकते हैं, इनमें सम्मिलित है :
    - एच.आई.वी./एड्स अथवा प्रतिरोधक तंत्र को प्रभावित करने वाले रोग से ग्रस्त व्यक्ति ।
    - ऐसी दवाई (जैसे-स्टैरॉइड) का 2 सप्ताह या इससे अधिक सेवन करना, जो कि प्रतिरोध तंत्र को प्रभावित करती है।
    - किसी भी प्रकार के कैसर से ग्रस्त व्यक्ति।
    - औषधि अथवा रेडिएशन से उपचार प्राप्त कर रहे व्यक्ति।
  - कुछ निर्धारित एन्टिबायोटिक्स लेने के बाद भी कम से कम 3 दिन तक, मुख्य टाइफॉइड टीका नहीं देना चाहिए।
- अधिक जानकारी हेतु अपने डॉक्टर से सम्पर्क करें।

### 5. टाइफॉइड टीका के खतरे

किसी भी अन्य औषधि के समान, एक टीका भी बड़ी समस्या, जैसे गंभीर एलर्जिक रिएक्शन का कारण हो सकता है किन्तु टाइफॉइड टीके से गंभीर हानि अथवा मृत्यु की संभावना नहीं के बराबर है। किसी भी प्रकार के टाइफॉइड टीके से गंभीर समस्या उत्पन्न होना अपवाद स्वरूप है।

#### निष्क्रिय टाइफॉइड टीका (शॉट):

##### साधारण प्रतिक्रियाएं :

- ज्वर ( 100 व्यक्तियों में से लगभग 1 को)
- सिर दर्द ( 30 व्यक्तियों में से लगभग 1 को)
- इंजेक्शन स्थल पर लालिमा या सूजन ( 15 व्यक्तियों में से लगभग 1 को)

#### जीवित टाइफॉइड टीका (मुख्य):

##### साधारण प्रतिक्रियाएं :

- ज्वर या सिर दर्द ( 20 व्यक्तियों में से 1 को)
- पेट दर्द, जी मितलाना, उल्टी, दाने ( कभी-कभी)

### 6. गंभीर रिएक्शन की स्थिति में निर्देश

#### ● स्वयं का अवलोकन करें:

अपने शरीर से सरोकार रखने वाली प्रत्येक क्रिया पर नजर रखें। इनमें गंभीर एलर्जी रिएक्शन, बहुत तेज बुखार अथवा असामान्य व्यवहार आदि सम्मिलित हैं।

गंभीर एलर्जी रिएक्शन के लक्षणों में खराश, चेहरे एवं गले पर सूजन, श्वसन में कठिनाई, हृदय की धड़कनों का तेज होना, चक्कर आना एवं कमजोरी आना सम्मिलित हैं। यह समस्याएं टीकाकरण के बाद कुछ मिनटों से लेकर कुछ घंटों तक प्रारम्भ हो सकती हैं।

#### ● कार्यवाही करें:

गंभीर एलर्जिक रिएक्शन अथवा ऐसी आपात स्थिति जहां प्रतीक्षा करने का समय न हो, तत्काल 9-1-1 पर फोन करें अथवा तुरंत नजदीकी हॉस्पिटल पहुंचें, अन्यथा अपने डॉक्टर/क्लिनिक से सम्पर्क करें।

तत्पश्चात रिएक्शन की घटना को वैक्सीन एडवर्स इवेंट रिपोर्टिंग सिस्टम (VAERS) को रिपोर्ट करनी चाहिए। यह रिपोर्ट डॉक्टर को फाइल करनी चाहिए अथवा स्वयं भी वेअर्स (VAERS) की वेबसाइट ([www.vaers.hhs.gov](http://www.vaers.hhs.gov)) के माध्यम से अथवा 1-800-822-7967 पर काल करके फाइल की जा सकती है।

(नोट : VAERS किसी भी प्रकार का चिकित्सा परामर्श नहीं देता है)

### 7. अधिक जानकारी हेतु स्रोत

- अपने डॉक्टर से पूछताछ करें।
  - रोग नियंत्रण एवं निवारण केन्द्र (CDC) से सम्पर्क करें।
    - 1-800-232-4636 ( 1-800-CDC-INFO ) पर काल करें।
- अथवा
- सी.डी.सी. की वेबसाइट [www.cdc.gov/vaccines/vpd-vac/typhoid/default.htm](http://www.cdc.gov/vaccines/vpd-vac/typhoid/default.htm) पर विजिट करें।

Vaccine Information Statement

## Typhoid Vaccine

5/29/2012

Hindi